This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Rare Book

JACOBI THEODORI KLEIN
TENTAMEN
METHODI
OSTRACOLOGICÆ
SIVE
DISPOSITIO NATURALIS
COCHLIDUM ET CONCHARUM
IN SUAS
CLASSES, GENERA ET SPECIES,
Iconibus singulorum Generum aeri incisis illustrata.

ACCEDIT

LUCUBRATIUNCULA
DE

FORMATIONE, CREMENTO ET COLORIBUS TESTARUM
QUÆ SUNT
COCHLIDUM ET CONCHARUM.

TUM

COMMENTARIOLUM
in locum PLINII *Hist. Nat. Libr.* IX. *Cap.* XXXIII.
DE
CONCHARUM DIFFERENTIIS.

DENIQUE

Sciagraphia Methodi ad Genus SERPENTIUM ordinate digerendum.

LUGDUNI BATAVORUM,
Apud GEORG. JAC. WISHOFF, CONR. FIL. 1753.

601071
594.8
K64

VIRIS

CELEBERRIMIS DOCTISSIMIS

JOANNI ESGERS

ET

HIERONYMO DAVIDI GAUBIO,

ILLI

S. S. THEOLOGIÆ DOCTORI, EJUSDEMQUE FACULTATIS, UT ET ANTIQUITATUM HEBRAICARUM, IN ACADEMIA BATAVA, QUÆ LEIDÆ EST, PROFESSORI, MATERIÆ OSTRACOLOGICÆ INPRIMIS CURIOSO.

HUIC

MEDICINÆ ET CHEMIÆ IN EADEM UNIVERSITATE PROFESSORI.

HISTORIÆ NATURALIS AMANTISSIMIS

S. P. D.

JACOBUS THEODORUS KLEIN.

Nihil mihi optatius accidere poterat, VIRI DOCTISSIMI AMICISSIMI, quam ut præsens *Opus* VESTRIS ederetur AUSPICIIS: *Doctrina* enim VESTRA & *Experientia* maturarunt mea, qualiacunque, in hoc genere studia. Ita factum, ut,

quod multos per annos parturiverat animus, jam tandem VESTRIS pariat *auxiliis*. Multum curæ operæque conſumſiſtis & in corrigendis, qui irrepſerant, *erroribus*, & in *nominibus* OSTRACODERMATUM vulgatioribus adjiciendis, & in *iconibus* conquiſitis adpingendis ac aere excudendis. In quibus ordinandis quanta uſi ſitis *diligentia*, facile omnes judicare poterunt.

Grave, amore mei incitati, ſuſcepiſtis *onus*. Quum autem *tantam* VOBIS referre *gratiam* non poſſum, *quanta* debetur, habenda tamen eſt, *quantam maximam* animo concipio, verbis licet exprimere nequeam.

Hoc eſt, quod VOBIS perbrevi quidem *epiſtola nuncupatoria*, ſimulque *Omnibus Bonis*, publice teſtatum cupio. Valete! Favete! Dabam Gedani x. Calend. Septembr. MDCCLII.

PRÆ-

PRÆFATIO.



Per OSTRACODERMATA (*a*) *in genere intelligimus animalium testaceorum integumenta, quæ sunt Cochlidum: (vulgo, univalvium:) Concharum, Balanorum, Echinorum & Tubulorum marinorum. In specie dermata Cochlidum & Concharum hoc loco adæquata methodo in ordinem redigendi animus nobis est; quæ* DERMATA *partes sunt adeo constitutivæ animalium testaceorum, ut illis privata vitam diu non agant, non secus, ac quadrupedia deglupta cute; quod alibi sufficienter comprobasse confidimus. Historiam itaque animalium, quæ vocantur testacea, valde usque dum incompletam, posteris commendatam cupimus, perpauca enim cognita deprehendimus. Hoc loco non nisi cum Testis vacuis* (*b*) *res nobis erit, animum curiosorum, vel minus doctorum, oblectatione afficientibus, cum quibus alicubi locorum velut a pueris cum nucibus luditur, ordine satis confuso.*

(*a*) Ὄστρακον, ab ὀστέον, os. Proprie est receptaculum, durum, quasi *osseum*, *ruptile*; latine *Testa*. Hinc *methodus* ostracologica est *ordo* in describendis ejusmodi testis vel receptaculis servandus. Animalia ejusmodi testacea varie a Græcis & Latinis vocantur. Aristoteli audiunt ὀστρακοδέρματα, *osseæ cutis animalia*, *Lib.* III. *de Anim. facult.* ὄστρεα *Lib.* I. *Hist. An. C.* 6. ἐκλοδέρματα; *Empedocli:* λιθύρρινα; *Oppiano:* ἱστρακόρινα, ὀστρακήρα, ὄστρακα; *Suidæ:* ἴχθυες ὀστρακόδερμοι; *Hesychio* & *Varino:* λιχάδης κοματοφορτίδης, κόγχοι, κόγχαι, unde κογχία, κογχάρια, conchulæ. *Plinio:* testacea operimenta modo silicum duritie intecta; animalia testis inclusa duris; silicea testa inclusa. *Ciceroni:* Belluæ nativis testis adhærentes. *Palladio:* clausa maris animalia. *Theodoro:* Testata. *Rondeletio:* Testacea. *Alberto M.* Testudines. *Gazæ:* Conchæ & ostrea. *Aliis:* Conchylia. *Tournefort:* appellat TESTACEA quorundam animalium integumenta, quæ testæ, seu lateris duritiem habent; TESTA enim quid lapidei fragilis significat, ut in fictilibus observare est. *Idem* animalia dividit in MONOTOMA, quorum indivisa, DIBOMA, quæ geminis constant testis, & POLYTOMA, quæ ex plurimis simul adnexis compinguntur.

(*b*) Testa animali vacua, græce: λεβηρίς, autore *Galeno:* item: κονχάρια.

METHODUM *autem, quam premimus* OSTRACOLOGICAM, *non nobis privative, sed amico olim familiari Dn.* Christiano Gabrieli Fischer *maxime debemus, quum museum quondam nostrum adornaverimus, & illata conchylia in ordinem redigere ante viginti, & quot excurrunt, annos solliciti fuerimus. Ipse vel ter revidit, correxit, in melius versit; insuper ego, quæ mihi minus adæquata videbantur, eaque per plures annos digessi, demi plura, alio translocans; multa addidi; aliquando caput sculpsi, ungues momordi, ut memet ipsum & amicum intelligerem, quaque fieri potuerit arduum ejusmodi opus absolutum pene redderetur; quem quoque in finem* Rumphii museum Ambonense, *nec non* Bonanni & Listeri Testacea (*libros pretiosos*) *laceravi, singulaque in paginis separatis secundum enata genera juxta se invicem posui, non correspondentia transtuli, rursusque revocavi similia; & quæ porro.*

Labor utique videbitur intelligentibus *abstrusus; difficultatibusque in-*

innumeris plenus eſt ex autorum deſcriptionibus & ſchematibus erucre differentias teſtarum & criteria. Pleræque enim deſcriptiones *ſunt rudes, obſcuræ ex notis generalioribus conflatæ. Partes Teſtarum aliis aliter denominantur; hinc frequens vocum æquivocatio & deſcriptionum anceps ſenſus. In deſcribendo* Rumphius *omnium feliciſſimus.* Bonanni *multum luxuriat.* Rondeletio, Aldrovando, Gesnero, *genera tantum curæ ſunt.* Liſterus *in tabularum ænearum titulis parcus & jejunus eſt.* Jonſtoni *rapſodiæ valde confundunt; textus corruptiſſimus ſchematibus ſæpiſſime non congruit. Sic & ipſa* Schemata *autorum valde decipiunt. In* Aldrovando, Gesnero, Fabio Columna *quædam ſub umbra latent. In* Jonſtono *veterum nævos Chalcographi phantaſia auxit. In* Rumphio & Bonanni *icones multæ per ſculptoris errorem ſunt inverſæ; pleræque ab una ſaltim parte teſtam contemplandam exhibent; in conchis teſta altera tantum, eaque averſa plerumque, cernitur, neglecto interiori cardine & laterali ſitu partium, ex quo concharum ſpecies definiendæ.* Niſi quis teſtas nativas pene multas oculis uſurpaverit, nec ſchemata nec deſcriptiones ad ſenſum revocabit. Picturæ ſine commentario ſunt mortuæ, quo vivide idea inde reſultet, circumſpecte & diſtincte hic adornandus eſt.

Quantum itaque in nobis fuit, autorum deſcriptiones cum ſchematibus ſedulo contulimus, & criteria ſpecialia connotavimus; generalia ex definitione generis præcognita, ad evitandam nimiam dicacitatem ſtudio omiſimus; tum deſcriptiones paratas, quotquot licuit, cum nativis exemplis contulimus & adeo ad naturam polivimus.

Petrefacta Liſteri *aliorumque ſpecimina jure merito hoc loco prætermiſimus; pauciſſimorum & quidem incidenter mentionem facientes, illumque in tabulis potius quam per tractatus, citare malumus; emendatis paſſim autoris inſcriptionibus, nunc jejunis, nunc tautologicis; pretiumque operæ eſſe judicamus, concinnaſſe* indiculum Tabb. Liſteri, *quarum ſpecimina in paragraphis methodi evolvenda, unde mox apparet, diſturbata & diſſipata apud auctorem eſſe, quæcunque ad unum idemque genus forent revocanda;* Bonanni *ita ut in uſum noſtrum converſimus, ut deſcriptiones ſingulas provide contraxerimus ac ſuppleverimus, eundemque autorem cum* Rumphio *in conſenſum redegerimus; cumque* Aldrovandus & Liſterus *jam exhauſere* Rondeletium, *allegato Aldrovando ſimul & ille adcitatur. Aliorum methodos (a) ſuis autoribus acceptas relinquimus; noſtram*

(a) Recentiſſima eſt GUALTERI; opus ſplendidiſſimum, cariſſimum; placet interna plurimarum teſtarum ſtructura, ad hiſtoriam animalium utique multum faciens, omnia minime abſolvens; quin ad illam non ſolum *dermata nuda* & *vacua*, non ſolum *ſtructura*, ſed *ipſa animalia* integra deſiderarentur; & ne quidem pro abſoluta hiſtoria componenda ordo a *loco*, quo degunt, legitimus videri poſſet. Quo ſenſu *thalamus* animalis nobis veniat *Par.* §. 5. mox innuimus; unde eſt, quod omnia animalia teſtacea potius *monothalamia*, quam *polythalamia* eſſe judicemus. Sed mittimus hæc hoc loco; de quibus magis ex profeſſo in *Lucubratiuncula de formatione, ſtructura & Cremento Teſtarum, quæ ſunt Cochlidum & Concharum.*

noſtram ſtrenue proſecuti, eamque brevem & facilem condere anniſi ſumus. Claſſes & Genera ex diverſa teſtarum externa ſtructura, quæ mox in oculos cadere poteſt, exſtruximus, hancque in additis definitionibus diſtincte enarravimus; ſpecies intermedias plerumque ex ſuperficiei conditione, infimas ex ſpecialiſſima teſtæ ſeu configuratione ſeu pictura indicavimus. Cochlides & Turbines ex coni, ſeu integri, ſeu ſecti, flectione & curvatura genetice ſunt deducti; in Conchis principaliter ad laterum conjunctionem reſpeximus, unde apparet eſſentialis illa concharum differentia, cujus umbram in Liſteri *Hiſtoria obſervavimus; in deſcriptionibus brevitatis & perſpicuitatis ſtudioſi; vocesque non usque adeo uſitatas, ubi primum occurrunt, illuſtravimus.* (*b*)

(*b*) In ſubſidium vocandus *Fiſcherus*, juxta enarratos teſtarum Colores, in animadverſ. ad Cap. *Plinii* 32. *Lib.* IX. *Hiſt. nat. novis actis Erudit.* menſe Novembri *A.* 1733. *p.* 487. inſertis, de Concharum differentiis.

Uſus hujus methodi præcipue triplex eſt. Primo: *inſervit theſauro Teſtaceorum inſtruendo. Etenim, ne in hoc cumulentur ſpecimina in ſolius admirationis, non eruditionis & Hiſtoriæ ſubſidium, convenienti ordine disponendus eſt; quo facile inveniantur quæſita, & evitentur abundantia.* Secundo: *licebit dato nomine deſcriptionem teſtæ ſub genere & claſſe congruis reperire, & una manu plures autores evolvere.* Tertio: *licebit & inde indagare conchas dubias, ſi datur teſta ſine nomine, & quæritur ejus genus ſpeciesque ſpecialiſſima; An Teſta ſit indaganda* Cochlis, *an* Concha? *ſi v. g.* Cochlis, *diſpiciatur amplius: an ſit ſimplex, an compoſita? ſi ex. gr. ſimplex, an ſit plana, convexa, conica? an educta? an diducta? In inventa hoc modo claſſe, perlegantur definitiones generum, & genere invento, perluſtrentur ſpecies. Ita teſtæ definitio vel parata juſto loco comparebit, vel ex ſpecialiſſimis antecedentium differentiis facile adornabitur. Cum vero in ſucceſſiva auctorum lectione nec ſchemata nec deſcriptiones ita perfecte, inprimis propter nævos autorum ſupra accuſatos, conferantur, quin multæ differentiæ & Convenientiæ oculum etiam lynceum ſubterfugiant, errores facile tolli queunt, ubi ex eodem ſchemate ſpecies plures enatæ, partim & diverſa ſub eodem genere recenſita occurrerent; inprimis, ſi quis vel abſolutam multitudinem Teſtaceorum ipſe collegerit, vel ſchemata ex* Rumphio, Bonanni & Liſtero *exſciſſa definitionibus ſingulis jungere, atque adeo totum opus polire & re ſua fore, judicaverit; optandum, ut ejusmodi Tabulas aliquando juris publici fieri quis curaret. Quod reliquum eſt, præter* INDICULUM Liſteri, *Synopticas quoque Tabulas* COCHLIDUM & CONCHARUM, nec non NOMENCLATOREM, *quid vocabula & Termini valeant; denique* INDICEM RERUM *præ cæteris memorabilium, & ultimo loco* INDICEM *rerum* POLYGLOTTON *conſtruximus. Reliqua ex ipſis autoribus eruenda.*

COCHLIDUM.

TABULA SYNOPTICA.

- COCHLIS. §. 1.
  - I. Simplex. §. 3.
    - I. Plana. §. 4.
      - Nautilus. §. 5.
      - Seminautilus. §. 8.
      - Cornu Ammonis. §. 10.
      - Semicornu. §. 13.
    - II. Convexa. §. 15.
      - Nerita. §. 16.
      - Serpentulus. §. 19.
      - Sol. §. 22.
      - Luna. §. 24.
      - Stella. §. 26.
      - Angyſtoma. §. 28.
    - III. Tornicata. §. 32.
      - Cricoſtoma. §. 33.
      - Platyſtoma. §. 38.
      - Dontoſtoma. §. 41.
      - Pentadactylus. §. 44.
      - Tribulus. §. 46.
    - IV. Elliptica. §. 48.
      - Auris. §. 49.
      - Catinus lactis. §. 54.
      - Cidaris. §. 56.
      - Mamma. §. 58.
      - Scapha. §. 60.
    - V. Cono-Cochlis. §. 62.
      - Trochus. §. 63.
      - Hamus. §. 67.
      - Pſeudo Trochus. §. 69.
      - Strombus. §. 71.
      - Tympanotonos. §. 75.
      - Vertagus. §. 77.
      - Noctua. §. 79.
      - Anas. §. 81.
      - Pes anſerinus. §. 83.
      - Oxy ſtrombus. §. 85.
      - Tuba phonurgica. §. 88.
      - Pſeudo ſtrombus. §. 91.
      - Dipſaccus. §. 93.
      - Auris Midæ. §. 95.
      - Naſſa. §. 97.
      - Terebellum. §. 99.

COCHLIS.

- I. Simplex.
  - VI. Cochlea. §. 102.
    - Lunaris. §. 103.
    - Cælata. §. 106.
    - Petholata. §. 109.
    - Olearia. §. 112.
    - Tigris. §. 114.
    - Fornax. §. 116.
    - Trocho-Cochlea. §. 118.
    - Saccus. §. 120.
  - VII. Buccinum. §. 122.
    - Tritonis. §. 124.
    - Argo-Buccinum. §. 127.
    - Cophino-Salpinx. §. 129.
    - Buccinum lacerum. §. 131.
    - Buccinum muricatum. §. 133.
  - VIII. Turbo. §. 135.
    - Urceus. §. 136.
    - Lagena. §. 140.
    - Simpulum. §. 142.
    - Gutturnium. §. 144.
    - Caniſtrum. §. 146.
    - Scala. §. 148.
    - Epidromus. §. 151.
    - Sipho. §. 153.
    - Auricula. §. 156.
    - Neritoſtoma. §. 158.
    - Turbo lunaris. §. 160.
    - Garagoi. §. 162.
    - Gallinula. §. 164.
    - Galea. §. 166.
- II. Compoſita. §. 168.
  - IX. Roſtrata. §. 169.
    - Trochus roſtratus. §. 170.
    - Gladius. §. 172.
    - Fuſus. §. 174.
    - Mazza. §. 176.
    - Rapa. §. 178.
    - Hauſtellum. §. 180.
    - Tribulus roſtratus. §. 182.
  - X. Voluta longa. §. 184.
    - Conus. §. 185.
    - Trocho-Conus. §. 189.
    - Ditrochus. §. 193.
    - Turricula. §. 195.
    - Thema muſicum. §. 197.
    - Veſpertilio. §. 199.

16. Nerita vitrea:
   a. Colore roſeo, ſemilunulis albis & plumbeis ſpiraliter, *Bonanni n.* 208.
   b. Colore albo, maculis pullis & puniceis. *Bonanni n.* 209.
   c. Colore carneo, maculis albis & plumbeis. *Bonanni n.* 210.

17. Nerita trium ordinum; *Liſt. Tab.* 139. & 140.

§. 18. SPECIES II. Oris margine fimbriato. (*a*)

1. Nerita ſtriata, *Liſt. T.* 73. *f.* 71. Figuram vide in Tab. Noſtra I. n°. 16.
2. Nerita faſciata:
   a. Unica faſcia fuſca per medium orbem; *Liſt. T.* 56.
   b. Multifaſcis.

(*a*) *Oris pars extrema turgidula, aut eminentia marginem cingens; cui opponitur oris margo ſimplex; os ſimplex.* vid. *Labium* §. 13.

GENUS II.

SERPENTULUS.

§. 19. COCHLIS CONVEXA; ſpirarum configuratione NERITICA, ſed in hoc a Nerita diverſa, quod orificium propriam ſpiræ ſuæ lamellam ſervet integram, nec adeo ſpiram proximam in ſe recipiat, ſed tegat, eidemque ſe accommodet.

§. 20. SPECIES I. Ore labiato acutangulo, edentulo.

1. Serpentulus pullus: Cochlea ingens pulla, *Liſt. Tab.* 63.
2. Serpentulus faſciatus:
   a. Faſcia nigra ſuper ſpiris albis, *Liſt. T.* 67. *f.* 66. & *T.* 68.
   b. Faſcia ultimam ſpiram ambiente, *Liſt. T.* 73. *f.* 72.
3. Serpentulus ſtriatus; *Liſt. T.* 77. Pictura exſtat in Tab. Noſtra I. n°. 17.
4. Serpentulus lævis: Cochlea noſtra umbilicata, pulla, *Liſt. T.* 69.
5. Ser-

5. Serpentulus ſubrufus, unica faſcia alba ad marginem, *Liſt. T.* 74. *f.* 73.
6. Serpentulus varius; Turbo variegatus *Liſt. T.* 74. *f.* 74. Figuram vide in Tab. Noſtra I. n. 18.

§. 21. SPECIES II. Ore fimbriato.

1. Serpentulus, quatuor ordinum; Purpura lacuſtris; cochlea pulla quatuor ordinum, coccum fundens, *Liſt. Tab.* 137.
2. Serpentulus faſciatus & maculatus, *Liſt. T.* 76.
3. Serpentulus ad marginem acutam faſcia lata vermiculata eleganter depicta, *Liſt. T.* 66.
4. Serpentulus maculis pullis & puniceis (*a*): *Bonanni n.* 209.
5. Serpentulus cinereus, puniceis punctis aſperſus, *Bonanni n.* 211.

(*a*) Roſienen-farb.

GENUS III.

SOL.

§. 22. COCHLIS parum CONVEXA, muricibus (*a*) ſpirarum radians.

§. 23. SPECIES:

1. Sol coloris leucophæi (*b*); *Rumphii Tab.* XX. K. *Liſt. T.* 622. *f.* 9. *Bonanni num.* 366. 367. (*c*) Zonnehoorn *Belg.* Figuram oſtendit Tab. Noſtra I. n. 19.
2. Solis eclipſis; ſemirotundus; muricibus curtis, coloris flaveſcentis; *Muſei olim noſtri.*

(*a*) Murices *dicuntur proceſſus teſtæ elatiores quicunque; hinc* Muricatus, *cujus partes ſunt notabiliter elatiores; Ita & dicuntur* littora muricata.

(*b*) *Color ex cinericeo flaveſcit, vel ut ſtramen aut arundo in tectis.*

(*c*) Bonanni *colores hujus teſtæ exprimit: Ruſtico veluti amictu induta & terreo colore, quo argenteus nitor celatur.* Idem *cornicula radioſa nominat pinnulas, quibus linea ſpiralis belle laciniatur.*

GENUS IV.

LUNA.

§. 24. COCHLIS CONVEXO PLANA; ore baſeos plano & neglecto.

§. 25. SPECIES:

1. Striata, tribus ſpiris circumactis. *Liſt. T.* 627. Picturam vide in Tab. Noſtra I. n. 20.

GENUS V.

STELLA.

§. 26. COCHLIS CONVEXA, plicis (*a*) ultra marginem protenſis radioſa.

§. 27. SPECIES:

1. Ore rotundo prominulo. *Liſteri* Nerita ſtriatus, compreſſus, margine ſtellata, *Tab.* 608. *f.* 46. Figuram vide in Tab. Noſtra I. n. 21.

(*a*) Plicæ *ſæpius ſunt ſuperficiei ſinuoſæ corrugationes.*

GENUS VI.

ANGYSTOMA.

§. 28. COCHLIDIBUS CONVEXIS hoc nomen imponimus, ore anguſto irregulari.

§. 29. SPECIES I. Simplex prominulum.

1. Purpuraſcens e cæruleo, apice ad oris initium parum elato, *Liſt. Tab.* 572. *f.* 23.

§. 30. SPECIES II. Fimbriatum ſimplex.

1. Variegatum per ſtrias *Liſt. T.* 77. *f.* 77.

§. 31. SPECIES III. Fimbriatum & dentatum.

a. MONODON: (unidens.)

1. Virginianum *Liſt. T.* 93. *f.* 93, 94. Figuram vide in Tab. Noſtra I. n. 22.
2. Subrufum, quod Liſtero bidens eſſe videtur, clavicula paululum exerta, altero dente vix ac ne vix quidem conſpicuo. Cochlea bidens ſubrufa, clavicula paululum exerta, *Liſteri Tab.* 96. *f.* 97.

3. Faſciis

noſtram ſtrenue proſecuti, eamque brevem & facilem condere anniſi ſumus. Claſſes & Genera ex diverſa teſtarum externa ſtructura, quæ mox in oculos cadere poteſt, exſtruximus, hancque in additis definitionibus diſtincte enarravimus; ſpecies intermedias plerumque ex ſuperficiei conditione, infimas ex ſpecialiſſima teſtæ ſeu configuratione ſeu pictura indicavimus. Cochlides & Turbines ex coni, ſeu integri, ſeu ſecti, flectione & curvatura genetice ſunt deducti; in Conchis principaliter ad laterum conjunctionem reſpeximus, unde apparet eſſentialis illa concharum differentia, cujus umbram in Liſteri *Hiſtoria obſervavimus; in deſcriptionibus brevitatis & perſpicuitatis ſtudioſi; vocesque non usque adeo uſitatas, ubi primum occurrunt, illuſtravimus.* (*b*)

(*b*) In ſubſidium vocandus *Fiſcherus*, juxta enarratos teſtarum Colores, in animadverſ. ad Cap. *Plinii* 33. *Lib.* IX. *Hiſt. nat. novis actis Erudit.* menſe Novembri *A.* 1733. *p.* 487. inſertis, de Concharum differentiis.

Uſus hujus methodi præcipue triplex eſt. Primo: *inſervit theſauro Teſtaceorum inſtruendo. Etenim, ne in hoc cumulentur ſpecimina in ſolius admirationis, non eruditionis & Hiſtoriæ ſubſidium, convenienti ordine disponendus eſt; quo facile inveniantur quæſita, & evitentur abundantia.* Secundo: *licebit dato nomine deſcriptionem teſtæ ſub genere & claſſe congruis reperire, & una manu plures autores evolvere.* Tertio: *licebit & inde indagare conchas dubias, ſi datur teſta ſine nomine, & quæritur ejus genus ſpeciesque ſpecialiſſima; An Teſta ſit indaganda* Cochlis, *an* Concha? *ſi v. g.* Cochlis, *diſpiciatur amplius: an ſit ſimplex, an compoſita? ſi ex. gr. ſimplex, an ſit plana, convexa, conica? an educta? an diducta? In inventa hoc modo claſſe, perlegantur definitiones generum, & genere invento, perluſtrentur ſpecies. Ita teſtæ definitio vel parata juſto loco comparebit, vel ex ſpecialiſſimis antecedentium differentiis facile adornabitur. Cum vero in ſucceſſiva auctorum lectione nec ſchemata nec deſcriptiones ita perfecte, inprimis propter nævos autorum ſupra accuſatos, conferantur, quin multæ differentiæ & Convenientiæ oculum etiam lynceum ſubterfugiant, errores facile tolli queunt, ubi ex eodem ſchemate ſpecies plures enatæ, partim & diverſa ſub eodem genere recenſita occurrerent; inprimis, ſi quis vel abſolutam multitudinem Teſtaceorum ipſe collegerit, vel ſchemata ex* Rumphio, Bonanni & Liſtero *exſciſſa definitionibus ſingulis jungere, atque adeo totum opus polire & re ſua fore, judicaverit; optandum, ut ejusmodi Tabulas aliquando juris publici fieri quis curaret. Quod reliquum eſt, præter* INDICULUM Liſteri, *Synopticas quoque Tabulas* COCHLIDUM & CONCHARUM, nec non NOMENCLATOREM, *quid vocabula & Termini valeant; denique* INDICEM RERUM *præ cæteris memorabilium, & ultimo loco* INDICEM *rerum* POLYGLOTTON *conſtruximus. Reliqua ex ipſis autoribus eruenda.*

fenis minimum dentibus donata *Liſteri T.* 577. *f.* 31. Figura exſtat in Tab. Noſtra I. n. 23.

3. Fuſcum & faſciatum. Cochlea compreſſa fuſca, faſciata, brevior (præcedenti,) ſinu longo ad roſtrum notabili, *Liſt. T.* 577. *f.* 32. Picturam vide in Tab. Noſtra I. n. 24.

CLASSIS III.

COCHLIS FORNICATA.

§. 32. COCHLIDES FORNICATÆ ſunt, quarum ſpira maxima in fornicem axe ampliorem excurrit; vel: Cochlis fornicata eſt, quæ ori impoſita & per umbonem lateralem inſpecta, maximæ ſpiræ diametrum axe longiorem habet.

GENUS I.

CRICOSTOMA.

§. 33. Eſt COCHLIS FORNICATA; ore circulari, edentulo, fimbriato.

§. 34. SPECIES I. Læve

1. Album *Liſteri Tab.* 75.
2. Corrugatum *Bonanni n.* 212.
3. Faſciatum:
   a. Unica faſcia lata; *Liſteri T.* 607. *f.* 40. Picturam vide in Tab. Noſtra I. n. 25.
   b. Citrinum vel coloris caſtanei, *Liſteri T.* 607. *f.* 39. Exſtat Figura in Tab. Noſtra I. n. 26.
   c. Subrubrum. Trochilus unidens *Liſt. T.* 653. *f.* 53.
   d. Ex fuſco variegatum, apertura fere circinata. *Liſt. Tab.* 50.

§. 35. SPECIES II. Striatum

1. Subrubrum & undoſum *Liſt. Tab.* 648. *f.* 42.
2. Striis granulatis, *Liſt. T.* 653. *f.* 52.

§. 36. SPECIES III. Muricatum:

1. Margine dentato: Nerita parvulus *Liſteri T.* 608. *f.* 46. *a.* Speetje *Belg. Rumph.* Tab. XX. *lit.* I. Figuram vide in Tab. Noſtra I. n. 27.
2. Striis muricatis, *Liſt. Tab.* 653. *f.* 51.

§. 37.

§. 37. SPECIES IV. Laciniatum. Lobbetje/Dolfputje/Baardemannetje *Belg.*
1. Sundenſis freti, *Liſt. T.* 608. *f.* 45.
2. Griſeo rufum, intus perlatum, *Rumphii T.* XX. *H.*
3. Multicolor, ſexcentisve coloribus, *Bonanni n.* 31.

GENUS II.

PLATYSTOMA.

§. 38. Eſt COCHLIS FORNICATA; ore diducto elliptico, ad umbilicum replicato (*a*).

(*a*) *Character ergo hujus generis eſt, umbilicus replicato labio vicinus; dicuntur alias* Valvatæ, Slakhoorns/ Alpharuiken/ Maanhoorns *Belg.*

§. 39. SPECIES I. Ore ſimplici
1. Faſciatum:
a. Linea alba ſpirali in latere, *Rumph. Tab.* XXII. *n°.* 1.
b. Cochlea umbilicata, minor, ſubrufa, ore circinato & operculato Liſteri: Jamaic. *Liſteri T.* 55. Figuram vide in Tab. Noſtra I. n. 28.
c. E viridi ſubflavum, *Liſt. Tab.* 129.
d. Literata, cujus lineas ſpirales aliquot albicantes interſecant characteres quidam nigri, *Liſt. T.* 560. *f.* 3. & 4.
e. Faſcia hepatica obſcura ſuper dorſo cinereo. *Rumph.* XXII. *lit. D.*
f. Trifaſcis, zonis longitudinalibus, latis, albis, *Rumph.* XXII. *n°.* 2.
g. Ponderoſa, carnea, rufis & caſtaneis maculis alternantibus faſciata. *Bonanni n.* 169.
h. Squamis lacteis ſuper oleacino, nitida; ternis faſciis pullis, quas interrumpunt ſquamæ majores. *Bonann. n.* 200.
i. Pennata (*a*), aſperula, pennulis albis ſuper nigro pluries faſciata integra, *Bonann. n.* 220.

2. Im-

(*a*) Pennæ *dicuntur maculæ ſemilunares ſerietim diſpoſitæ, inſtar pennarum in avium pectore aut tergo; hinc* Pennatus, a, um, Gefiedert/ Gevederd *Belg.*

2. Imbricatum (*b*), linguas animalium extremas effingens; nigra albaque; *Bonann.* n°. 198.

3. Sulcatum:

a. Et punctatum; maculis atris, ſuper funiculis flavidis ex colore purpureo. *Bonann.* n°. 217.

b. Undulatum (*c*); Camelatje; undis nigris, ſuper ſulcis gyrorum. *Rumph. Tab.* XXII. *lit.* L.

c. Granulatum; *Rumphii Tab.* XXII. *lit.* M. De gekorrelde Alpkruik / zwarte geribde Dotjer of Maanhoorn *Belg.*

d. Coſtis (*d*) planis, nigris, ſtriatis, hinc inde albicantibus. *Rumph. ib. lit.* N. De zwart gekoorende Alpkruik / de geribde Dotjer of Maanhoorn met zwarte en witte vlekken *Belg.*

e. Auris Lunæ; ſulcis profundis, ſtriis latis, maculis grandiuſculis; rariſſima. *Rumph. Tab.* XXII. n°. 3. De oprechte Maanhoorn *Belg.*

rotundis maculis denſioribus. *Id. ib.* n°. 4.

faſciis ſpiralibus aurantiis inter maculas albas & nigras. *Id. ib.* n°. 5.

4. Cinereum; ſub vulgari cute margaritica. *Bonann.* n°. 219.

5. Undatum; lineis ruffis. *Liſt. Tab.* 567. *f.* 17. *Tab.* 561. *f.* 7.

6. Vitellum; *Belg.* Dotjer; a coloris ſimilitudine:

Rotundatum; oculis albis in ultima ſpira, *Rumph. Tab.* XXII. *lit.* A. an, Cochlea aurantii mali flavedinem imitans ex albo nebulata, *Liſt. Tab.* 565. *f.* 12.?

Compreſſum leviter hepaticum. *Belg.* De leggende / gedrukte of platte Dotjer. *Rumph. Tab.* XXII. *lit.* B.

7. Can-

(*b*) Imbrices *ſunt ſtriæ in decurſu fractæ, & ad ſpeciem tegularum in tectis diſpoſitæ; hinc* imbricatus.

(*c*) Undatum *differt ab* undoſo. *Illud de teſtis, undarum more hiulcis: ſic* undoſa *per ſtrias quaſi fluctus repræſentantia:* undulata, *ejuſmodi maculas pingentia. vid.* Undoſum §. 42.

(*d*) Coſtæ *ſunt tractus eminentes per corpus teſtæ transverſim, velut coſtæ in corpore animalis, exporrectæ, nonnunquam læves & rotundæ, aliquando planæ, ſtriatæ, rugoſæ &c.*

7. Canrena lima; nigrarum macularum seriebus in dorso albo. *Rumph. Tab.* XXII. *lit. C.*
8. Melastomos, Zwart-monbje *Belg.* Coloris intense hepatici, ore nigro *Rumph. Tab.* XXII. *lit. E.*
9. Serpentaria; tenuis, parva, nigricans; serpentinis inscriptionibus; *Rumph. Tab.* XXII. *lit. G.*
10. Gothica; Bia Saralla Kitsjil; characteribus rufis, velut Gothicis, super dorso albo, ore purpurascente. *Rumph. p.* 76. *n°.* IX.
11. Punctata; colore fulvo super cute aurea. *Bonann. n°.* 228. Gespikkelde Boxer *Belg.*
12. Lineata; albida; crebris lineis subrufis transversim & undatim ductis. *List. Tab.* 559. *f.* 1.
13. Livida; ore interno ex aureo & fusco nigricante. *List. Tab.* 563. *f.* 10.
14. Poelorontana; Poelorontje *Belg.* a loco sic dicta. *Rumph. Tab.* XXII. *lit. K.*
15. Montosa; ex nigro montibus picta, oris labio crasso & flavo. *Rumph. Tab.* XXII. *lit. I.*

§. 40. Species II. Ore fimbriato:

1. Fasciatum; pullum; capillaribus striis leviter exasperatum. *List. Tab.* 42. 43.
2. Maculatum; Limax *Bonanni n°.* 224. *List. Tab.* 567. *f.* 18.
3. Punctatum; colore lacteo super nigro. *Bonann. n°.* 218.
   colore rufo super albo; *List. Tab.* 564. *f.* 11.
4. Onychinum; *Bonann. n°.* 225.
5. Variegatum; coloribus subviridi, rufo & croceo, dilutis; commissuris a fasciola alba claviculatim intorta, in umbilico fultis. *Bonann. n°.* 226.
6. Sublividum; ore fusco; ad basin cujusque orbis velut funiculo constrictum; *List. Tab.* 569. *f.* 19. 20.
7. Subflavum; unicolor; *List. Tab.* 566. *f.* 14.
   ima parte volutæ primæ breviter sinuatum, quem sinum alba linea circumscribit. *List. Tab.* 565. *f.* 13.
8. Subrufum; media & ima parte albicante. *List. Tab.* 559. *f.* 2.
9. Anonymum; Jamaicense; *List. Tab.* 84. *f.* 84.

GE-

GENUS III.

DONTOSTOMA.

§. 41. Eſt COCHLIS FORNICATA; ſemilunato ore dentato.

§. 42. SPECIES I. Dentibus ad Columellam.

1. Striatum:
   a. Variegatum majus; ex auro vel croceo rufeſcens. *Liſt. Tab.* 595. *f.* 1.
   b. Variegatum minus; per ſtrias profundas ex rufo. *Liſt. Tab.* 598. *f.* 12.
   c. Undoſe (*a*) maculatum; ex nigro tenuiter ſtriatum. *Liſt. Tab.* 598. *f.* 13.
2. Faſciatum:
   a. Faſciis tribus variegatis ex fuſco purpuraſcens. *Liſt. Tab.* 602. *f.* 20. Figuram vide in Tab. Noſtra I. n°. 29. 1 a. & b.
   b. ——— inæqualibus miniatis, ore citrino. *Liſt. Tab.* 603. *f.* 21.
   c. ——— literatis, maculoſe purpuraſcens. *Liſt. Tab.* 603. *f.* 23.
   d. Faſciis transverſis. *Bonann.* n°. 216.
3. Undulatum læve; undis citreis in ſubviridi ex flavo. *Liſt. Tab.* 603. *f.* 22.
4. Viride, exiguum; *Liſt. Tab.* 601. *f.* 18.
5. Sulcatum; tenue; raris & profundis ſulcis nigris, clavicula flaveſcente; dentibus brevibus, duobus tribusve; *Liſt. Tab.* 596. *f.* 4.
6. Nigrum; dentibus quinque; *Liſt. Tab.* 596. *f.* 5.
7. Aduncum; mucrone (*b*) incurvo; plurimis exiguisque dentibus. *Liſt. Tab.* 601. *f.* 19.

(*a*) Undoſum *vel* flexuoſum, *per ſimilitudinem ab undis, modo ac modo declivibus; ſive vel altiore vel profundiore decurſu apparentibus. vid.* undatum §. 39.

(*b*) Mucro *nobis eſt apex ex cochlide exſertus; ſive conus acutior ex ampliori baſi procedens.*

§. 43. SPECIES II. Dentibus utrinque; (ad Columellam & ad Labium).

1. Striatum;
   a. Ore citrino; tenuiter ſtriatum; *Liſt. Tab.* 598. *f.* 11.

b. Bi-

b. Bifariam ſtriatum; ſtriis majoribus & minoribus alternantibus. *Liſt. Tab.* 598. *f.* 14.

2. Sulcatum;

a. Inter latos ſulcos ſtriatum, & variegatum. *Liſt. Tab.* 599. *f.* 15. *Tab.* 600. *f.* 16.

b. Profunde ſtriatum; ex purpura nigricans. *Liſt. Tab.* 595. *f.* 2.

c. Dentibus introrſum inflexis, profunde ſulcatum. *Liſt. Tab.* 595. *f.* 3.

d. Multis & exiguis ad Labrum, admodum paucis brevibus & acutis ad Columellam. *Liſt. Tab.* 596. *f.* 6. 7. leviter ſulcatum.

e. Ex albo & nigro variegatum, profunde ſulcatum. *Liſt. Tab.* 597. *f.* 9. (*a*)

f. Nigrum; leviter ſulcatum. *Liſt. Tab.* 597. *f.* 10.

3. Undatum; ore citrino. *Liſt. Tab.* 600. *f.* 17.

4. Mucronatum, depreſſum; lateribus acutis, ſenis minimum dentibus; *Liſt. Tab.* 577. *f.* 31. *Belg.* Tovergar / Toverſlak / Stormſlek / Onweershoorn / Oude Wyf met tanden / *Rumphii Tab.* XXVII. *lit.* I. An ad *aures Midæ?* (*b*)

(*a*) *An, Nerita Jamaicenſis ex albo & rubro teſſellata;* Petiv. Gaz. Tab. 13. f. 12.?

(*b*) *An cochlea Bengalenſis, ore lacerato;* Petiv. Tab. 4. f. 10.?

GENUS IV.

PENTA-DACTYLUS.

§. 44. Eſt Cochlis fornicata, Labro diducto, in quinque canaliculos (*a*) vel murices exeunte.

§. 45. Species I. Dorſo ſtriato, *Liſteri Tab.* 804. *f.* 12.

Species II. Dorſo nodoſo & maculato, *Liſt. T.* 804. *f.* 13. *Bonann. n°.* 173. Figura exſtat in Tab. Noſtra I. n°. 30.

(*a*) Canaliculi, Canales, Tubuli, *ſunt proceſſus teſtarum pervii; præcipue verticum proceſſus elongati.*

GENUS V.

TRIBULUS. (a)

§. 46. Est COCHLIS FORNICATA, circumcirca muricata.

§. 47. SPEC. I. Leucophæus, ore albo, nonnihil flavo & roseo; labio intus verrucoso. Bandanus, Bandasche Pimpeltje / de groote getalte Moerbei; *Rumph. Tab.* XXIV. *lit.* C. Figuram vide in Tab. Nostra VII. n°. 112.

SPEC. II. Castaneus; exiguus; Bruine Pimpeltje. *Rumph. p.* 82.

SPEC. III. Flav-osculum; kleine Geelmond / kleine getalte Moerbei / *Belg.* rotundum; albicans; muricibus nigris; ore striato ex luteo micante. *Rumph. Tab.* XXIV. *lit.* E.

(a) *Latius hoc nomine utimur, ac* Rumphius, *qui alius generis testæ, infra nominandæ,* TRIBULI *nomen imposuit.*

CLASSIS IV.

COCHLIS ELLIPTICA.

§. 48. COCHLIDES ELLIPTICÆ nobis audiunt, quarum venter Ovalis, deprellus, in mucronem spiralem (a) terminatur.

(a) Spiræ *sunt cochleares circumvolutiones, vel in sinistram vel in dextram flexæ. Aliis;* Helices, gyri, anfractus. *Sed nos anfractus a spiris distinguimus cum* Majore, *cui sunt distinctiones annuæ, seu* epiphyses *circa orificia Turbinatorum, velut annuli in boum cornubus.*

GENUS I.

AURIS.

§. 49. AURIS MARINA, a similitudine auris humanæ dicta, cujus concham (quæ auris externa) quodammodo imitatur. Gyri (a) apparent in superficiei convexæ extremitate.

(a) *Vide* spiræ §. 48.

§. 50.

§. 50. *Synon.* Patella fera, *Rondel.* Meer-Ohr; wilde Schussel-Muschel / *Gesn.* Lepas Agria, *Arist.* Mother of Pearl, *Angl.* Patella major *Bellon:* Malaice; Telinga Maloli; Bia Sacatsjo, Haviley, *Ind.*

§. 51. SPECIES I. Lævis.

1. Longior viridis in nigro; *Belg.* Maloli-oor / Zee-oor / lange Paarlemoerschulp. *Rumph. Tab.* XL. *lit.* E. F.
2. Latior; cretata; granulata; *Belg.* de kleine ronde Paarlemoerschulp; *Rumph. ib. lit.* G. Vide Figuram in Tab. Nostra VII. n. 113.
3. Brevissima; sine foraminibus. *Rumph. ib. lit.* I.
4. Angustior; exotica; ex flavo viridescens; maculosa. *List. Tab.* 610.

§. 52. SPECIES II. Striata.

1. Tenuis; lata; leviter striata. *Rumph. Tab.* XL. *lit.* H.
2. Mexicana maxima, in centro crustosa; *Langii.*
3. Vulgaris, *Bonann. n.* 10. 11. *List. de cochl. pag.* 167. *Tab.* 16. & *Hist. Tab.* 614.
4. Major, latior; plurimis foraminibus, eorumque vestigiis, ad 40. circiter, conspicuis; clavicula elata. *List. Tab.* 611.
5. Minor; dense in margine interna striata; Africana; *List. Tab.* 612. *f.* 3.
6. Aspera; parva; rotunda; clavicula lata, compressa; limbo valde lato cincta. *List. Tab.* 612. *f.* 4.
7. Profunde sulcata; ingens; *List. Tab.* 613.

GENUS II.

CATINUS LACTIS.

§. 53. Est COCHLIS ELLIPTICA; instar catini lactis; lævis; intus lactea; circa alterum extremum, Nautili more, quodammodo in ansam intorta. Milch-napf; Melknapje; witte Oorschulp / *Rumph. Tab.* XL. *lit.* R. Figura exstat in Tab. Nostra VII. n. 114.

GENUS III.

VITTA.

§. 54. Est COCHLIS ELLIPTICA depressa; ore semilunari diducto, edentulo; *Anodontes* vocata.

§. 55. Spec. I. Nivea.
1. Ponderosa, ex mari rubro; *Bonann. n.* 7.
2. Nitida; turior; *Fab. Col. List. Tab.* 571. *f.* 22.

Spec. II. E cæruleo virescens; operculo subcroceo. *List. Tab.* 141. *f.* 38.

Spec. III. Cancellata; *List. Tab.* 566. *f.* 16.

Spec. IV. Subviridis; lineis capillaceis nigris obliquis. *List. Tab.* 605. *f.* 33.

Spec. V. Ore subcroceo, nigro-linea, exigua. *List. Tab.* 605. *f.* 31. An Nerita Jamaicensis alba, parva, striis castaneis; *Petiv. Gaz. Tab.* 15. *n.* 8.?

Spec. VI. Fasciata: &
1. Reticulata; Labro producto, fascia lata albicante. *List. Tab.* 606. *f.* 38. Figuram vide in Tab. Nostra II. n. 31.
Subrufa *List. Tab.* 607. *f.* 43. 44.
2. Squamea; binis fasciis eleganter picta. *List. Tab.* 606. *f.* 35. Icon exstat in Tab. Nostra II. n. 32.
3. Purpurascens; *List. Tab.* 606. *f.* 36. 37.
4. Fascia alba, nigricans. *List. Tab.* 606. *f.* 34.
5. Nubes maculis imitans; *Jonstoni Tab.* XI.
6. Striis nigro-cinereis, fasciis albis & latis. *Rumph. Tab.* XXII. *n°.* 7.
7. Inter strias planas & latas, nigris & albis maculis picta; crasso oris limbo. *Rumph. p.* 78. *n°.* VIII.

Spec. VII. Undata vel maculata.
1. Lineis nigris capillaceis crispata. *List. Tab.* 605. *f.* 32. *Sloane It. Jam.* II. *p.* 237.
2. Albida lineis angustis umbrosis. *List. Tab.* 604. *f.* 24. 25.
3. Alia, *Listeri Tab.* 604. *f.* 27.
4. Maculata & reticulata. *List. Tab.* 604. *f.* 28. *Tab.* 605. *f.* 30.
5. Maculis trigonis. *List. Tab.* 604. *f.* 29.
6. Maculis latis flavescentibus. *List. Tab.* 604. *f.* 26.
7. Striis subtilibus, colore fusco, albo & nigro pictis. *Rumph. Tab.* XXII. *n°.* 6.

GENUS IV.

CIDARIS.

§. 56. Est COCHLIS ELLIPTICA duarum spirarum, externa figura Turcico capitis tegumento vittato similis; ex spira maxima, altera in sphærellam eminens.

§. 57. SPEC. I. Ore admodum expanso; depressa; leviter striata. *List. Tab.* 570. *f.* 21.

SPEC. II. Subrufæ; *List. Tab.* 607. *f.* 41. & 42. Picturam vide in Tab. Nostra II. n. 33, 34.

GENUS V.

MAMMA.

§. 58. Mammis assimilamus COCHLIDES ELLIPTICAS paucarum spirarum ex ventre oblongo, turgido, in papillarem mucronem leviter assurgentes.

§. 59. SPEC. I. Albula. Isso palestu; i. e. carne abundans.

1. Candidissima. *Rumph. Tab.* XXII. *lit.* F.
2. Macula ad os, nigra. *Rumph. p.* 76. *n°.* VII.
3. Leviter flavescens, eburnea, lineis nigerrimis, flexuosis; *Bonann. n.* 389.
4. Fasciata. *List. Tab.* 142. *f.* 36.

SPEC. II. Cingaris; coloris aurantii. *Rumph. p.* 76.

SPEC. III. Virginea; mucrone, sive mammilla vix apparente:

1. Hieroglyphica, fasciis albis cum contiguis nigris lineis in veste, velut lacca nitente, ductis. *Bonann. n.* 399.
2. Ramosa, habens fasciam tesseris alternantibus ramosam. *Bonann. n.* 400.
3. Nigra, lacteis guttis & media fascia alba distincta. *Bonann. n.* 401.
4. Ore fimbriato, coloris lactei, duabus zonis cinereis & atris vittata; *Bonann. n.* 402.
5. Squamata, squamis lividis & albis picta, super anthracino (*a*). *Bon. n.* 205.

(*a*) Anthraces *dicuntur carbones; unde* anthracinum.

Spec. IV. Æthiopiſſa; Krangſtuſſu; ſulcata, ſquamata, intus parce margaritica.

1. Nigra tota. *Belg.* Zwartgeboorende of kleine Maanhoorn met het Maanmetje. *Rumph. Tab.* XIX. *lit.* C.
2. In nigro viridis & alba. *Rumph. p.* 70.

Spec. V. Vetula. Eſt mamma ſpiraliter parce ſtriata, albo nigra, lineis albis intermixta in ſuperficie griſea; os patulum intus album, lineatum, in margine plicatum, caſtaneo & flavo colore imbutum. *Muſ. noſtri.*

1. Major, ſtriis ſubtilibus.
2. Minor, ſtriis craſſioribus.
3. Longa, ſtriis fuſcis, flammeis, albis, ore leucophæo nitente, labio leviter denticulato.

Spec. VI. Globoſa; cujus mucro papillam ex iride prominulam imitatur.

1. Pramnios, lapidi lydio, colore aterrimo, ſimilis. *Bon. n.* 164.
2. Ternis faſciis albis & zonis rubeis, punctatis. *Bon. n.* 203.
3. Charletan ſ. zanni, coloribus igneo, purpureo, flaveſcente, velut veſtis perſonæ ridiculariæ diſtincta. *Bonann. n.* 334.
4. Umbilicata, nitida, quatuor faſciis albis cruentatis & heluaceo colore undatis cincta, ſuper veſte arundini indicæ ſimili. *Bonann. n.* 372.

Spec. VII. Variolata, vix trium ordinum frequentibus punctis aſperſa ex pice crocea. *Bonann. n.* 180.

Spec. VIII. Maculata

1. Candida, maculis ovalibus, filo pullo circumſeptis. *Bon. n.* 204.
2. Punctata, rubra, clavicula paululum producta. *Liſt. T.* 560. *f.* 5.
3. Tenuis & pellucida. *Liſt. Tab.* 566. *f.* 15.

Spec. IX. Verrucoſa, papilla prominente, labio oris ad columellam repando, extus denſis variolis aſpera, nigricans, intus cornea. *Liſt. T.* 989. *f.* 49. De geknobbelde Wydmonder of Rudolphus-Hoorn *Belg.*

GENUS VI.

SCAPHA.

§. 60. Eſt Cochlis elliptica explanata, pauciſſimis ſpiris ad alterum latus inflexa, quæ, inverſa, ſcaphæ ad inſtar natare dicitur.

§. 61. Species I. Spiris binis abſoluta; teſta levi; tereti; in parte gibba coccineo humore imbuta, quam lineolæ nigræ albeſcentes diſcolorant. *Bon. n.* 197. Icon exſtat in Tab. Noſtra VII. n. 115.

CLAS-

CLASSIS V.

CONO-COCHLIS seu COCHLIS CONICA.

§. 62. Cono-Cochlides sunt gyri (spirales) in Conum geometricum turbinati.

GENUS I.

TROCHUS.

§. 63. Est Conus spiralis amplioris & complanatæ baseos, ut fere rectus insistat horizonti. A similitudine instrumenti, quod Pueri scutica circumagunt, nomen petiit *Rondeletius*.

§. 64. *Synon.* Bis Cucussan, sive infundibulum. *Belgis:* Tollen/ Pyramiden/ Bagyne-drollen. *Badanens:* Tombor: Meer-topffe/ Topfachtige Schraub Schnecken/ *Gesn.*

§. 65. Species I. Lævis:

1. Maculatus:

a. Æqualium fere laterum, spiris planis, superioribus in concursu nonnihil crenatis, sub crusta ex obscura rubedine nigrescente, margariticus; ore oblongo, angusto, in ambitu umbilici guttato (*a*); *Rumph. Tab.* XXI. A. B. *Aldrovandi p.* 363. Trochus pyramidalis. De geblakte Tol *Belg.*

b. In omnibus spirarum juncturis crenatus, *Rumph. Tab.* XXII. *n°.* 3.

c. Flammis rubidis, viridibus, albisque. *Rumph. ibid. n°.* 4.

d. Late radiatus ex amplo ore rubro. *List. Tab.* 617. *f.* 3.

e. Intus perlatus, extus terreis fasciolis segmentatus. *Bonann. n.* 102.

f. Variegatus ex viridi; parvus. *List. Tab.* 618. *f.* 4. Figura exstat in Tab. Nostra II. n. 35. a. & b.

g. Ex rufo nebulatus, major. *List. Tab.* 620. *f.* 6.

h. Spiris convexis, rubro & albo maculatis. *Rumph. Tab.* XXII. *n°.* 5.

i. *Schyn-*

(*a*) Guttæ *dicuntur maculæ rotundæ, per marginem integrum circinatæ.*

i. *Schynvoetii* apud *Rumph. Tab.* XXII. *n°.* 8. 9. 10.
k. Tuberosus, acutus; albus & ruber. *Rumph. ib. n°.* 6.

2. Fasciatus:
a. Granulis striarum puniceis, fasciola spira li alba. *Rumph. Tab.* XXI. *n°.* 1.
b. Adriaticus; minimus; flavescens; maculis rubicantibus & terreis, filo albo interspirali. *Bonann. n.* 91.
c. Acutus, sub cuticula crocea nitide margariticus. *Bon. n.* 93.
d. Sub lacca nitidus, maculis linearibus. *Bonann. n.* 99. colore sanguineo.
e. Fascia interspirali tessellata; ex mari Adriatico; cochloides latior. *Bonann. n.* 98.
f. Albus, leviter umbilicatus, exiguus, pluribus fasciis cinctus; *List. Tab.* 59. *f.* 56. Hispanicus.
g. Mons pessulanus, exiguus fasciatus. *List. Tab.* 61. *f.* 58.
h. Limbo angusto, in quovis orbe medio cinctus. *List. Tab.* 616. *f.* 1. Figuram vide in Tab. Nostra II. n. 36.

3. Virgatus (*a*):
a. Inter spiras sulcatus, vix ciceri æqualis. *Bonann. n.* 97.
b. Labrum Leonis; *Bonann. n.* 94. 95. 96.
c. Urna pyramidalis prima, *Bonann. n.* 89.
d. Labeo; *Belg.* Diklip. *Rumphii Tab.* XXI. *lit.* E.
e. Tombor; de gegranuleerde Tol; *Rumph. Tab.* XXI. *lit.* C.
f. Trochilus *Schynvoetii* apud *Rumph. ib. n.* 11.

(*a*) Virga *a similitudine meteori cognominis dicitur, plaga seu macula ex acuto apice condensatis lineis in latum sensim exporrecta. Inde* virgatus, *qui ejusmodi picturam exhibet. Habemus &* virgas sinuosas, *quarum latera non rectis sed flexuosis lineis terminantur.*

§. 66. Species II. Asper.

1. Muricatus: Albidus Jamaicensis *List. Tab.* 628. *f.* 14.
Nodosus in basi; cæterum muricatus. *List. Tab.* 646. *f.* 39.
2. Polygonus; umbilicatus ore rotundo, sub cortice marmoreo margariticus. *Bonann. n.* 100.
3. Longævus; quod diu extra aquam vivit animal; sive Papuanus; saxeus, fenestratus, griseus, eum pauco virore intus perla

perla mortua. *Rumph. Tab.* XXI. *lit.* D. De Papoetſche of langlevende Tol / Moorſche Tempel *Belg.*

4. Hiſpidus in ſpiris, quaſi rectangulis inter ſila cærulea, aurantia & fuſca. *Rumph. Tab.* XXI. *n°.* 2.
5. Fuſcus & albus; feneſtratus (*a*) *Schynvoetii ad Rumph. p.* 75. *Tab.* XXI. *n°.* 7.
6. Pharaonis Cochlea. *Bonann. p.* 138. *n.* 195. & *p.* 144. *n.* 222. & 223.
7. Undatus ſive ſinuoſus (*b*).
   a. Variegatus ex rubro. *Liſt. Tab.* 619. *f.* 5.
   b. Auricula ad Columellam tortili. *Liſt. Tab.* 625. *f.* 11.
   c. Similis, ſed major. *Liſt. Tab.* 630. *f.* 16. *Tab.* 626. *f.* 11. a.
   d. Similis, columella dentata. *Liſt. Tab.* 632. *f.* 20.
   e. Aſper & inæqualis. *Liſt. Tab.* 629. *f.* 15.
   f. Ex viridi & ruſo variegatus; baſi lævi; ſtriis multum extantibus. *Liſt. Tab.* 646. *f.* 38.
   g. Striis undoſis aſper. *Liſt. Tab.* 631. *f.* 18.
8. Verrucoſus:
   a. Variegatus ſtriis nodoſis; baſi valde cava. *Liſt. Tab.* 631. *f.* 17.
   b. Brevis; ex rubro undatim virgatus; cæterum ſubcæruleis ſtriis nodoſis, valve aſper. *Liſt. Tab.* 632. *f.* 19.

(*a*) Feneſtratus, *qui cellulas profundas habet feneſtrarum more diſpoſitas.*

(*b*) *Vide* virga §. 65.

GENUS II.

HAMUS.

§. 67. Reticulo piſcatorio, quo piſces ex majoribus receptaculis hauriuntur, adſimilamus COCHLIDEM TROCHIFORMEM obtuſam, margine lacero, labio nonnihil exerto & acuminato.

§. 68. SPECIES I. In longum coni elatioris ſtriatum, *Liſt. Tab.* 623. *f.* 9.
SPECIES II. Muricatum. *Liſt. Tab.* 644. *f.* 36. Icon exſtat in Tab. Noſtra II. n. 37.

GENUS III.

PSEUDO-TROCHUS.

§. 69. Est TROCHOIDES LONGA, ore in canaliculum exertum contracto.

§. 70. SPECIES I. Lævis:

1. Fasciis tricolor, seu Buccinum septem ordinum, fasciis fere bicoloribus, interdum tricoloribus, iridis instar pictum, *List. Tab.* 15. *f.* 10. Icon exstat in Tab. Nostra VII. n. 116. Buccinum Barbadense perelegans, fasciatum; *Petiv. Gaz. Tab.* 22. *f.* 11.
2. Pentazonos, seu quinque fasciis cinctus, trochiformis. *Bonann. n.* 66.

SPECIES II. Striatus; insigniter elongatus; Teeten; coloris nigro-castanei, striis nonnihil asperis; *Rumph. Tab.* XXI. *n°.* 12. Trochus fuscus, clavicula valde producta. *List. Tab.* 624. *f.* 10. Strombus admodum productus, sub cortice sulcis rugoso, margariticus. *Bonann. n.* 92.

GENUS IV.

STROMBUS.

§. 71. STROMBI sunt canales spirales in Conum acutum & longum contorti.

§. 72. *Synon.* Paalden; Teepots; Turbines; Pennen; Binkrang, Diarong, Nadeln / Schraub Schnecken.

§. 73. SPECIES I. Aculares; Nadelförmige.

A. Lævis, seu Subula:

1. Maxima; Marlpiem; dikke Spger-pen. Strombus maximus, palmam longus, albidus, nubeculis nigro-cæruleis super cingulis pictus. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* A.
2. Tessellata, spiris velut geminis:
   a. Tesseris nigris; *Belg.* de zwartgebleekte Paalo / de dunne Spger-pen; *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* B.
   b. ——— subfusce rufis. *List. Tab.* 842. *f.* 70.
   c. ——— plumbeis, quodammodo fasciatus; de grauwachtige Paalo / de ongemonde Pen. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* C.
3. Orthoceras; testa quasi eburnea, ore angusto semilunari. *Bon. n.* 118.

4. To-

4. Toroceras, ſulcatus, maculis latis, ex rufo nigricantibus, radioſis. *Liſt. Tab.* 841. *f.* 69.
5. Teleſcopium: duplicatis velut orbium ſpiris cochleatur, in quarum altera teſſellulis conchyliatis pulchre diſcriminatur color albus, quo totus tegitur. *Bonanni n.* 317. *Liſt. Tab.* 846. *f.* 74.
6. Marmoratus; nitidus; longus; acutus; juncturis ſpirarum vix dignoſcendis, maculis rufis. *Bonann. Tab.* 126. *n.* 107.
7. Subniger, paluſtris; craſſulus. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* Q.
8. Alternas ſpiras latiores & ſtrictiores ex flavo nebulatas exhibens. *Liſt. Tab.* 843. *f.* 71.
9. Flammea, albis ſerpentulis, tenuis. *Rumph. p.* 100. *n.* V.
10. Folium Tritici; Strombus indicus rarus & pulcher; niveus & nitens, ex binis faſciolis ſpiralibus, quæ triticea folia ſuo acumine exprimunt, bis cinctus. *Bonann. n.* 109. Icon exſtat in Tab. Noſtra VII. n. 117.
11. Infundibulum; Strombus brevis, ventricoſus, canaliculatus, faſciis ſubrufis per ſpiras planas ſulcatas pictus; *Liſt. Tab.* 844. *f.* 72.

B. Aſper:

1. Lima.
   a. Caſtanea; denticulis (*a*) & rugis aſpera; de Baalt-tan; *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* F.
   b. Chalybea; ſpiris ſulcatis ex cæruleo chalybeis, aliquando albis, nigredine aſperſa; de ſyne Baalt of Teil-naalt; *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* I.
   c. Faſciatim ſtrigilata (*b*). De gegranuleerde Baalt; *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* H.
   d. Lancinula; Pickenier; parva, tenuis, alba; cujus cancellorum extremitates haſtularum apices referunt. *Rumph. ib. lit.* G.
2. Acus Sartoria, per faſcias ſpirales ſtriata; *Liſt. Tab.* 845. *fig. altera minor.*
3. Luſſapinjos; a loco;
   a. Ebur-

(*a*) Dentes *ſunt apices breves, vel obtuſi vel acuti.*
(*b*) Strigiles *ſunt* Wormio *canaliculi apertis ſtriis intercepti.* Striges *ſunt interſtitia depreſſiora & plana, vel ſtriarum vel coſtarum.* Columna.

a. Eburneus; De Witte Marlpziem / de geheele Pen; ſpiris dentatis & ſtriatis flavis. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* E.
b. Faſciatus; & punctatus in ambitu ſpirarum. *Liſt. Tab.* 846. *f.* 75.

4. Borongan; Sipotkilſil; paluſtris; labioſus, apice plerumque fracto, ſpiris dentatis; intus albus; De Ceramſche Baſtaard Marlpziem / de Weſt-indiſche Baſtaard Paus-kroon; Falſch Baſtart-Bapſi Kron. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* Q.
5. Paſtinaca; a figura; Strombus dentatus in labro interno; ore acuminato; fuſca. *Liſt. Tab.* 837. *f.* 63.
6. Siphunculus, ſuper ſpiris convexis perpendiculariter denſe ſtriatus; *Liſt. Tab.* 837. *f.* 64.
7. Faſcis
a. Semilævis; videlicet ſupra lævis, infra ſtriatus. *Liſt. Tab.* 979. *f.* 37.
b. Duplicatus; in orbibus maculatis per longum ſtriatus. *Liſt. Tab.* 979. *f.* 36.

§. 74. Species II. Cochloides, proprie Schraub-ſchnecken; ſpitze Schrauben; ſpiris
A. Planis: depreſſus in primi orbis parte ſuperiore, albus. *Liſt. Tab.* 591. *f.* 57.
B. Toroſis (*a*), mit gantzen Stäben gewunden.
1. Lævibus:
a. Marmoreus; albus; decem orbibus tumidis; ore laterali anguſto. *Bonann. n.* 24.
b. Faſciatus; ore rotundo, contracto & plicato. *Bon. n.* 106.
c. Aſtragaloides ſuper toris; mit ringen über den Stäben gebrochet/ coloris roſei. *Bonann. n.* 114.
d. Tenuis; exiguus, ore circinnato. *Liſt. Tab.* 20. *f.* 16.
e. Olivaris Jamaicenſis, ſtriis capillaribus; *Petiv. mem. cur.* 1708. *p.* 98. *n.* 15. *Hans Sloane, It. Jam* II. *p.* 230. *Liſt. Tab.* 21. *f.* 17.
f. Rufus, exiguus quinque ſpirarum. *Liſt. Tab.* 22. *f.* 19.
g. Orizæ granum, exiguus, albus, ſeptem orbium; *Liſt. Tab.* 40. *f.* 38.

2. Stria-

(*a*) Torus *eſt annulus craſſus vel articulus rotundus in columnis.* Der Stab; *unde* toroſus.

2. Striatis.

a. Tiburtinus, ſubtiliſſimis crenis criſpatus, colore lapidis Tiburtini, ex mari Adriatico. *Bonann. p.* 116. *n.* 23.

b. Carminatus, albidus, ad imum quemque orbem una vel altera ſtria majuſcula; ore rotundo, parum ad ſiniſtram labiato. *Liſt. Tab.* 591. *f.* 56.

c. Clava; magnus, ore lunato ſimplici; ſeu cochlea longiſſima clavicula, medio quoque orbe unica, valde acuta & eminente, ſtria. *Liſt. Tab.* 591. *f.* 59.

d. Cippus viarum ſimplex; ein einfacher Weg-weiſer; *Belg.* de enkelde Trommelſchroef; gyris convexis, ſtriatis; coloris aliquando caſtanei, aliquando albi. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* M.

e. Eroſus; molem grani hordeacei æquans, colore figulino, vel tophaceo, ſpiſſis contuſionibus æqualiter excavatus. *Bonann. n.* 108.

f. Σαλπιγξ *Fabii Columnæ.* Buccinum ſtriatum, *Liſt. Tab.* 590. *f.* 54. Tuba eburnea longiſſima, ſpiris ventricoſis; *Bonann. n.* 118.

g. Rufus ex fuſco, ſtriis lævibus, ore rotundo, anguſto. *Liſt. Tab.* 590. *f.* 55.

h. Faſciis teſſellatis (*a*) in quoquo orbe duabus. *Liſt. Tab.* 592. *f.* 60.

i. Variegatus in ſpiris anguloſis, grandiuſculus. *Liſt. Tab.* 593. *f.* 61.

C. Echinoſis; aus viertel Stäben gebrechet.

1. Simplicibus:

a. Xylohelix; Cochlea lignorum, Holtz Schraube; propter ſpiras ejusmodi cochleæ ſimiles. Apice obtuſo. *Bon. n.* 112.

2. Geminis:

a. Helix acuta: Spitz Schraube; notulis rufis ſignata. *Bon. n.* 117.

b. Peglia, ſpiris per angulum acutis & faſciis latis, ab invicem diviſis. *Bonann. n.* 67.

D. Trochiloſis: mit Hohl Kehlen.

1. Lævibus

a. Coccyx: (*ab oſſis coccygis ſimilitudine*) regularis, eburneus. *Bonann. n.* 113.

b. Coc-

(*a*) Teſſellatum, *quod quadratulis diverſi coloris alternantibus quaſi ſtratum eſt.*

b. Coccyx irregularis sive hiulca; Strombus albus in mediis orbibus sæpe depressus. *List. Tab.* 589. *f.* 53.

c. Polyophthalmos; oculatus in juncturis. De rosse Haalt met witte spyppels of zeutkoppen / de wit-bespikkelde Pen / *Rumph.* *p.* 100. *Tab.* XXX. *lit.* D.

2. Carminatis

a. Sagitta. Excavatus in medio cujusque orbis; albidus. *List. Tab.* 591. *f.* 58.

GENUS V.
TYMPANOTONOS.

§. 75. Trommel Schraube. *Belg.* Trommelschroeven. Est STROMBUS acute muricatus; ore irregulari, vario.

§. 76. SPECIES I. Fluviatilis:

1. Fuscus, atro purpureis fasciis ex ore videndis cinctus, striatus, & limbis acutis, maxime prioribus asper. *List. Tab.* 120. *f.* 15. Figuram vide in Tab. Nostra II. n. 38.
2. Fasciatus & muricatus per medios orbes. *List. Tab.* 121. *f.* 16.
3. Striatus & muricatus, fuscus. *List. Tab.* 121. *f.* 17. Pictura exstat in Tab. Nostra II. n. 39.
4. Nodose striatus, oris labio effuso. *List. Tab.* 122. *f.* 18.; unicornu undosum, nodosum & verrucosum. *Petiv. Gaz. Tab.* 5. *f.* 5. Icon exstat in Tab. Nostra II. n. 40.
5. Similis, minor; *List. Tab.* 122. *f.* 19.
6. In primis orbibus muricatus; cæterum nodosus in striis; *List. Tab.* 122. *f.* 20.

SPECIES II. Pelagius:

1. Rostratus, leviter dentatus, fuscus, striatus & fasciatus; *List. Tab.* 836. *f.* 62.
2. Minor, ore contracto, *List. Tab.* 1018. *f.* 81. Jamaicensis. Buccinulum recurvirostrum, nigrum, striatum & asperum, minimum. *Hans Sloane It. Jam.* II. *p.* 231.
3. Loricatus (*a*), recurviroster, turgidulus; labio oris semilunati crispo; *List. Tab.* 1019. *f.* 82. Unicornu fossile, fasciis regularibus verrucosis. *Petiv. Collect. n.* 90.
4. Undatus, rugose; labio rotundo, effuso; ore longo angusto. *List. Tab.* 1021. *f.* 85.

GE-

(*a*) Loricatus *per similitudinem* loricæ, *dicitur*, *crusta aspera velut dense ex funiculis vel catenulis contexta*.

GENUS VI.

VERTAGUS.

§. 77. Eſt STROMBUS STYLI-FORMIS; oris oblongi labiis fimbriatis, in canaliculum recurvum excurrentibus.

§. 78. SPECIES:

1. Longitudinaliter; ex India; rarus; figura & colore Zezyphino (*a*), aureus, croceus & aliquando candidus; valde nitidus. In ſpiris foſſiculæ ſunt perpendiculares, æque diſtantes; alterum oris labium falcatum prominet & inflectitur; ut in cane venatico. *Bonann. n.* 84. *Liſt. Tab.* 1020. *f.* 83. Icon exſtat in Tab. Noſtra VII. n. 118.
2. Carminatus; albus; ſinuoſus. *Liſt. Tab.* 1021. *fig. altera.*
3. Dentatus in ſpiris; de Gemit-pen / het witte Cuitje; ſtriis nunc nigris fuſcisve. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* K.
4. Bifalcatus
   a. Muricatus, maculoſus; ſpiris dentatis. *Liſt. Tab.* 1017. *f.* 79.
   b. Faſciatus & aſper. *Liſt. Tab.* 1018. *f.* 80. *H. Sloane p.* 248.
5. Labio plicatus:
   a. Major; ſpiris anguloſis & muricatis; cretatus; labio oris obliquo, & quaſi incurve plicato. De ruige Trommelſchroef / de West-indiſche Pauſe kroon; *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* O. Alius ſpiris longe magis muricatus, *Muſ. noſtri.*
   b. Montoſus; ſeu obtuſe muricatus per ſpiras univerſas. *Bon. n.* 69.

(*a*) Zezypha *i. e. Jujubæ* rothe Bruſt-beerlein / gelbe oder weiſſe.

GENUS VII.

NOCTUA.

§. 79. Eſt STROMBUS, roſtro adunco, bicipiti. Aſio avis.

§. 80. SPECIES I. Granulata; de Knobbel-pen / het gegranuleerde of gekarteld de Cuitje; cinereus; granis majoribus, aliquando albis. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* L. Figuram vide in Tab. Noſtra VII. *n.* 119.

SPECIES II. Hiulca; geknobbelde Cuitje; maculis & faſciis nigris. *Aliis:* de gedoornde Gemit-pen; *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXX. *lit.* N.

GE-

GENUS VIII.

ANAS.

§. 81. Eſt Cochlis Strombo ſimilis, ſed cucullata; anati natanti ſua figura aliquo modo comparanda.

§. 82. Species I. Brevis; acutus; circa ultimam ſpiram apertam & leviter roſtratam conſtrictus, coloris nivei, notulis ex ſanguineo nigricantibus, velut calami ductibus ſignatus. *Bonann. n.* 81. Figura exſtat in Tab. Noſtra VII. n. 120.

GENUS IX.

PES ANSERINUS.

§. 83. Eſt Strombus alatus; ſeu Labio in murices diviſo, digitos anſerinos referentes.

§. 84. Species I. Digitis longis, membranam intercipientibus; intus albus, foris flavens. *Bon. n.* 85. *Liſt. Tab.* 866. *fig. minor.* Figuram vide in Tab. Noſtra II. n. 41.

Species II. Digitis brevioribus, quaſi laciniis membranæ cinctis; coloris nivei; *Bon. n.* 87. qui illum alæ Veſpertilionis vel Draconis aſſimilat. Buccinum ſtriatum labro propatulo digitato. *Liſt. Tab.* 865. *f.* 20. Pictura exſtat in Tab. Noſtra II. n. 42.

GENUS X.

OXY-STROMBUS.

§. 85. Hoc nomine comprehendimus omnes Strombos breves, propter oris varietatem & configurationem a generibus, hactenus recenſitis, diverſos.

§. 86. Species I. Lævis:

1. Ligatus:

a. Acutus, ſeu Turbo brevis, ſed craſſus, albus & lævis, quaſi ligula pulvinatim (*a*) conſtrictus; ore rotundo contracto. *Bonann. n.* 39. b. Ob-

(*a*) Pulvinata *Liſtero dicuntur, quæ turgent; ita fimbria, ligula, pulvinata eadem ac turgida, vel culcitræ inſtar turget,* ausgeſtopft; *uſurpatur de partibus teſtæ turgidioribus.*

b. Obtuſus; ore ſemilunari contracto, faſciola tenui in ſpirarum commiſſuris arcte ligatus, coloris eburnei; vivit in ſpongiis. *Bonann. n. 56.*

2. Pupa faſciata; orbibus ex dextra in ſiniſtram flexis, ore oblongo, patulo, ad ventrem contracto. *Bonann. n. 41.*

3. Geometricus; caſtaneis lineis duabus punctatis, circa tredecim ſpiras ventricoſas, ductis; ore contracto. *Bonann. n. 42.*

4. Crenatus, albus, una cujusque orbis parte crenata. *Liſt. Tab. 588. f. 52.*

5. Faſciatus ſupra; infra ſeptem ſpiris undatus; ore ſubrotundo lævi. *Liſt. Tab. 12. f. 7.* Figura exſtat in Tab. Noſtra II. n. 43.

6. Multicolor, exacte conicus, ore patulo canaliculato; labio plicato; foris aſper; in maximis ſpiris denticulatus, & luto, ſub quo ſtabulatur, deformis; intus albus, circa oris aperturam violaceus & nitidus. *Bonann. n. 81. 82.*

7. Undulatus, maculis nigris. *Liſt. Tab. 980. f. 39.*

§. 87. SPECIES II. Aſper:

1. Arachnoides; a cardine ad mucronem miro artificio criſpatus; ore ſubrotundo, coronato. *Bonann. n. 68.*

2. Mangiorum Strombus: Band-boom: craſſus; digitum longus, chalybeus, ſine nitore. *Rumph. Tab. XXX. lit. T.*

3. Clathratus, ſive Bidens:

a. Albus, ventricoſus, ſtriis eminentibus aſper. *Liſt. Tab. 588. f. 47.*

b. Similis, productior, per longum ſtriatus. *Liſt. ib. f. 48.*

c. Similis cylindraceus, per longum ſtriatus. *Liſt. ib. f. 49.*

d. Rufeſcens, ex fuſco; ore promiſſo, & obliquis rectisque ſtriis aſper. *Liſt. ib. f. 50.*

GENUS XI.

TUBA PHONURGICA.

§. 88. TUBÆ PHONURGICÆ nobis dicuntur COCHLIDES CONICÆ ore patulo, cucullato, in ſpira maxima inflatæ.

§. 89. SPECIES I. Toroſa:

1. Pellucida, alba, decem orbium, primo medio acuto, ultimo obtuſo, & ultra vicinum aucto. *Liſt. Tab. 18. f. 13.* Figuram vide in Tab. Noſtra II. n. 44.

2. Tenuis, alba, octo minimum ordinum. *Liſt. Tab.* 20. *f.* 15. Icon exſtat in Tab. Noſtra II. n. 45.
3. Fluviatilis, ſpiris leviter convexis. *Liſt. Tab.* 117. *f.* 12.
4. Spiris acutis anguloſa & undoſa. *Liſt. Tab.* 118. *f.* 13.
5. Ex rufo radiata. *Liſt. Tab.* 9. *f.* 4. & *Tab.* 10. *f.* 5.
6. Carminata; ſeu Buccinum exiguum faſciatum & radiatum. *Liſt. Tab.* 19. *f.* 14.
7. Subflava ex viridi, tenuiore & longiore clavicula. *Liſt. Tab.* 110. *f.* 3. 4.
8. Heteroſtrophus, rufeſcens ex fuſco, ſtriis duabus, in primo orbe eminentibus. *Liſt. Tab.* 37. *f.* 36.

§. 90. SPECIES II. Spiris planis:

1. Faſciata:
   a. Bifaſcis: ſubflava ex viridi; Virginiana, duabus faſciis atro purpureis cincta. *Liſt. Tab.* 113. *f.* 7.
   b. Radiata a ſiniſtra dextrorſum torta. *Liſt. Tab.* 8. *f.* 2.
   c. Tenuis ſubflava, circiter quinque ſpirarum. *Liſt. T.* 8. *f.* 3.
   d. Subviridis, brevibus lineolis ſubrufis, velut faſciatim depicta. *Liſt. Tab.* 109. *f.* 2.
   e. Perlonga, lata; ex rubro faſciata, columella alba. *Liſt. Tab.* 578. *f.* 33.
2. Carminata.
   a. Spiraliter: Atro purpurea; oris vertice (*a*) ſeu roſtro paululum ſinuoſo *Liſt. Tab.* 115. *f.* 10.
   Terreſtris, abrupta, in extremo tota alba. *Liſt. Tab.* 17. *f.* 12.
   Nigra, parva; ex toto lævis. *Liſt. T.* 976. *f.* 32.
   b. In longum: Longitudinalibus lineis & ſpiralibus faſciis inſignis. *Liſt. Tab.* 116. *f.* 11.
   Calloſa (*b*), medio primo ordine leviter acuto. *Liſt. Tab.* 11. *f.* 6.
   c. Bifariam: Atro purpurea, in medio orbe modis obliquis pictus. *Liſt. Tab.* 119. *f.* 14.
3. Flammea, e rufo; ſpirarum quinque tenuium valde productarum. *Liſt. Tab.* 38. *f.* 37.

GE-

(*a*) Vertex *alias eſt* conchæ *extrema ad cardines valvarum pars anguſtior vel acuta, vel obtuſa, vel aduncа, vel aurita, vel umbonata; uſurpatur etiam de ore* cochlidis *roſtrato.*

(*b*) Callum *in teſtis dicimus proceſſum planum craſſiorem.*

GENUS XII.

PSEUDO-STROMBUS.

§. 91. Eſt Cochlis Conica brevis, ore, in ſpira maxima valde lata nec multum ventricoſa, longo, diducto, infra acutangulo, ſupra quaſi reſecto.

§. 92. Spec. I. Carminatus ad imum quemque ordinem, ibidemque eleganter ſtriatus. *Liſt. Tab.* 977. *f.* 33.

Spec. II. Nodoſus inter ſpiras. *Liſt. Tab.* 977. *f.* 34. Icon exſtat in Tab. Noſtra VII. n. 121.

Spec. III. Calloſus, fuſcus. *Liſt. Tab.* 978. *f.* 35.

Spec. IV. Hirſutus, ſinuoſus, faſciatus, roſtro leviter detorto, labii peripheria dentata. *Liſt. Tab.* 967. *f.* 22.

Spec. V. Lævis, lineis ſubflavis ad primum quemque orbem ſtriatum. *Liſt. Tab.* 981. *f.* 40.

Spec. VI. Teſſellatus, lævis, effuſo margine oris lati, ad turbinem teſſellatus. *Liſt. Tab.* 1013. *f.* 77.

Spec. VII. Angyſtomos; ex fuſco faſciatus. *Liſt. Tab.* 963. *f.* 17.

Spec. VIII. Struthio-Camelus, a ſimilitudine cum plumis hujus avis, coloris lactei, maculis igneis rutilus, ore longo, vertice ſinuoſe ſciſſo. *Bonann. n.* 120. Similis labro aſpero *Liſt. Tab.* 838. *f.* 65. faſciis punctatis ex ruſo nigricantibus.

Spec. IX. Mitra papalis, de Paus-kroon / ſpirarum margine per turbinem plicato.

1. Guttis quadratis, intenſe rubris ſuper teſta candidiſſima. Si excellit, antiquum pretium 100. thalerorum meretur. *Rumph. p.* 96. *n.* X. *Tab.* XXIX. *lit.* I.
2. Maculis aurantiis aſperſum habuit *Bonanni p.* 127. *n.* 119.
3. Labio dentato; gravis; maculis croceis majuſculis faſciata, *Liſt. Tab.* 839. *f.* 66.
4. Labio ſimplici; gravis; maculis ſanguineo-croceis. *Liſt. Tab.* 839 *f.* 67.
5. Labio ſimplici, magnis maculis croceis inter faſcias albas teſſellata. *Liſt. Tab.* 840. *f.* 68.
6. Punicea, minor; Mini Paus-kroon; ſpiris minus plicatis, maculis nigro-cruentis. *Rumph. p.* 97.
7. Minima, rubra; albis flammis. *Rumph. ibid.*
8. Aduſta; parva; lævis; ſulcata; maculis ruſis *Rumph. ib. n.* XI.

Spec. X. Mitra Episcopi; [illegible]; [illegible]; (si maculæ sint aurantiæ) ore dentato; maculæ plerumque rubræ, magnæ. *Rumph. p. 97. n.* XI. *Tab.* XXIX. *lit.* K.

Spec. XI. Angustus; subrufus; leviter striatus. *List. Tab.* 819. *f.* 33.

Spec. XII. Clathratus (*a*), variegatus ex fusco; striis lævibus. *List. Tab.* 821. *f.* 40.

Spec. XIII. Amarala. Laholun. Lahorun. [illegible]. Testa tenuis subcinerea; spiris ventricosis, coronæ instar, per plicas, muricatis. *Rumph. Tab.* XXXIII. *lit.* F. F. Rivier Miter Shell. [illegible] *Belg.*

Spec. XIV. Fasciatus; striatus & dentatus. *List. Tab.* 820. *f.* 37.

Spec. XV. Sanguinolentus; striatus; & sanguineis guttis radiatus. *List. Tab.* 822. *f.* 38.

Spec. XVI. Cancellatus (*b*). *List. Tab.* 822. *f.* 39.

(*a*) Clathratus *idem quod* cancellatus *notat texturam retiformem, instar cancellorum ferreorum apud veteres. Inde clathrum, opus cancellosum, quo lineæ testarum reticulatim componuntur.* Columna de purp.

(*b*) *Vide* clathratus.

GENUS XIII.

DIPSACCUS.

§. 93. Est Cochlis Conica, paucis spiris producta; ore longo, in extremitate sinuose exerto, & abhinc sulco notabili versus dexteram circumscripto, ubi ad scapum sinus longus & profundus patet. Quasi duplex saccus.

§. 94. Spec. I. Lævis; varie luteus, labio dextre albo; spiris fere obliteratis. Buccinum breviroſtrum, læve, sinu ad Columellam longo, angusto, profundo. *List. Tab.* 974. *f.* 29.

Spec. II. Tessellatus:

a. Ventricosus; candidus; tesseris rubris, vel castaneis, pictus. *Bonann. n.* 70.

b. Ventricosus; lævis; croceis maculis magnis, ex triplici ordine fasciatim pictus. *List. Tab.* 981. *f.* 41. Picturam vide in Tab. Nostra II. n. 46.

Spec. III. Eburneus; *Bonann. n.* 149.

Spec. IV.

SPEC. IV. Nebulatus:

a. Simplex; ex croceo. *Liſt. Tab.* 982. Icon exſtat in Tab. Noſtra II. n. 47.

b. Fimbriatus; *Liſt. Tab.* 983.

GENUS XIV.

AURIS MIDÆ.

§. 95. Sub hoc nomine intelligimus COCHLIDES ex ventre longo, ovali conico, decurrentes, quæ ad latus formant os amplum, auriforme, & productum. Reuze-Oor.

§. 96. SPEC. I. Ore lævi

1. Faſciata; parva; roſtro integro; tenuiter ſtriata, clavicula paulo productiore. *Liſt. Tab.* 835. *f.* 58. (*a*)

SPEC. II. Ore dentato

1. Incarnata; in ventre rugoſa (*b*); in mucrone ex faſciis adſtrictis turbinata, livida & granulata; Midas Oor. *Rumph. p.* 107. *Tab.* XXXIII. *lit.* H. H. *Liſt. Tab.* 32. *f.* 30. Figuram vide in Tab. Noſtra VII. n. 122.

2. Faſciata; bidens; *Liſt. Tab.* 834. *f.* 59.

(*a*) Liſter. *unicum dentem ad Columellam eſſe ait, quem deprehendere non potui.*

(*b*) Rugoſus *ſeu corrugatus*, runtlich, *cujus ſuperficies cutem ſenilem imitatur.*

GENUS XV.

NASSA.

§. 97. NASSA dicitur corbis conice plexa ex viminibus, qua capiuntur anguillæ; ſimili figura gaudent quædam Cochlides graciles, acute conicæ; ore patulo, longo.

§. 98. SPEC. I. Roſtrata, ſive ore acuto; aliquando oſtrino (*a*) diluto tincta,

(*a*) *Color* oſtrinus *aſſimilatur cerafis nigricantibus;* Kirſchbraun, *communiter.*

tincta, nonnunquam vinosa, interdum ossibus similis. In singulis orbibus instar aurantii decorticati videtur in plures æquales partes dissecta, quas fasciola plana eleganter distinguit. *Bon. n.* 45. Icon exstat in Tab. Nostra VII. n. 123.

SPEC. II. Fissa, seu Strombus astragaloides inter toros. *Bon. n.* 110.

GENUS XVI.

TEREBELLUM.

§. 99. Est COCHLIS CONICA, gracilis, altera parte teres & aperta, altera acute conica; veluti ex quadam fascia testacea figurata.

§. 100. *Synon.* Avena marina; Folium arboris conglomeratum; Arundo palustris. De Boon.

§. 101. SPEC. I. Pullum, nigris venis nonnunquam micans, nonnunquam album; tenue & læve. Salire dicitur ex aqua per arcum. *Rumph. Tab.* XXX. *lit.* S.

SPEC. II. Folium arboris conglomeratum. *Bonann. n.* 57.

SPEC. III. Punctatum. De gestippelde Boon *Belg. List. Tab.* 736. *f.* 30. & *Tab.* 737. *f.* 32. Icon exstat in Tab. Nostra II. n. 48.

SPEC. IV. Album *Mus. nostri.* De witte Boon.

SPEC. V. Striatum; de gestreepte Boon. *List. Tab.* 736. *f.* 31. Figuram exhibet Tab. Nostra II. n. 49.

SPEC. VI. Flammeum. De geblamde Boon. Rhombus major, strictior, undatus & fasciatus, clavicula acuta, & producta. *List. Tab.* 722. *f.* 9.

SPEC. VII. Fasciatum, zonis mustelinis (*a*), super albo. *Bon. n.* 369.

SPEC. VIII. Patens, columella fusca. *List. Tab.* 729. *f.* 17.

(*a*) *Color* mustelinus, *qui in* Mustelis, *luteo pallens.*

CLASSIS VI.

COCHLEA.

§. 102. COCHLEÆ (§. 1.) sunt COCHLIDES SIMPLICES (§. 3.) CONIS (§. 62.) obtusis & inclinatis quodammodo similes, spiris pluribus, iisdemque excentricis, contortæ.

GE-

GENUS I.

COCLEA LUNARIS.

§. 103. COCHLEÆ LUNARES ſunt breves; acutæ; ore rotundo, fimbriato; ad ſiniſtrum labiato: ori impoſitæ ſcapum (*a*) horizonti fere parallelum ſiſtunt.

§. 104. *Synon.* Oculus Lunæ. Maans Oogen. Ab operculo rotundo, vulgo dicto: Umbilico marino.

§. 107. SPEC. I. Nodoſa, major; Matta bulanbeſaar. Mattalemboe. Alp. kruik. Cochlea margaritica. Knobbelhoorn. Ad magnitudinem duplicis pugni excreſcens. Ore eſt patulo rotundo, ad ſiniſtram labiato, ventre nodoſo, anguloſo. Teſta ſub cruſta ſcabra; in ſimpliciſſimis lamellis opalina. *Rumph. Tab.* XIX. *lit.* A. B. Het groot Maans Oog / het Ruygen Oog / de bonte Knobbelhoorn *Belg.* Figuram vide in Tab. Noſtra VII. n. 124.

SPEC. II. Viridis; de groene Knobbelhoorn / nodoſæ ſimilis; *Rumph. p.* 69.

SPEC. III. Cinerea; a curioſis poſthabita. *Rumph. ib.*

SPEC. IV. Exigua, æqualis ungui humano; coloris terrei, intus parce perlata. *Rumph. ibid.*

(*a*) Scapus *ſive* Columella, clavicula.

GENUS II.

COCHLEA CÆLATA.

§. 106. Eſt COCHLEA VENTRICOSA, ſpiris pulvinatis acute turbinata; ore rotundo ſimplici, excentrico; cui impoſita apice ſuo valde inclinat.

§. 107. *Cælata* Jonſtono dicitur *Tab.* XII. quia cælaturis & mucrone muricato aſpera eſt. Tegitur craſſo & ſcabro cortice coloris lutei, tanquam tritici, ferreoque munimento loricata; in quo innumeri pulvilli, ſtriges, ſquamulæ & filamenta criſpata, adeo pulchro ordine diſpoſita apparent, ut opus phrygium (*a*) in rudi corio pictum

(*a*) Phrygium *opus eſt tela bombycina undulata*; gewäſſert Seiden-zeug.

pictum videatur. In decorticato tubercula seu tympana margaritica spirales circumvolutiones constituunt sensim minores.

§. 108. Species valde variant. Quæ apud autores comparent exempla singularia, sunt dissimilia, non sine superflua subtilitate ad species revocanda. vide *Bon. p.* 114. *num.* 11. 12. 13. & *Listeri* Trochos *Tab.* 647. *f.* 40. 41. Figuram exhibet Tab. Nostra II. n. 50.

GENUS III.

COCHLEA PETHOLATA.

§. 109. Est Cochlea minor, ore lunato, fimbriato & labiato; in spiris pulvinatis levibus argute, instar Serpentis *Oelar Pethola*, picta; colore fusco, nigro & albo; raro viridi & puniceo; intus flavide margaritica.

§. 110. *Synon.* Bia-Pethola. Nassauwer / Pethool-hoorn *Belg.*

§. 111. Spec. I. Fasciata diversimode super dorso rotundo. *Rumph. Tab.* XIX. *n.* 5. 6. 7.

Spec. II. Interlinearis, quasi ex pario lapide facta, alba in parte exteriore, sed viridi pellucido obvelata, supra quem colorem maculæ terreæ discriminant lineolas, quibus spiraliter ductis orbes omnes signantur. *Bonann. n.* 320.

Spec. III. Rufescens catenatis aliquot lineis circumdata. *List. Tab.* 584. *f.* 39. Icon exstat in Tab. Nostra II. n. 51.

Spec. IV. Virescens, ex nigredine, rarior; *Rumph. Tab.* XIX. *n.* 1.

Spec. V. Divisa, cujus medium orbem subucularis albus & lævis bifariam dividit, & cum ipso circumvolutus, in secundi orbis commissura deperditur. *Bonann. n.* 335.

GENUS IV.

OLEARIA. (a)

§. 112. Sub hoc titulo descripsit *Bonanni* Cochleam quatuor spirarum testæ crassæ, ex ventre diducto & compresso, leviter anguloso, mucronem

(a) Olearia; *quia hæc Cochlea in usu* oleario *erat;* Rond. & Aldrov.

cronem brevem trium ſpirarum ventricoſarum extendentem, detracto cortice nitide margariticam. Schuec.

§. 113. Spec. I. Umbilicata major, *Bonann. Claſſ.* III. *n.* 9.
Spec. II. Tympanoſa (*b*), margaritica ſub cute muſtelina. *Bon. n.* 406.
Spec. III. *Jonſtoni Tab.* XII. *Rondel. Aldrov.* Figuram exhibet Tab. Noſtra VII. n. 125.

(*b*) *Idem quod ventricoſa.*

GENUS V.

TIGRIS.

§. 114. Eſt Cochlea obtuſa, regularis, ad oris rotundi excentrici fimbriam umbilicata, in qua ſupra colorem eburneum exteriorem atræ maculæ miro ordine diſpoſitæ, ſub cortice lapideo autem argentea ſubſtantia apparet.

§. 115. Spec. I. Malabarica, *Bonann. n.* 29. 30.
Spec. II. Barbadenſis, trochoides. *Liſt. Tab.* 640. *f.* 30. Figuram vide in Tab. Noſtra II. n. 52.

GENUS VI.

FORNAX.

§. 116. Eſt Cochlea ſpiris pulvinatis, obtuſe conica, ex aperturæ rotundæ colore diſtinguenda.

§. 117. Spec. I. Argentea; Groote Silvere Oven (in apertura rotunda velut argentea).
1. Maculoſa ſeu albo nigra. De gepleckte of bonte Silvermond. *Belg. Rumph. T.* XIX. *n.* 3.
2. Viridis major; de groene Silvermond / *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XIX. *n.* 4.
3. Variegata; ex cinereo, viridi & fuſco. *Rumph. T.* XIX. *n.* 2.
Spec. II. Candens; Gold-mund; raro viridis, intus veluti candens. De glotjende Oven of Goudmond *Belg.*
a. Sulcata & ſquamata; maculis nigris; *Rumph. T.* XIX. *lit.* C. Figuram vide in Tab. Noſtra VII. n. 126.
b. Viridis ſulcata & ſquamata; *Muſ. noſtri.*

GENUS VII.

TROCHO-COCHLEA.

§. 118. Est Cochlea per modum trochi conice turbinata, sed in ultima spira ventricosa os laterale diducens, ne ei cochlea fine magna inclinatione queat inniti.

§. 119. Spec. I. Integra:

1. Lævis, maculis nigris per series picta; *List. Tab.* 642. *f.* 33. 34. Figuram exhibet Tab. Nostra II. n. 53. & 54.
2. Fasciis catenatis, ex nigro albidoque, seu vermiculato opere picta. *List. Tab.* 643. *f.* 35.
3. Variegata, ore dentato, fasciis granulatis. *List. T.* 645. *f.* 37.
4. Rubra dentata, nigris juncturis. *List. Tab.* 637. *f.* 25. Trochus fasciis verrucosis ex rubro albo nigroque alternatim pebelle distinctis. *Petiv. Gaz.* II. *Tab.* 14. *fig.* 10.
5. Granulata, fasciata, dentata, ex fusco varia. *List. Tab.* 638. *f.* 26.
6. Unidens; Trochilus striatus, clavicula tenui, acuta. *List. Tab.* 654. *f.* 54.
7. Umbilicata; Buccinum umbilicatum, *List. Tab.* 28. *f.* 26.
8. Labio plicato; guttata, super striis nodosa; *List. T.* 584. *f.* 42.

Spec. II. Undata & umbilicata.

1. Plana; ex rubro undatim late radiata. *List. Tab.* 641. *f.* 32.
2. Striata; undata, ex fusco densa radiata; parva. *List. Tab.* 641. *f.* 31.

GENUS VIII.

SACCUS.

§. 120. Est Cochlea gibba, vasti ventris, ore rotundo, diducto, ad dextram labiato; turbine brevi excentrico.

§. 121. Spec. I. Ore infra fisso:

1. Hiulcus, *Lister. Tab.* 587. *f.* 48.
2. Fasciatus, *List. Tab.* 584. *f.* 40. Icon exstat in Tab. Nostra II. n. 55.
3. Striatus, guttatus; *List. Tab.* 576. *f.* 29. 30.

Spec. II.

SPEC. II. Ore integro:

1. Striatus & undatus, lineis rufis obliquis. *List.* *T.* 583. *f.* 37.
2. Sublividus, lineis nigris, undatis, distinctus. *List.* *T.* 583. *f.* 38.
3. Cochlea vivipara, fasciata, rugosa. *List.* *T.* 126. *f.* 26.
4. Rufescens, striata, nodosa, granulata. *List.* *T.* 584. *f.* 41.
5. Umbilicata; inter strias tessalata; fasciata; subviridis; ore intus striato. *List.* *Tab.* 586. *f.* 45.

SPEC. III. Ore circum circa fimbriato.

1. Nigricans, dense & leviter striatus. *List.* *Tab.* 585. *f.* 43.
2. Sublivida, terrestris, striis nodosis & interdum muricatis. *List.* *Tab.* 30. *fig.* 28.

CLASSIS VII.

BUCCINUM.

§. 122. BUCCINA sunt Strombi, in ventrem ultimæ spiræ globosum & vastum dilatati; ore subrotundo, breviter canaliculato.

§. 123. Sunt ergo verorum Buccinorum (*a*) Characteres; I. Venter globosus. II. Os subrotundum; III. Canaliculus brevis; IV. Mucro Strombi-formis.

(*a*) *Circa quæ hallucinationes innumeræ apud autores.*

GENUS I.

BUCCINUM TRITONIS.

§. 124. Hoc nomen adhæret BUCCINIS maximis, quibus *Mauri*, *Tartari*, imo & *Itali* loco Tubæ sonoræ utuntur.

§. 125. *Synon.* Bia Trompetta; Krang Scroney; Kima Taburi. *Chinensibus*: Tsjasku; Linkieuw; Leqpepa. Kinkhoorn *Batavis.* Ding-hörner. Blas-Posaunen-hörner.

§. 126. SPEC. I. Pennatum, mucrone granulatis cingulis constricto; ore subrotundo, labio inciso & dentato, intus nitide rubro. *Rumph.* *Tab.* XXVIII. *lit.* B. *Bon.* *n.* 188. De Tritons Hoorn of Trompet *Belg.*

SPEC. II. Variegatum ac striatum *Fab. Columnæ*; per ventrem similariter fasciatum, striatum & elegantissime marmoratum,

utroque oris labio ſemilunato & breviter canaliculato. *Liſt. Tab.* 959. *f.* 12.

Spec. III. Nebulatum (*a*), ex rufo maximum, ventricoſum, nodoſum. *Liſt. Tab.* 960. *f.* 13.

Spec. IV. Minus, crocei vel aurei coloris; **het Oranje Trompetje**; *Muſ. Esgerſiani.* Figuram vide in Tab. Noſtra VII. n. 127.

(*a*) Nebulatum *Liſtero ſive* nubeculoſum *i. e. nubes maculis imitans.*

GENUS II.

ARGO-BUCCINUM.

§. 127. *Argo* tribuuntur plures oculi (*a*). Dicimus ergo Argo-Buccinum teſtam hujus generis, ſpiris pulvinatis in apicem toroſum elongatam; labio parum exerto, & canaliculato, cujus ſuper coſtulas fuſcas apparent multæ maculæ rotundæ oculis aſſimilatæ. Teſta elegans.

§. 128. Spec. I. Faſciatum; **de gebande Argus Oog**; *Schynvoetii ad Rumph. p.* 161. *Tab.* XLIX. *lit.* B. Icon exſtat in Tab. Noſtra VII. n. 128.

(*a*) Oculata *dicuntur, quæ habent* (1) *maculas albas rotundas ſuper tergo obſcuro,* (2) *circellos in medio pallidiores.*

GENUS III.

COPHINO-SALPINX.

§. 129. Κόφινος dicitur Corbis, & Σάλπιγξ Tuba. Eſt ergo nomen compoſitum Cophino-salpinx proprium iis Buccinis, quæ Corbis inſtar contexta apparent.

§. 130. Spec. I. Carduus; **Diſtelhoorntje**. Buccinum cancellatum & totum aculeatum, coloris caſtanei. *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* N.

Spec. II. Exiguum; ſtriis ſemilunaribus; plerumque album vel plumbeum, aliquando flaveſcens, & violaceum dilutum; raro punctis fulvis & rufeſcentibus aſperſum. *Bonann. n.* 34.

Spec. III. Oſſeum, parvum, ubique ſinuoſis lineis tam bene ſulcatum, ac ſi eſſent ſcalpro inciſæ. *Bonann. n.* 35.

Spec. IV. Nigrum, parvum, leviter ſtriatum. *Liſt. T.* 976. *f.* 31.

Spec. V.

Spec. V. Dentatum majus, labio ſiniſtro calloſo, dextro leviter dentato, & in canaliculum incurvato. *Liſt. Tab.* 1022. *f.* 86.

Spec. VI. Dentatum minus; *Liſt. Tab.* 939. *f. alt.* Icon exſtat in Tab. Noſtra III. n. 56.

Spec. VII. Granulatum, planum, recens piloſum; coloris albi; faſcia media rubra vel nigra. *Rumph. p.* 97. *n.* XIII.

Spec. VIII. Granulatum rotundum, ventre convexo; coloris albicantis, de Kpſtenbyp-hoorn/ quoniam grumo orizæ coctæ ſimilis. *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* M. Vocatur quoque de gehaverde kleene Trompet *Belg.*

Spec. IX. Ore fimbriato, plicato; cujus cochleati orbes ſimul connectuntur ligula, variis in locis contexta; modo foris educta, & in veſtem reticulatam compoſita; Ligula eſt furva; Teſta ferruginea. *Bonann. n.* 73.

GENUS IV.

BUCCINUM LACERUM.

§. 131. Lacerum dicimus Buccinum, cujus os ad canaliculum in lacinias diſtenditur.

§. 132. Spec. I. Craſſum; rufum; undatum; *Liſt. de Cochl. p.* 156. & *Hiſt. Tab.* 962. *f.* 14. *Bonann. n.* 189.

Spec. II. Lævè; undatum; tenue; *Liſt. de Cochl. p.* 157. & *Hiſt. Tab.* 962. Icone Cochleæ minoris, quæ eſt prope f. 15. A. Figura exſtat in Tab. Noſtra III. n. 57.

Spec. III. Striatum, turbine undoſe dentato. *Liſt. T.* 958. *f.* 11. Vide Figuram in Tab. Noſtra III. n. 58.

Spec. IV. Recurviroſtrum claviculatum album, lævе; *Liſt. Tab.* 1020. *f.* 83.

GENUS V.

BUCCINUM MURICATUM.

§. 133. Definitio patet ex nominibus jam definitis.

§. 134. Spec. I. Hector; manum longa teſta; in ventre & mucrone tuberculoſa; ignave alba; intus candida; ad inſtar porcellanæ; labio intricato. *Rumph. Tab.* XXVIII. *lit.* C. *Bonann. n.* 103. De gedubbelde Kinkhoorn/ de dubbelde of gebulte Olphoen/ *Belg.*

SPEC. II. Ajax. Buccinum tuberosum, rufum, *Rumphii*; tuberculis in dorso & mucrone frequentibus, tartareum, in verrucis nigrum, ore rotundo, plicato, rubro. Alias Honka. Indorum amuletum bellicum. *Rumph. Tab.* XXVIII. *lit.* D. Buccinum recurvirostrum, claviculatum, majus, aculeatum, ore croceo utrinque dentato. *List. Tab.* 1023. *f.* 88. De rood geknobbelde Kinkhoorn / de enkelde Olyphoek *Belg.* Icon exstat in Tab. Nostra III. n. 59.

SPEC. III. Crustula oleaginea. De ongemeene Olyphoek-hoorn. Buccinum, gyris ventricosis, insigniter elongatum, nodosum, rugosum, plicatum, breviter rostratum, labio exerto, crasso. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* I.

SPEC. IV. Lapideum; lapideis costis ita munitum, ut ipsi testæ super impositæ videantur, ac claviculo firmatæ; coloris cinerei, terrei, conchyliato diluto & caltheo (*a*). *Bonann. n.* 105.

SPEC. V. Variegatum; labio duplicato, striis inæqualibus. *List. Tab.* 934. *f.* 29.

(*a*) Calthæ *palustri concolor*; gelb / wie Butter-blumen.

CLASSIS VIII.

TURBO.

§. 135. TURBINIS nomen *vagum* est; liceat autem assignare Cochlidibus simplicibus, inter *buccina* & *cochleas* ambigentibus; i. e., quæ nec his nec illis, propter oris, ventris aut mucronis structuram conveniunt.

GENUS I.

URCEUS.

§. 136. URCEI sunt Trochi in ventrem inflatum & oblongum producti, qui mucrone sursum verso urceos repræsentant ventricosos, iis similes, quos medios inter collaterales, ornatus gratia, collocamus. Venter cochlidis comparatur vasculo; mucro seu trochus insidens operculo. Vulgo ad Buccina reducuntur; sed minus circumspecte; quia inter utrumque genus manifesta est differentia.

§. 137. SPEC. I. Ore integro, subrotundo, ad dextram labiato.

1. Vi-

1. Vitreus; grandiusculus, testæ tenuissimæ, transparentis, cujus venter obtuso mucrone ex spiris planis formato duplo longior, in juncturis crenatus, intus lacteus; ad sinistram lividus, extra super lacteo, fusco colore flammatus. *Bonann. n.* 192. De Fransche Belhoorn of St. Malosche Hoorn *Belg.*
2. Vermiculatus, exiguus; instar seminis citri induitur veste alba, punctis purpureis aspersa, maculis amaricinis (*a*) notata & lineolis flammeis & inflexis picta. *Bonann. n.* 176.
3. Vittatus (*b*), æqualis priori, triplici serie macularum albescentium, quorum medietatem lunaris color circumit, paulatim vinosus, puniceis punctis aspersus. *Bonann. n.* 179.
4. Fimbriatus; quatuor spiris intortus, quas saxea & subrotunda vincula nectunt. Hæc alba sunt, illæ autem aut vinosæ aut subflavæ; utraque vero fasciis conchyliatis (*c*), vel coracinis (*d*) vittata. *Bonann. n.* 278.
5. Doliolum; *Listeri Tab.* 827. *f. ult.* (49. e.) a figura ventricosa, ore angusto; parvum; vid. *Phil. Trans. Vol.* XXII. *n°.* 274. *p.* 930.
6. Νηριτοίδες *Fab. Col.* ventricosior, fasciis ex nigro purpurascentibus, ad tergum undatis, columella purpurascente. *List. Tab.* 579. Figuram vide in Tab. Nostra III. n. 60.
7. Ovalis; super striis undatus. *List. Tab.* 814. *f.* 24.
8. Rugosus; wydmondige Pimpeltje; striis spiralibus asperis; coloris nigricantis; testa crassa, labio tenui, trocho longiusculo; *Rumph. Tab.* XXIV. *lit.* D.
9. Costosus, seu Oculus Cæsius, *Bonanni n.* 77.
10. Lamellatus; exiguus; *Bonann. n.* 177.
11. Undatus, seu spinose inflexus, *Bonann. n.* 178.
12. Purpureus; cui vestem phrygiam, meandris intertextam, formant colores purpurei; *Bonanni n.* 181.
13. Spinosus; Valvata spinosa *Rumphii.* Rivier Doorntje.
    a. Major, terrei coloris, *Rumph. Tab.* XXII. *lit.* O.
    b. Minor, nigra. *Id. p.* 79.
14. Crenulis transversis asper, *Bonanni n.* 62.

15. Py-

(*a*) *Color* amaricinus; majoran-farbe.
(*b*) Vitta *proprie fascia circa caput; sæpius notat fasciam quamque.*
(*c*) Purpurfarb.
(*d*) *Corni nigredine tinctus.*

15. Pyriformis, ſquamatus, coloris cinerei. *Bonann. n.* 51.
16. Ore plicato integro, duplici ſinuum ſerie muricatus. *Liſt. Tab.* 943. *f.* 39.

§. 138. Spec. II. Ore integro acuminato.

1. Syracuſanus, mucrone acuto, cochleato; calice ventricoſo, nunc albus, mucrone nigro; nunc flavus, rubeus, ſanguineus, tophaceus; diverſimode mixtus. *Bonann. n.* 33.
2. Punctatus, ſuper oleacino (*a*) albo, nitente. *Bon. n.* 49.
3. Cinereus, ſinuoſe productus cum ſtriis nigricantibus. *Bon. n.* 38.
4. Mucronatus, cujus turbo ex plana ventris ſpiralis & aculeati baſi eminet. *Rumph. Tab.* XXIV. *n.* 6.
5. Aculeatus, brevibus & ſine ordine diſpoſitis aculeis, faſciis inſuper albis cinctus; colore tyrio (*b*) in nigrum abeunte. *Bonann. n.* 295.
6. Buccinum folioſum, exiguum, tenue; ventre rotundo, mucróne ventricoſe elongato; gyris ſtriatis; coloris cinereo-viridis, micis nigris. *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* Y. Het Blad boomtje *Belg.*

Spec. III. Ore canaliculato recurvo.

1. Faſciatus; non tantum ſuper ventre elongato, ſed & in conjunctione Trochi humilioris. *Rumph. Tab.* XXIV. *n.* 3. De glabbe Schilpadſtaart of Beddeteik *Belg.*
2. Tympanoſus; ſpinis rugoſis.
   a. *Rumphii Tab.* XXIV. *n.* 5. & *Liſteri Tab.* 956. *f.* 8. De gekroobbelde Beddeteik *Belg.*
   b. Echinophora eſculenta, coloris tophacei, *Bonanni n.* 19. *Liſteri* buccinum muricatum, ventricoſum; Cochlea Echinophora *Rond.* apud *Aldrov. Liſt. Tab.* 1003. *f.* 68. Burſa nodoſa; *Petiv. Gaz.* 89.
3. Compreſſus, aculeatus;
   a. In concurſu ſpirarum dentibus caninis aſper, ad mucronem plicatus vel rugoſus, talis & in teſta media; *Rumph. Tab.* XXIV. *n.* 4. De getalte baſtaard Beddeteik *Belg.*
   b. Buccinum ſtriatum, aculeatum, nodis (*c*) compreſſis, ſubacutis; *Liſt. Tab.* 957. *f.* 10.

4. Fim-

(*a*) Oleacinus, Oliven-farb.
(*b*) Tyrius *i. e. violaceus.*
(*c*) Nodoſa *Liſterus minus accurate dicit, quæcunque minutis apicibus exaſperantur, ſive ſint dentata ſive granulata.*

4. Fimbriatus:
   a. Canarium nodoſum; labio fimbriato; trocho alato, plicato; dorſo gibboſo, coloris cinerei, micis nigricantibus; *Rumph. Tab.* XXXVII. *lit.* T. De gebulte Canary. (*a*)
   b. Canarium floſculoſum (a pictura ita dictum) trocho cochloide; dorſo nodoſo; labio fimbriato. *Rumph. Tab.* XXXVII. *lit.* W. De gebloemde Canary.

(*a*) Canarium *vid.* §. 146.

§. 139. Spec. IV. Ore ad canaliculum ſinuoſe reflexo.
1. Clathratus, quatuor ſpirarum, intus lividus, foris reticulatis floſculis ſuperinductus, inter quos roſeus color rubeſcit. *Liſt. Tab.* 984. *f.* 43.
2. Labroſus; ore ſubcroceo; roſtro umbilicato. *Liſt. T.* 990. *f.* 51.

Spec. V. Ore alato, ſive, labio exſerto.
1. Faſciatus; de gebande Canary; mucro cochleatus, nodoſus; corpus canaliculatum, leviter alatum ſuper albo: exterius faſciis flavis cinctus; intus ex violaceo radioſus. *Rumph. Tab.* XXXVII. *lit.* V.
2. Lunatus; priori ſimilis, ſed ad mucronem lunatus, ſinuoſus; Buccinum bilingue; *Liſt. Tab.* 897. *f.* 1.
3. Gibboſus & rugoſus; flavidi coloris, *Bonann. n.* 150.
4. Columba; colore & turbine priori ſimilis, ſed figura columbam ovis incubantem repræſentans. *Bonann. n. eod.*

GENUS II.

LAGENA.

§. 140. Lagenis adſimilamus Turbines breves, ventricoſos, qui oris configuratione collum anſatum referunt. Scapus videlicet collum anguſtatum, labium oris anſam imitatur. Differunt *Lagenæ* ab *Urceis*, quod in his Trochus apparet diſtinctus, qui in Lagenis eſt ventri continuus. Ἀσγεῖα. Bouteille.

§. 141. Spec. I. Ore ſemilunato.
1. Toroides; labio dentato. *Liſt. Tab.* 940. *f.* 36. Figura exſtat in Tab. Noſtra III. n. 61.
2. Breviroſtrum parvum; ſtriatum, aſperum; ex ſubcroceo variegatum. *Liſt. Tab.* 953. *f.* 2.

3. Similis, ex albo & nigro variegata. *Liſt. Tab.* 953. *f.* 3.
4. Craſſa, fuſca, tenuiter ſtriata. *Liſt. Tab.* 963. *f.* 16. & *Tab.* 831. *f.* 55.
5. Compreſſa, labio duplicato, ſtriata, aculeata. *Liſt. Tab.* 995. *f.* 58.
6. Dentata; *Liſt. Tab.* 995. *f.* 59.
7. Labio duplicato, ſtriis tenuioribus, eminentibus, rufis. *Liſt. Tab.* 938. *f.* 33.
8. Diſtorto leviter roſtro. *Liſt. Tab.* 968.
9. Tympanoſa, dentata, roſtrata, clavicula muricata; *Liſt. Tab.* 828. *f.* 50.
10. Marmorea, ob teſtam ponderoſam & albam. Crumena Gallorum. *Bonanni n.* 194.

Spec. II. Ore longo, anguſto.

1. Buccinum dentatum parvum, faſciis albis & nigris alternatim pictum. *Liſt. Tab.* 826. *f.* 47.
2. Ruſa, exiguis maculis albis, rictu ſubpurpureo. *Liſt. Tab.* 826. *f.* 48. 49.
3. Undoſa & dentata. *Liſt. Tab.* 827. *f.* 49. a.
4. Phrygie picta & dentata. *Liſt. Tab.* 827. *f.* 49. b. An, Olivaris Barbadenſis vix dentatus, ex albo & caſtaneo reticulatus, clavicula cæruleſcente? *Pet. Gaz. Tab.* 30. *f.* 6.

GENUS III.

SIMPULUM.

§. 142. Simpulum audit vaſculum ſacrificale antiquum. Metaphorice nomen uſurpamus de Urceis recurviroſtris, qui oretenus inſpecti ejusmodi Simpulis antiquis apparent ſimiles. Canaliculus enim inflexus ex ventre turgido aſſurgens, collum roſtratum vaſculi anſati exprimit. Alias Conchylium *Aldrovandi.*

§. 143. Spec. I. Toroſum, majus, ſeu Buccinum roſtratum læve, labro ſimplici, undoſo; alte ſtriatum ad intervalla. *Liſt. Tab.* 932. *f.* 27. Minus *Liſt. Tab.* 933. *f.* 28. Cujus figuram vide in Tab. Noſtra III. n. 62.

Spec. II. Rugoſum, turbine undoſo, labio ſtriato; *Liſt. Tab.* 935. *fig. altera minore* (30. b.)

Spec. III.

Spec. III. Maximum omnium. *Liſt. Tab.* 936. *f.* 31. *Bon. n.* 289. Figura exſtat in Tab. Noſtra III. n. 63.

Spec. IV. Clathratum, ſulciis teſſellatis & oculatis. *Liſt. Tab.* 935. *fig.* (30. a.) *Bonann. n.* 193.

Spec. V. Faſciatum; ore angustiore, ſulciis eminentibus. *Liſt. Tab.* 937. *f.* 32.

Spec. VI. Achatinum; [illegible]. Eſt quaſi cochlea lunaris roſtrata, labio effuſo in roſtrum bene recurvum productio, intus ſtrigato, & in limbo leviter dentato; extra inter maculas fuſcas alba, vittata. *Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* H. *Bonann. n.* 187. *Liſt. Tab.* 911. *f.* 2.

Spec. VII. Lineatum, grande, in ima parte cujusque ſpiræ tantum ſtriatum, labro producto, in ambitu denticulato. *Liſt. T.* 910. *f.* 1.

Spec. VIII. Tenue, ſtriatum, bilingue. *Liſt. Tab.* 859. *f.* 16.

GENUS IV.

GUTTURNIUM.

§. 144. Hoc nomen convenit Turbinibus Urceiformibus, aliquatenus compreſſis, utrinque fimbriatis, ideoque velut anſa præditis, quibus roſtrum tubuloſum recurvum eſt. Propter ſimilitudinem GUTTURNIA, ſeu vaſcula dicta, ex quibus aqua lavandis manibus deſtillat.

§. 145. Spec. I. Ranula; [illegible]; Kaulfuß. Koogſtaart. Coloris pulli, ſpiris rugoſis & nodoſis; labio fimbriato & nodoſo, canaliculo elongato. *Rumph. Tab.* XXIV. *lit.* H. Figuram exhibet Tab. Noſtra III. n. 64.

Spec. II. Cercopithecus. [illegible]; teſta exigua; rugoſa; hiulca; cretata; canaliculum, ut Cercopithecus caudam, curvans. *Rumph. p.* 82. *n.* VIII.

GENUS V.

CANISTRUM.

§. 146. CANISTRUM dicitur corbicula, quam fœminæ ex manibus ſuſpenſam circumferunt. Cum ei aliquo modo adſimilentur Turbines obtuſe conici, ore ſubrotundo ad figuram [illegible] accedentes, nomen CANISTRI iis impoſuimus, ſecuti *Rumphium*, qui quandam Cochli-

des dixit Canaria barbaro nomine nusquam reperiundo, quod forte Caniſtrum ſcribere voluit.

§. 147. SPEC. I. Album, unica faſcia nigra. *Liſt. Tab.* 13. *f.* 8. Icon exſtat in Tab. Noſtra III. n. 65.

SPEC. II. Subflavum, ſuperiore orbis primi parte faſciatum. *Liſt. Tab.* 33. *f.* 31.

SPEC. III. Bidens, *Liſt. Tab.* 31. *f.* 29.

SPEC. IV. Citrinum, ſex orbium, albo ore. *Liſt. Tab.* 34. *f.* 33.

SPEC. V. Flammeum ex rufo. *Liſt. Tab.* 35. *f.* 34.

SPEC. VI. Septem orbium, *Liſt. Tab.* 108. *f.* 1. an Buccinum perſicum olivare, *Petiv. Gaz. Tab.* 17. *f.* 4?

SPEC. VII. Rufeſcens ex fuſco, lineis undatis, albis. *Liſt. Tab.* 583. *f.* 36.

SPEC. VIII. Sulcatum, unidens; coloris cinerei. *Bonanni n.* 140.

GENUS VI.

SCALA.

§. 148. Dicitur per metaphoram Cochlis ſimplex, cujus ſpiræ intra coſtulas, ſive clathrum longitudinale, SCALARUM more decurrunt.

§. 149. *Synon.* Buccinum ſcalare; Wenteltrap / Windeltreppe. Royal Stair Caſe.

§. 150. SPEC. I. Genuina, cujus ſpiræ ventricoſæ, nonniſi per coſtas longitudinales cohærent. Nonnunquam 500. flor. belg. carius æſtimatur. *Schynvoet ad Rumph. p.* 161. *Tab.* XLIX. *lit.* A. De oprechte Wenteltrap.

SPEC. II. Spuria, Baſtaard Wenteltrapje.

a. Coſtis variis aſpera. *Liſt. Tab.* 588. *f.* 51. Figuram vide in Tab. Noſtra III. n. 66.

b. Spongiarum, frequens in Mari Adriatico. *Bonanni n.* 111. *Jonſton Tab.* XI. *f.* 9. an eadem *Rumphii p.* 98. *Tab.* XXIX. *lit.* W.?

GENUS VII.

EPIDROMUS.

§. 151. EPIDROMUS dicitur malus ad puppim, cui velum pulvinatim adſtringitur. Per metaphoram hoc nomen *Rumphius* tranſtulit ad Tur-

Turbines per modum Strombi torosi acute elongatos ex ventre oblongo leviter convexo, labiis callosis sive fimbriatis.

§. 152. Spec. I. Buccinum sulcatum maculosum *Schynvoetii*, de geboorende Slakhoren. Strombus grandiuscule longus per ventrem adstrictum in canaliculum terminans, super rugis longitudinariis maculatus; *Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* G.

Spec II Arachnoides, in spiris veluti malleolo frequenter compressus, intus albus, labiis reflexis, *Bonanni n.* 48.

Spec. III. Coronatus in exitu spirae maximae, pinnulis, veluti in disco positis & multiplicatis; *Bonanni n.* 59.

Spec. IV. Maculosus, in junctūris spirarum lævis, labio lata fimbria cinctо, maculis candidis & sanguineis modo distinctis, modo flavo & cyaneo colore fusis, modo notis candidis super osseo colore pictis. *Bonanni n.* 63.

Spec. V. Semi-striatus; prima spira lævi, reliquis striatis; ore quater fimbriato, coloris lividi, interdum albi. *Bonanni n.* 60.

Spec. VI. Dentatus, variegatus, leviter admodum striatus. *List. Tab.* 926. *f.* 19. Pictura exstat in Tab. Nostra III. n. 67.

Spec. VII. Oculatus; *List. Tab.* 929. *f.* 24.

Spec. VIII. Samaar, sive Buccinum parvum, strombo acuto, labio fimbriato; ventre oblongo, ad mucronem plicato; coloris varii. *Rumph. Tab.* XXXVII. *lit.* Y.

Spec. IX. Canadensis; Buccinum bilingue; labro lævi; ex inferiore parte muricato; clavicula dense admodum striata, longa, tenui. *List. Tab.* 855.

Spec. X. Striatus & undatus. *List. Tab. ead.*

GENUS VIII.

SIPHO.

§. 153. Siphones dicimus Turbines acute conicos, longos, in os pariter longum terminantes, cujus inspecti scapus collum Siphonis angustum, labium ansam repræsentat.

§. 154. Spec. I. Lævis.

1. Crassus, orbibus pulvinatis. *List. T.* 913. *f.* 4. 5. Figura videatur in Tab. Nostra III. n. 68.

2. Tiburtinus, colore similis lapidi Tiburtino. *Bonann. n.* 53.

Spec. II. Striatus

1. Puſtus, admodum tenuiter ſtriatus, exiguus, unica faſcia nebulata medio orbe cinctus. *Liſt. Tab.* 912. *f.* 3.
2. Dentatus in labio oris, lævitер ſubrufus, faſciis interfectis ſive teſſellatis. *Liſt. Tab.* 922. *f.* 41. Jamaicenſis.
3. Teſſellatus in ipſis faſciis. *Liſt. Tab.* 914. *f.* 7.
4. Nebulatus, ex flavo aſpere ſtriatus, labio obtuſe ſerrato. *Liſt. Tab.* 919. *f.* 13.
5. Sinuoſus, imo labro fiſſo. *Liſt. Tab.* 925. *f.* 17. 18.
6. Tenuis, exiguus, aſper, ſtriatus, maculoſus. *Liſt. Tab.* 926. *f.* 20.
7. Flammeus, labiis ſerratis. *Liſt. Tab.* 819. *f.* 35.
8. Faſciatus, exiguus, oryzæ grano æqualis. *Bonanni n.* 37. ubi per microſcopium aucta ſpecies cernitur.
9. Nitidus & lævis; extra carneus & fuſcus, intus albeſcens. *Bonanni n.* 322.

§. 155. Spec. III. Hiuleus

1. Anſatus; ex fuſco ſtriatus. *Liſt. Tab.* 858. *f.* 14.
2. Cælatus; inſigniter ſinuoſus; *Liſt. Tab.* 927. *f.* 21.
3. Angyſtomos, labro duplicato. *Liſt. Tab.* 948. *f.* 43.
4. Tympanoſus
   a. Faſciis crebro nodoſis exaſperatus. *Liſt. Tab.* 969. *f.* 23.
   b. Maculoſus; ſpiris ſtriatis & bullatis. *Liſt. Tab.* 922. *f.* 15.
   c. Roſtro ſtriato, mucrone tympanoſo. *Liſt. Tab.* 848. *f.* 2.
5. Lineatus; lineis ſubrufis. *Liſt. Tab.* 930. *f.* 25.
6. Cancellatus & dentatus. *Liſt. Tab.* 819. *f.* 34.
7. Ore nigro hiulcus. *Liſt. Tab.* 857. *f.* 13.

GENUS IX.

AURICULA.

§. 156. Auriculæ ſunt Turbines parvi mucronis, ex ventre turgido os in figuram auris externe diducentes. Notetur ergo auris fimbria marginalis, ad ſcapum angulo quodam, Tragi (*a*) inſtar, inſignis.

(*a*) Tragus, *ſpecies fungi.*

§. 157. Spec. I. Auricula Stagnorum

1. Subflava, pellucida, in tenue acumen ex ampliſſima baſi mucro-

cronata. *List. de Cochl. p.* 137. & *Hist. Tab.* 123. *f.* 21. Picturam vide in Tab. Noſtra III. n. 69. Turbo lævis in ſtagnis degens, *Aldrov. Lib.* III. *p.* 359. *n.* 3.; an *List. Tab.* 124. *f.* 24.?

2. Nitide atra, *Bonanni n.* 55.

Spec. II. Pellucida, quatuor ſpirarum, mucrone acutiſſimo; teſtæ apertura omnium maxima. *List. de Coch. p.* 139. & *Hist. Tab.* 123. *f.* 22.

Spec. III. Exiguæ; altera Virginiana, altera Javana. *List. Tab.* 114. *f.* 8. 9.

GENUS X.

NERITOSTOMA.

§. 158. Hoc nomine comprehendimus Turbines ore oblongo, fere Auricularum ſimili, ſed ſimplici ſine Trago, ſpira maxima in os manifeſte inflexa.

§. 159. Species I. Vetula; ob caſum a *Tulpio* notatum, *Obſerv. med. Lib.* III. *c.* 7. *List. de Cochl. p.* 140. & *Hist. Tab.* 123. *f.* 23. *Bonanni n.* 54. Icon exſtat in Tab. Noſtra III. n. 70.

GENUS XI.

TURBO LUNARIS.

§. 160. Ad differentiam Cochleæ Lunaris denominamus Turbines Lunares Cochlides toroſe elongatas, ore rotundo anguſto.

§. 161. Spec. I. Umbilicatus; quinque orbium admodum tenuiter ſtriatus & cancellatus. *List. Tab.* 25. *f.* 23.

Spec. II. Nimboſus; ore circinnato, limbo lato & ſtriato. *List. Tab.* 26. *f.* 24. Pictura exſtat in Tab. Noſtra III. n. 71. a. & b.

Spec. III. Teſſellatus & ſtriatus *Fabii Col. List. Tab.* 27. *f.* 25.

GENUS XII.

GARAGOI.

§. 162. Hoc nomen *Rumphius* dedit Turbini, qui per dorſum inſpectus Buccino apparet ſimilis, ſed oppoſitum os contra Buccini morem per ſpiras majores usque ad mucronem aperit.

§. 163. Spec. I. Alba & rugoſa. *Bon. n.* 143. Figuram vide in Tab. Noſtra III. n. 72.

GE-

GENUS XIII.

GALLINULA.

§. 164. GALLINIS incubantibus adſimilamus VOLUTAS gibbas acute mucronatas; labio expanſo inſtar alæ; in acumen terminatas.

§. 165. Spec. I. Lapponica; mucrone cochleato, coloris flavi, maculis nigris diſtincti, labio paululum effuſo. **De Lapſche geplekte Laphoorn** *Schynvoetii ad Rumph. Tab.* XXXVII. *n.* 3.

SPEC. II. Indiæ Occidentalis, labio effuſo, ventre oblongo, in recurvum canaliculum abeunte; oppoſitus mucro eſt trochiformis; color ignobilis. **De West-Indiſche Laphoorn** *Schynvoetii ad Rumph. Tab.* XXXVII. *n.* 4.

SPEC. III. Vexillum aurantium; teſta nobilis, conoides, labio exſerto; mucrone trochiformi, elongato, & quaſi in obturaculum tornato. Faſciis cingitur aurantiis & albis; ad mucronem nodi ſunt diſpoſiti in orbem. *Schynvoet ad Rumph. p.* 112. *Tab.* XXXVII. *n.* 2. **De Oranje Vlag.**

SPEC. IV. Aſpera & craſſa. *Liſt. Tab.* 987. *f.* 46. 47.

SPEC. V. Minima, pollicem longa; teſta craſſa, dorſo fuſco, ore luteo. *Rumph. T.* XXXVI. *lit.* P. **Het klein Bezaantje of Duifje.**

SPEC. VI. Gibba; *Rumphii Tab.* XXXVI. *lit.* M. *Liſt. Tab.* 853. *f.* 10. **Het Bultje / Bezaantje / Duifje.** *Rumph. Tab.* XXXVI. *lit.* N. *Liſt. T.* 853. *f.* 9. Figura exſtat in Tab. Noſtra IV. n. 73.

SPEC. VII. Faſciata; micis flavis & albis. *Rumph. Tab.* XXXVII. *lit.* X. **De breede Kanary.**

SPEC. VIII. Multicolor, turbine Stromboide anguloſo; intus lactea. *Bonanni n.* 342.

GENUS XIV.

GALEA.

§. 166. GALEÆ ſunt Cochlides globoſæ, labio ſimplici diducto & canaliculato, adeo Galeis ſive Capitum ferramentis, quibus olim milites tegebantur, ex parte ſimiles.

§. 167. SPEC. I. Striata:

1. Pennata; **Patryze;** *Malab.* Bia Culi Bawang. **Kivits Ey. Belhoorn. Ball-Schnecke;** Indian Patridge Shell. Paucis gyris obtuſe

obtuſe mucronata; ad latus ventris ovalis, turgidi, & canaliculati. Coſtæ ſpirarum latæ, ex fuſco flavæ, maculis albis ſemilunaribus pictæ, inſtar gallinarum. Patrys / *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* C.

2. Alba, tenuis, flave pennata ſuper coſtis craſſiuſculis. *Amboin.* Culit Bawang. Ajuin-Schil. *Rumph. p.* 91. *Tab.* XXVII. *lit.* D. *Liſt. Tab.* 899. *f.* 19.
3. Echinophora *Aldrov. Jonſton. Tab.* XII. *n.* 9. *Liſt. Tab.* 1011.
4. Fuſca *Liſteri de Cochl. p.* 162. Couvins a Piſcatoribus Scarborgenſibus dicta.
5. Mucrone trochiformi, ſpiris toroidibus. *Bon. p.* 116. *n.* 26.
6. Heluacea (*a*); Galea *Bonanni n.* 183. magna globoſa inter faſcias planas ſulcata.
7. Rugata, ſtriis capillaribus, *Liſt. Tab.* 131. *f.* 31.
8. Ampullacea, roſtro ſinuoſo, tenuis, ſtriata, muricata, clavicula compreſſa. *Liſt. Tab.* 894. *f.* 14.
9. Dentata ad Columellam; *Liſt. Tab.* 830. *f.* 52.
10. Lamellis rugoſa, roſtro tenui, productiore. *Liſt. Tab.* 830. *f.* 53. 54. *Sloane It. Jam.* II. *p.* 251.
11. Clavicula acuta. *Liſt. Tab.* 832. *f.* 56.
12. Parva, admodum tenuiter ſtriata, *Liſt. Tab.* 896. *f.* 16.
13. Sinuoſa, *Liſteri Tab.* 897. *f.* 17.
14. Umbilicata, aſperius ſtriata, variegata. *Liſt. Tab.* 985. *f.* 44. Picturam vide in Tab. Noſtra IV. n. 74.
15. Capillaceis ſtriis, ex rufo infuſcata. *Liſt. Tab.* 986. *f.* 45. Icon exſtat in Tab. Noſtra IV. n. 75.

(*a*) *Inuſitatum vocabulum; forte:* Helvolus *i. e. rubore vini diluto;* Linnæus.

Spec. II. Faſciata:

1. Cochlea lutaria, ſive Pomatia *Major.* Siſſo Salombo; nigra ad lucem transparens, faſciata. *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* Q. De gebande Ajuin-Schil of het Roejen-soy.
2. Maxima Pomatia Surinamenſis. *Liſt. Tab.* 128. *f.* 28.
3. Media Pomatia, tenuis, ſubviridis & fuſca, venis transverſalibus. Siſſo Capang, *Rumph. p.* 92. *n.* XV.
4. Minor Pomatia; mucrone acutiore; Siſſo potir; Wonko; Kakol; *Rumph. ibid.*

SPEC. III. Muricata:

1. Tuberculoſa; murici ſimilis propter teſtæ validitatem & tubercula (*a*), quibus in maximo orbe intumeſcit. *Bon. n.* 174.
2. Echinata, ſeu Cochleæ echinatæ inſtar hirſuta. *Bonanni n.* 184.
3. Breviroſtrum muricatum, labro dentato; ore ex purpura leviter tincto; clavicula brevi. *Liſt. Tab.* 955. *f.* 6. Burſoides Mauritana, nodoſa, ore croceo. *Petiv. Coll.* 125. *Liſt. Tab.* 956. *f.* 7. vid. *H. Sloane It. Jam. p.* 253.
4. Clavicula acuta; ſimilis præcedenti, ore ſubluteo. *Liſt. Tab.* 957. *f.* 9. An, Nodis compreſſis, *Liſt. ib. f.* 10.?
5. Labroſa; craſſa, variegata, unico ordine clavata; *Liſt. Tab.* 991. *f.* 52. *Sloane loc. cit.*
6. Digitata, ex bino ordine muricata. *Liſt. Tab.* 991. *f.* 53.
7. Bimaculata. Buccinum labroſum, craſſum; Columella plana, eaque media bimaculata. *Liſt. Tab.* 990. *f.* 50.
8. Ore ſubcroceo, roſtro umbilicato. *Liſt. Tab.* 990. *f.* 51.
9. Sinuoſa; labro duplicato, ſtriis latis & eminentibus. *Liſt. Tab.* 942. *f.* 38.
10. Ex roſtro & clavicula muricata. *Liſt. Tab.* 811. *f.* 20.
11. Ampullacea; gravis, ſubfuſca, clavicula compreſſa. *Liſt. Tab.* 895. *f.* 15.

(*a*) Tuberculoſa *hæc ad citatas ex Bonann. icones eadem eſt Bimaculatæ n.* 7., *cujus ex Liſtero allegatur icon. Aſſervatur autem in Muſeo Clariſſimi Esgers Cochlea Bimaculatæ ſimillima, at quæ una modo macula in columellæ medio inſignis eſt., adeoque huic* Tuberculoſæ *ſubſtitui poſſet, dicique* Unimaculata. *Imo iſtiusmodi duo ſpecimina in laudato Muſeo habentur, ut dubium omne eximatur.*

PAR.

PARTIS PRIMÆ.

SECTIO II.

COCHLIS COMPOSITA.

§. 168. COCHLIDES COMPOSITAS dicimus, in quibus duplex Teſtæ circumvolutio, ita ut quaſi ex duabus Cochlidibus videatur compoſita.

CLASSIS I.

COCHLIS ROSTRATA.

§. 169. ROSTRUM in cochlidibus proceſſum teſtæ ex oris labio extremo rectum, plus minus turbinatum elongatumque; ipſas autem COCHLIDES ejusmodi roſtro inſtructas ROSTRATAS dicimus, atque ex notis modo expreſſis ſequentem in modum diſtinguimus.

GENUS I.

TROCHUS ROSTRATUS.

§. 170. Hoc nomen damus Cochlidibus compoſitis, quarum mucro TROCHUS eſt per ventrem laxiorem in canalem longum, teretem, rectum, excurrens.

§. 171. SPEC. I. Aruanus; ab Aru Inſula. Teſta craſſa fiſſilis, ſine nitore plicas loco ſpirarum circa grandiorem Trochum gyrans, labio & roſtro diductis. *Rumph. Tab.* XXVIII. *lit.* A. Buccinum Aruanum, **de Aroeſche Trompet.**

SPEC. II. Indumentum Perſicum, *Bonann. n.* 75. Figuram vide in Tab. Noſtra IV. n. 76.

SPEC. III. Magnus & duplex, *Bonann. n.* 101.

GENUS II.

GLADIUS.

§. 172. Eſt STROMBUS ex ultima ſpira gibba, in extremitate oris, tenue roſtrum canaliculatum, acutum, extendens; per analogiam cum piſce GLADIO hoc nomine ſalutatur.

§. 173. SPEC. I. Labro dentato. *Bonann. n.* 121. Buccinum roſtratum labro muricato, longiſſima clavicula, parte ima ſtriata. *Liſt. Tab.* 916. *f.* 9. ſive Labro ſerrato. Buccinum bilingue; læve; roſtro cornuto gibboſum. *Liſt. Tab.* 854. *f.* 11. De getande Spil of Starre-pen *Belg.* Icon exſtat in Tab. Noſtra IV. n. 77.

SPEC. II. Labro lacero. *Liſt. Tab.* 854. *f.* 12.

GENUS III.

FUSUS.

§. 174. FUSUS h. l. dicitur COCHLIS per ſimilitudinem inſtrumenti, quo lanæ fila ducuntur, & eſt Cochlis ex Strombo in roſtrum teres, rectum, producta.

S. 175. SPEC. I. Fuſus longus; ſeu roſtro longiore. De Spil of Cabalkruyp *Belg.*

1. Rumphianus. Strombus inſigniter elongatus & roſtratus; ſpiris ventricoſis, rugoſis, longitudinaliter ſulcatis; coloris eburnei, roſtri & ſtrombi extremis nigricantibus; *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* F. *Liſt. T.* 917. *f.* 10. Figuram oſtendit Tab. Noſtra IV. n. 78.
2. Leviter acutus in nodis per ſulcos formatis; albus; magnus. *Rumph. p.* 96. *n.* VII.
3. Aureus leviter, ſuper candido criſpo. *Bonann. n.* 360.
4. Labio ſimplici rotundo exſerto; inſigniter elongatus. *Liſt. Tab.* 918.
5. Fiſſus. Buccinum roſtratum, maculatum, fiſſum ad imum labri. *Liſt. Tab.* 917. *f.* 11.

SPEC. II. Fuſus brevis. Stompe Spil; non roſtri ſolum brevitate ſed & turbinis ſtructura a priori diſtinguitur.

1. Lævis.
   a. Gyris æqualiter convexis. *Rumph. p.* 96.
   b. Maculoſus inter ſpiras paucas & rotundas ligatus, cyaneo diluto colore tinctus, punctisque candidis & pullis notatus. *Bonann. n.* 71. 72.
   c. Magnus, colore puniceo vel figulino, *Bonanni n.* 88.
   d. Undoſo ventre, ore patulo. *Liſt. T.* 914. *f.* 6.
   e. Sinuoſus *Liſteri T.* 915. *f.* 8.
   f. Faſciatus, binis tenuiter & valde acutis ſtriis circumdatus. *Liſt. Tab.* 924. *f.* 16.

2. Stria-

2. Striatus
   a. Rumphianus. Strombus ventricoſus, & ventricoſe inſigniter elongatus, transverſim ſtriatus, longitudinaliter ſulcatus, ideo nodoſus & hiulcus; roſtro tereti, & brevi; coloris pallide cinerei. De ſtompe Spil / *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* G.
   b. Pſeudo-Purpura: Baſtaard Purper-Slek. Strombus ventricoſus, ſpiris per angulos quaſi muricatis, roſtro brevi, paululum incurvo, coloris cinerei vel terrei, ſine nitore in cruſta; qua detracta apparent ſtriæ nigræ, veluti filamentoſæ ſuper albo; labium oris tenue, denticulatum; pars oris ſiniſtra purpurea. *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* E.
   c. Turris Babylonica. Babyloniſche Toren / en Pyramide. Babylons Towr. Strombus elegans, acutiſſimus, ſpiraliter ſulcatus, gyris ex albo & nigro feneſtratis, roſtro tereti & recto. *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* L.: minoribus maculis diſutis, nec non tertiæ ſpeciei nigricantis. *Rumphius* meminit *p.* 97.
   d. Craſſus, fulvi coloris. *Bonanni n.* 47.
   e. Acutus, inter ſpiras plicatas granulato filo conſtrictus. *Bonanni n.* 79.
   f. Tubulatus, cujus collum quaſi tubum format; turbo anguloſus; oris apertura valde longa, & in centro ſpirarum foramen profundum. *Bon. n.* 104. *Liſt. Tab.* 921. *f.* 14.
   g. Æthiops, de Moor / a colore; binis faſciis inæqualibus cinctus. *Bonann. n.* 357.
   h. Perizonius, de gebaande Knobbelhoorn. Eſt Trochus ventricoſus, nodoſus, in mucrone muricatus, roſtro inclinante; totus filo multiplici ſinuoſe conſtrictus. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* K. *Bonann. n.* 287. Buccinum roſtratum duplicibus lineis, *Liſt. Tab.* 931. *f.* 26.
   i. Dentatus. Buccinum fuſcum leviter & denſe ſtriatum, *Liſt. Tab.* 920. *f.* 12.

3. Muricatus:
   a. Filamentoſus; de omgetrande Hoorn / ſpiris nodoſis, cinereis, filo fuſco æqualiter conſtrictis, roſtro brevi coniformi. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* T.
   b. Polygonus, carneus, aut ſubflavus, paſſim obvius. *Bonann. n.* 32.
   c. Syracuſanus, angularis, ſulcis undoſis aſper. *Bon. n.* 80.

GENUS IV.

MAZZA.

§. 176. MAZZA Italis audit Clava argentea, Regibus & Romanæ Eccleſiæ Antiſtitibus præferri ſolita. Ab hujus ſimilitudine dicimus Mazzas Cochlides globoſas in roſtrum nonnihil incurvum, vaſtius canaliculatum, productas.

§. 177. SPEC. I. Lævis:

1. Teſſellata; craſſiſſima. *Liſt. Tab.* 815. *f.* 25.
2. Ampullacea (*a*); *Liſt. Tab.* 878. *f.* 3.

SPEC. II. Striata:

1. Teres mucrone; ventre globoſo, ſtriato; verrucoſo annulo ad mucronem. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXXVI. *n.* 7.
2. Punctata *Liſt. Tab.* 816. *f.* 26. Icon exſtat in Tab. Noſtra IV. n. 79. a.
3. Longitudinaliter ſtriata, *Liſt. Tab.* 816. *f.* 27. Figuram vide in Tab. Noſtra IV. n. 79. b.
4. Labiata; labio effuſo. *Liſt. Tab.* 877. *f.* 1. An eadem *Tab.* 751?
5. Granulata, irregularis; ſtriis aſperis extantibus. *Liſt. Tab.* 893. *f.* 13.

SPEC. III. Hiulca & muricata.

1. Variegata; clavicula leviter nodoſa. *Liſt. Tab.* 883. *f.* 5.
2. Mucrone muricato. *Liſt. Tab.* 892. *f.* 12.
3. Purpura marina exotica; NB. a dextra ſiniſtrorſum torta, ex fuſco radiata. *Liſt. Tab.* 907. *f.* 27. *Tab.* 908. *f.* 28.

(*a*) Ampullaceum *idem quod ventricoſum.*

GENUS V.

RAPA.

§. 178. RAPA dicitur Cochlis leviter mucronata, rotunda, breviterque roſtrata, rapæ rotundæ ſimilis. [illegible] / [illegible] / [illegible].

§. 179. SPEC. I. Tenuiſſima, ſemidiaphana, alba, rugoſa; ad dextrum oris labium nitida. *Muſ. noſtri.*

SPEC. II. Pallens, lutea. *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* F. Figuram exhibet Tab. Noſtra IV. n. 80.

GE-

GENUS VI.

HAUSTELLUM.

§. 180. Eſt Vas concavum, longiori manubrio inſtructum, quo aqua ex profundiori loco in ſublimem hauritur. Cochlis ejusmodi inſtrumento nonnihil ſimilis per metaphoram idem nomen admittet, ſi conſtat ex globoſo corpore ſpirali & roſtro gracili, longiſſimo.

§. 181. SPEC. I. Fimbriatum. Bia Sibor. Snippelop of Scheppertje *Belg.* Toroſe rugoſum, hiulcum; labio effuſo, fimbriato & plicato; roſtro longo, ſparſim muricato; intus rubens. *Rumph. Tab.* XXVI. *lit.* F. Icon exſtat in Tab. noſtra IV. n. 81.

SPEC. II. Muricatum ſeu dentatum; getakte Snippe-lop.

1. Roſtro & turbine brevioribus; curtis & acutis muricibus. *Rumph. Tab.* XXVI. *n.* 4. *Bonann. n.* 281. Purpura *Jonſton. Tab.* X. *Aldrov. p.* 285.
2. Ex duplici ordine in ima parte primi orbis. *Liſt. Tab.* 900. *f.* 20. *Bonann. n.* 283.
3. Longiroſtrum ſpinoſum; ventre & roſtro rugoſis; ſpinis raris aduncis & magnis, trocho obtuſo. *Rumph. Tab.* XXVI. *n.* 5. *Bon. n.* 282. *Liſt. Tab.* 901. *f.* 21. De gedoornde Snippe-lop *Belg.*

SPEC. III. Toroſum. Purpura *Jonſtoni Tab.* X. *n.* 6. Extus toroſe plicatum, verſus mucronem obtuſe muricatum; intus læve; labio altero replicato, altero ſerrato, roſtro acuto.

SPEC. IV. Rugoſum longiroſtrum; totum transillis (*a*) velut hiulcum. Album ſive oſſeum leviter flaveſcens; intus nitidum & lævigatum, extus ſuper fulva tubera notulis roſeis, flavis, furvis & rubicundis ſparſim depictum. *Bonann. n.* 268. *Liſt. Tab.* 903. *f.* 23.

(*a*) Tranſillæ *per ſimilitudinem dicuntur protuberantiæ teſtarum, velut glandulæ in faucibus eminentes.*

GENUS VII.

TRIBULUS ROSTRATUS.

§. 182. Hæc Cochlis equidem cum tribulo nil niſi ſpinas habet communes; interim tamen, quia *Rumphius* & alii eam hoc nomine jam dudum

dudum inſigniverant, ſub uſitato hoc, licet incongruo, nomine intelligimus Cochlidem globoſam longiroſtram, muricibus longis acutis denſisque hiſpidam.

§. 183. SPEC. I. Simplex. Spinetop of Limoen-boom. Bia Duri Lemon. Buccinum longiroſtrum, tenue, tribus ſeriebus ſpinarum teretium acutarum & aduncarum, verſus mucronem incurvatarum, obſitum; coloris albidi; *Rumph. p.* 86. *Tab.* XXVI. *lit.* G. Purpura aculeata: Sconciglio ſpinoſo *Bonann. n.* 269. *Liſt. Tab.* 902. *f.* 22.

SPEC. II. Duplex, ſpinis longioribus, cum minoribus ſuper buccino grandiuſculo roſtrato in tribus ſeriebus alternantibus. De dubbelde Spinetop of het Peeten-hammetje. Bia Siſſia. *Rumph. Tab.* XXVI. *n.* 3.

SPEC. III. Frondoſus, muricibus longis, raris, frondoſis, aduncis; ventre rugoſo, roſtro elongato, muricato. Baste Boontje/ *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXVI. *n.* 1. Picturam oſtendit Tab. Noſtra IV. n. 82.

CLASSIS II.

VOLUTA LONGA.

§. 184. Cochlides VOLUTÆ dicuntur LONGÆ, quæ, præter ventris oblongi gyros internos, alios ex baſi producunt externos.

GENUS I.

CONUS.

§. 185. CONI nomen damus faſciis teſtaceis latis in formam coni convolutis, ita ut ex baſi mucro plus minus conicus ſe exſerat.

§. 186. *Synon.* Bia Tsjintsjing. Kranglanke. Wellen/ Tooten/ Pukken/ *Belg.*

§. 187. SPEC. I. Baſeos lævis:

1. Meta butyri. Boterton; geele Teger. Spiris in baſi diviſis, planis, ex nigro flammeis; medio mucrone brevi, acuto; ventre butyraceo, per ſeries micarum nigricantium inæqualium quaſi faſciatus. *Rumph. Tab.* XXXI. *lit.* C.
2. Meta Butyri minor, characterum ſeriebus magis regularibus. *Rumph. p.* 102. *n.* II.

3. Vo-

3. Voluta musicalis; **Muspkhoorn. A B C Boekje. Letterhoorn; witte Tygertoot.** Basi plana, testa alba, maculis nigris, per series inscripta.
   a. Maculis nigris tessellatis. *Rumph. Tab.* XXXI. *lit.* D. *List. Tab.* 773. *f.* 19.
   b. Venter medius duabus vel tribus fasciis vittatus; notæ longiores. *Rumph. p.* 103. *List. Tab.* 774. *f.* 20.
   c. Notulæ parvæ, instar Metæ butyri. *Rumph. ibid.*
   d. Eburnea, ebeno nigro velut tessellata. *Bonann. n.* 122.
   e. Fulva, heluaceis notis, nigricans. *Bonann. n.* 128.
   f. Notis aureis & rufis ordinatim distributis. *Bonann. n.* 131.
4. Cereola. **Keersje.** Bia liling. **Menniste Toot.** Basis obtuse conica, spiris planis lævibus; apice oris violaceo.
   a. Striis albis. *Rumph. Tab.* XXXI. *lit.* E. Icon exstat in Tab. Nostra IV. n. 83.
   b. Spiris baseos toroidibus, ore extremo violaceo. *List. Tab.* 754. *f.* 2. Similis, paulo coloratior, rictuque fere toto violaceo; *List. Tab.* 758. *f.* 3.
5. Voluta pennata, baseos mucronatæ. *Belg.* **Speldewerk-hoorns** vulgo: ab aliis vocantur etiam **Goudlakense**/ sed male juxta *Schynvoetium ad Rumph. p.* 107.
   a. *Rumphii Tab.* XXXII. *lit.* O. & P.
   b. Turcica; velut Attalica manu, aureo albo & sanguineo colore, picta; *Bonann. n.* 135.
   c. Rubra major, subtiliter striata, plumis minus regulariter dispositis, & minus grate coloratis. *List. Tab.* 788. *f.* 40.
   d. Rubra minor, gracilis plumis candidis. **Zilverlakense** *Rumph.*
   e. Attagenata flava. Attagen, **Korhoen**/ **Goudlakense**/ plumis flavis, nigro distinctis, *Rumph.*
   f. Purpurea, maculis albis, aurea lineola circumdatis. *Bonann. n.* 123.
   g. Jaspidizans, seu Siculo Jaspidi similis. *Bonann. n.* 133. *List. Tab.* 790. *f.* 43.
6. Voluta maculosa. **Achaate-toot. Geplekte Katje. Achaate Stamper.** Baseos mucronatæ; ventre maculis latis, longis, intense flavis, inter micas plumbeas & puncta, instar arenæ dispersa, picto. *Rumph. Tab.* XXXII. *lit.* Q.

7. Voluta granulata. Gegranuleerde Katje. Est voluta minor, in basi maculata, in ventre per series transversales granulata. *Rumph. Tab.* XXXII. *lit.* T.

8. Voluta transversalibus filis cincta, superficie fusca, nigricantibus filis circumducta.
   a. Quercino ligno similis. Eikenhouts-toot. *Rumph. Tab.* XXXI. *lit.* V.
   b. Fasciata per medium & ad mucronem cingulo albo. De Eikenhouts-toot met banden. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXXIII. *n.* 1.

9. Voluta longitudinalibus filis.
   a. Rufis venis longitudinalibus, fasciis transversalibus, varii coloris. Gebande Olyven-toot/ Aracans Garen. *Rumph. Tab.* XXXIII. *lit.* W. *List. Tab.* 786. *f.* 34.
   b. Rufis circulis, nonnihil sinuosis, basi parallelis, ad apicem plicata; intus alba; basi rufa. *Mus. nostri.*

10. Fasciata; in basi lata & conica maculosa; in medio simili fascia constricta.
   a. Viridis, instar casei, fascia alba nigre maculata; ore violaceo seu nigro. Groene Kaas. *Bonann. n.* 139. *Rumph. Tab.* XXXIII. *lit.* X.
   b. Fusca, nitens & varie micans, fascia media divisa per micas, vulgo: Speldewerks Kussen. Bia bantal, *Rumph. Tab.* XXXIII. *lit.* Y.
   c. Magna, de groote Olyven-bandtoot; maculis magnis super fasciis latis. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXXI. *n.* 5.
   d. Aurantia. De Orange Admiraal. *Voluta rarissima.* Alba, fasciis latis aurantiis, inter strias asperas, nigro albas. Turbo trochiformis ejusdem coloris. *Schynvoet ad Rumph. p.* 108. *Tab.* XXXIV. *lit.* A.
   e. Bifascis Admiralis; de Admiraal; *olim* 500. *flor. Belg. vendita;* maculis albis, cordatis, super fasciis latis; reliqua superficie quasi texta. *Schynvoet ad Rumph. l. c. Tab.* XXXIV. *lit.* C.
   f. Polyzonos; maculis albis, majusculis, inæqualibus; *species rara. Schynvoet ad Rumph. l. c. Tab.* XXXIV. *lit.* D.
   g. Admiralis Indiæ Occidentalis; West-Indische Admiraal of de Admiraal van Oma; American-Admiral *Anglice;* fasciis albis

albis maculatis. *Schynvoet ad Rumph. l. c. Tab.* XXXIV. *lit.* E.

h. Vice-Admiralis; coloris punicei; maculis albis; fascia alba venosa, venis fuscis divisa; trocho acute exserto; spiris nonnihil convexis. De Vice-Admiraal / *Schynvoet ad Rumph. l. c. Tab.* XXXIV. *lit.* F.

i. Genuana; Geneesche-todt. *Testa rara & cara.* Coloris purpurei, fasciis albo-nigris, asperis, cincta; latioribus cum tenuioribus alternantibus. *Schynvoet ad Rumph. l. c. Tab.* XXXIV. *lit.* G.

k. Leo; a maculis leoninis, *sive* leonibus per deceptam phantasiam adsimilatis (*cum Leones nullas habent maculas*) baseos planæ; fasciis obscuris. De klimmende Leeuw-toot of Schildpad-toot / *Schynvoet ad Rumph. p.* 109. *Tab.* XXXIV. *lit.* M.

l. Byssina; in qua quadratæ notæ sanguineæ; puncta crocea; & lineolæ rufæ, vel fulvæ; opus quasi acu pictum efformant. *Bonanni n.* 132.

m. Fasciata, pennata; coloris fulvi dilucidi, super fasciis; maculis cruentis, velut squamis, decorata. *Bonann. n.* 136. *List. Tab.* 762. *f.* 11. Similis *List. Tab.* 770.

n. Plumbea; super qua multiplices fasciæ latiores, angustiores albæ, conchyliatis notulis tessellatæ, alternant. *Bonann. n.* 337. *List. Tab.* 769.

o. Livida; binis fasciis albis cincta; notulis cruentatis gyrose tessellata; basis alba sanguine velut maculatur. *Bon. n.* 361.

p. Pardus; ob maculas sanguineas tessellatas æque distantes, super lacteo colore inter tres zonas aureas. *Bon. n.* 363.

q. Sublivida, lineis ex rufo alboque tessellatis vittata. *List. Tab.* 763. *f.* 12. an, Rhombus fasciis ex albo nigroque catenatis, *Petiv. Tab.* 15. *f.* 11.?

r. Lineis integris, subrufis, dense fasciata. *List. Tab.* 785. *f.* 32.

s. Lineis integris, obliquis, fasciata. *List. Tab.* 768.

t. Sublutea; lineis quibusdam punctatis & fasciis undatis picta. *List. Tab.* 780. *f.* 27. An Rhombus, *Petiv. Gaz. Tab.* 28. *f.* 4.?

u. Lineata; fasciata; & maculis rufis undosis marmorata; mucrone breviter acuminato. *List. Tab.* 777. *f.* 23. 24.

w. Similis; mucrone gracili. *List. Tab.* 786. *f.* 35.

11. Arenata; quasi arena conspersa, Zandhoorntje.
a. Major; micis majusculis; Vliegeschreetje / *Rumph. p.* 106. *Tab.* XXXIII. *lit.* Z. De Vlooieschreet / *ibid. n.* 2.
b. Minor; Muggeschreetje; *Rumph. Tab.* XXXIII. *lit.* A A.
12. Musica rusticorum; Boeren Musyk; tota rubra, maculis nigris, quadratis; gepleite Natje. *Rumph. T.* XXXIII. *lit.* B. B.
13. Meta Butyri, Boeroensis; Cpperschje Natje of 't aschgraeuw Boero's Boterwegje; pollicem longa; coloris cinerei; striis transversis interruptis. *Rumph. Tab.* XXXIII. *lit.* G. G.
14. Luhuana, de Loesjoneesche Canary of Hoorn. Venter conicus, paulo diductus, alatus; testa crassa, lævis, albida; maculis latis, fuscis, velut in fasces confluentibus; labio intus rubente, ex opposito nigro, viridi & flavo; mucrone cochleato. *Rumph. Tab.* XXXVII. *lit.* S.
15. Nussatellana, a loco; de ruige of gegraauderde Kuipers Boom; ad Cylindrum inclinans; longa; trocho baseos elongato, tota granulis striata; coloris rufi; aliquando maculosa. *Rumph. Tab.* XXXIII. *lit.* E. E.
16. Nodosa; colore vinoso tincta; circa basin in ambitu plicata; glandulis prominentibus; ubi in mucrone decrescit, eam cingunt quædam velut fila, frequenter nodis implicata. *Bonann. n.* 125.
17. Baseos fere planæ & latæ; colore albo, cyaneo diluto, tyrio & castaneo. *Bonann. n.* 130.
18. Transversim striata, tota candida, notis aureis sine ordine notata. *Bonann. n.* 364.
19. Voluta spectrorum; Spoolje; Achaate root; baseos rotundatæ; coloris lutei; characteribus undosis; spectra chartarum lusoriarum quodammodo repræsentantibus. *Rumph. Tab.* XXXII. *lit.* S.
20. Nebulata, ex rufo passim lineatim punctata. *List. Tab.* 772. *f.* 18. Similis & ingens, *List. Tab.* 771. *Tab.* 745. *f.* 36. & *Tab.* 760. *f.* 6.
21. Undata ex rufo; clavicula acuta & sulcata. *List. Tab.* 782, *f.* 29. & *Tab.* 785. *f.* 33.
22. Flammea; vel undatim secundum longitudinem depicta; clavicula compressa. *List. Tab.* 781. *f.* 28.
23. Striis capillaceis, & velut acu pictis circumscripta. *List. Tab.* 755. *f.* 7.

24. Nu-

24. Nubecula; maculis albis, inter obſcuriores nubes, montoſis. Zuinet-toot; *Rumph. Tab.* XXXIII. *n.* 4. *Bonann. n.* 126.

25. Punctata, rufa vel alba; punctis fulvis (*a*) vel rubentibus aſperſa; *Bonann. n.* 124. *Liſt. Tab.* 757. *f.* 9.

26. Conſtricta; verſus apicem coni furvi (*b*), candidi quidam funiculi gyros efficiunt, & circa baſin pinnularum quaſi corona nectitur, *Bonann. n.* 137.
Striis punctatis granulatis, *Liſt. Tab.* 744. *f.* 35.
An Rhombus albus, faſciis flavis & mæandrinis (*c*) alternatim perbelle pictus, *Petiv. Gaz. Tab.* 22. *f.* 11?
Virgulis catenatis & bicoloribus. *Liſt. Tab.* 738. *fig.* 33.

27. Pyriformis; ~~bin-fegen-artig~~; candida; faſciolis piceis ſegmentata. *Bonann. n.* 138.

28. Lactea; circa baſin in pinnulas deſinentem candidior, intus violacea. *Bonann. n.* 365.

29. Subpurpurea; ſtriis majuſculis eminentibus. *Liſt. T.* 760. *f.* 5.

30. Subrufa, faſciata, zonis anguſtis ex albo & nigro teſſellatis *Liſt. T.* 767. *f.* 16. minutiſſimis maculis, *Liſt. T.* 788. *f.* 41.

31. Undulata parva; maculis ex rufo nigricantibus. *Liſt. Tab.* 779. *f.* 26.

32. Maculata, parva; quaſi ex rufo denſe reticulata. *Liſt. Tab.* 789. *f.* 42.

33. Pennata; Caſſis pennata. *Rumphii Tab.* XXXIII. *lit.* C. ore rubente; pinnis nigro-fuſco-albis diſtincta; apice fimbriato.

34. Achatina. Achaat-toot:
a. Maculoſa, verſus apicem parumper curva, baſi convexa, mucrone acuto. *Rumph. Tab.* XXXIV. *lit.* K.
b. Striata; geſtreepte Achaat-toot; *marbled Achat Stamper;* mucrone trochiformi, nubeculis albis picta, baſi decurrente. *Schynvoet ad Rumph. ib. lit.* L. *Liſt. Tab.* 775. *f.* 21.

35. Ca-

(*a*) Fulvus, *cum levi rubedine flaveſcens*, wie ſpaniſch Roht.
(*b*) Furvus, *nigredinis obſcuræ*, getuſcht.
(*c*) Mæandrinus, verzogen wie ein Irrgarten.

35. Capucini; Gnu Mönchen; Graeuwe Monnikken; Oude Wyven/ *Belg.* Volutæ fere ovales parvæ:
a. Cinereæ, rugoſæ. *Rumph. p.* 106. *Tab.* XXXIII. *lit.* DD.
b. Albæ, granulis nigris conſperſæ. *Ibid. lit.* CC.
36. Bruinetta, maculis inter obſcuriores nubes albis & ſquamatis. Bruinet-toot / Hoenderbeden / *Belg. Rumph. Tab.* XXXIII. *n.* 3. *Liſt. Tab.* 744. *f.* 34.
37. Multicolor; viridi, flavo, ſanguineo, fuſco, citreo & oleacio ſine ordine aſperſa. *Bonann. n.* 125. *altera.*
38. Ravida (*a*), faſcia alba transverſim cincta, & binis aliis faſciolis in longum ſegmentata. *Bonann. n.* 127.
39. Braſilienſis; lævis; labio paululum exerto, coloris caſtanei. *Bonann. n.* 326.
40. Faſciata, & per faſcias quaſi turbinata. *Liſt. Tab.* 786. *f.* 36.
41. Albida, lævis, mucrone acuto. *Liſt. Tab.* 753. *f.* 1.
42. Nubecula mucronata, ſeu Rhombus ex ruſo nebulatus, lineisque quibusdam interſectis inſcriptus. *Liſt. Tab.* 764. *f.* 13.
43. Alia, acutius mucronata; *Liſt. Tab.* 765. *f.* 14.
44. Raris undis ſubrufis, tenuis albida; *Liſt. Tab.* 783. *f.* 30.
45. Clavicula producta, fuſca lævis; ex albo faſciata. *Liſt. Tab.* 786. *f.* 37.
46. CEDO NULLI; muſei olim D. de la *Faille;* nunc Regis Portugalliæ; cujus icon vivis coloribus in *Muſ. Klein.* (*b*)

(*a*) Ravidus, ſchwarz-gelb / nigro-luteus.
(*b*) Catalogue raiſonné de Coquilles p. 18. *Le Cabinet de feu M.* de la Faille, *Auditeur des Etats, fut vendu à la Haye il y a* 4. *ans* (1732.). *Il s'y en trouva une en particulier d'environ deux pouces de longueur, de l'Eſpece de celles, que l'on appelle* AMIRALES, *& à la quelle on avoit donné le nom* CEDO NULLI, *qui fut achetée par un marchand pour mille vingt Livres de notre argent* (*de France*). *Cette coquille orne actuellement le Cabinet du Roy de Portugal.*

§. 188. SPEC. II. Baſeos muricatæ:
1. Voluta marmorata. Marmer-hoorn. Berg-hoorn / a maculis cordiformibus. Bija Tsjintsjing. Ring-hoorn.
a. Vulgaris; cujus baſis mucronata; ſpiræ verrucoſæ; venter niger,

niger, maculis albis, magnis, cordiformibus pictus. Fiunt hinc annuli rarioris artificii. *Rumph. Tab.* XXXII. *lit.* N.

b. Basi compressa. Rhombus compressus clavicula nodosa. *List. T.* 787. *f.* 39.

c. Fasciata; basi obtusa, hiulca; duabus plagis, fasciarum instar, obscuratis, maculis majoribus. **Partshoorn met banden.** *Schynvoet ad Rumph. p.* 107. *Tab.* XXXII. *n.* 1.

2. Voluta Tygerina; **Tyger**; **Wolkhoorn**; baseos angustioris, spiris sulcatis; ventre longo, subtiliter striato, nubeculis castaneis, sæpe nigricantibus, super albo & rubenti. *Rumph. Tab.* XXXI. *lit.* F.

3. Admiralis. **De Opper-Admiraal.** Obscure fasciata, eleganter maculosa; ex flavo fusca; obscurioribus nubeculis interlabentibus; maculæ sunt cordiformes; zonæ luteo albo distinctæ; mucro acute trochiformis; quod Belgi dicunt **Topschoon.** *Schynvoet ad Rumph. p.* 108. *Tab.* XXXIV. *lit.* B.

4. Coronata; testa alba, labio paulum diducto; fasciis duabus latis, luteis, nigro & albo maculatis; basi lata denticulata & maculosa. **De Kroonhoorn.** *Schynvoet ad Rumph. p.* 108. *Tab.* XXXIV. *lit.* H. I. Figuram vide in Tab. Nostra IV. n. 84.

5. Gemmata; cujus mucro corona multiplici decoratur, quam format globulorum linea, in spiris orbium, supra basin eminentibus, posita. Colore aureo, notis albis artificiose distincto. *Bonanni n.* 129.

6. Jaspidizans, tincta colore albo, rufo, rubro, mustelino, terreo. *Bonanni n.* 134.

7. Gagates, *Bonann. n.* 362.

8. Punctata per series; clavicula muricata. *List. T.* 761. *f.* 10.

9. Subcrocea; fasciis ad rostrum bullatis. *List T.* 759. *f.* 4.

10. Alba, lineis latis croceis tessellatis cincta; apice coni purpurascente; *List. Tab.* 767. *f.* 17.

11. Nebulata ex rufo, exiguis lineis ad rostrum bullatis. *List. Tab.* 777. *f.* 24.

12. Undata, maculis ex nigro rufescentibus. *List. T.* 779. *f.* 25.

13. Punctata & tessellata. *List. Tab.* 766. *f.* 15.

GENUS II.

TROCHO-CONUS.

§. 189. TROCHO-CONUM dicimus Cochlidem per *Coni* & *Trochi* fere æqualium *baſes conjunctas* formatam. Apparent videlicet in hoc genere duo coni; baſibus conſertis; ſed alter *turbinatus*, alter *volutus* ſeu intortus.

§. 190. SPEC. I. Lævis:

1. Fragilis, albus, nonnihil terreus, in mucrone lentiginoſus (*a*); *Bonanni n.* 291.
2. Undatus, aliquando inſtar Serpentis ſquamatus; *Bon. n.* 292.

(*a*) Lentiginoſa *a* Verrucoſis *differunt exactiore tuberculorum rotunditate, quæ in* Verrucoſis *negligitur.*

§. 191. SPEC. II. Striatus:

1. Conus toroides. **Stompje.** Coſtis rotundis; labio lacero; micis nigris inſcriptus; trocho lato & iſopleuro (*a*) (*cujus latera ſunt æqualia*) *Rumph. Tab.* XXXV. *lit.* C.
2. Pyramidalis; *Bonanni n.* 303.
3. Ampullaceus, undatim depictus; columella ima crocea. *Liſt. Tab.* 883. *f.* 6.
4. Inflatus; denſe ſtriatus. *Liſt. Tab.* 889. *f.* 10.
5. Nebulatus; *Liſt. T.* 891. *f.* 11.

(*a*) Iſopleuron, *figura geometrica.*

§. 192. SPEC. III. Muricatus:

1. Lucifer; **Morgenſtar**; per metaphoram a militari inſtrumento veterum ita dictus (**getakte Kuitzers Boek. Bonte Tak-hoorn.**) Craſſus, denſe muricatus, ſuper albo caſtaneus. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* L. *Liſt. T.* 829. *f.* 51.
2. Gallicus. **De Franſche Hoorn / de gemarmerde Kamel-hoorn /** *Belg.* Lævis, in Cono marmoratus & faſciatus; in Trocho leviter muricatus & conſtrictus. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* M. *Liſt. Tab.* 888. *f.* 9. *Bonann. n.* 288. Figuram exhibet Tab. Noſtra IV. n. 85.
3. Tubuloſus. Bia Papuwa. Banda Burshell; male Caſſis verrucoſa.

a. Se-

a. Secunda *Rumphii Tab.* XXIV. *lit.* B. Eſt enim Conotrochus acutus, in dorſo nodoſus, & hiulcus; in trocho erectis tubulis ſive canaliculis muricatus; coloris leucophæi, muricibus nigro pollutis. Getakte Pimpeltje *Belg.*

b. Tenuis; ſquamis ſemilunaribus (*a*) in labio.

c. Albus, mucrone minus elongato.

d. Niger, mucrone elongato, in dorſo & ore leviter muricatus.

4. Marmoreus. Caſſis Ceramica. De Morgenſtar of getakte Kwitſers Broek/ *Belg.* *Rumphii Tab.* XXIV. *lit.* A. Purpura marmorea *Bonanni n.* 270. Teſta, quaſi petroſa, in dorſo & mucrone ſpiraliter inæqualibus canaliculis pyramidalibus muricata, dorſo terreo, muricibus nigricantibus, ore languide albo.

5. Plicatus; ſeu Caſſis plicata, canaliculis ſpiralibus rugoſis inſtar faſciarum complicatarum & laciniatarum, planis; De Kwitſers Broek; *Rumph. Tab.* XXIV. *n.* 1. Purpura Neapolitana ſeu caroſa *Bon. n.* 271. fuſca ſive livida, raro albeſcens, cum maculis rufis, faſciisque conchyliatis aut croceis.

6. Tota quaſi lacerata; *Liſt. Tab.* 906. *f.* 25.

7. Laciniis circa Coni & Trochi conjunctiones diſpoſitis. *Liſt. Tab.* 906. *f.* 26. & *Tab.* 885.

8. Tumidus, quaſi ex fuſco nigricans; Trocho humili; Cono plicato & muricato, lineolis fuſcis circumdato. *Bon. n.* 76.

9. Sinuoſus in turbine; Buccinum ſtriatum, faſciatum, fuſcum. *Liſteri Tab.* 928. *f.* 22.

10. Undatus; Buccinum magnum, roſtro muricato; *Liſt. Tab.* 810. *f.* 19.

11. Toroſus; clavicula muricata; apertura leviter purpuraſcente. *Liſt. Tab.* 886. *f.* 7.

12. Lineatus; grandioribus muricibus. *Liſt. Tab.* 887. *f.* 8. alius *Liſt. Tab.* 893. alter ſine num.

13. Dentatus; *Liſt. Tab.* 890.

(*a*) Lunaris *i. e. rotundus: nam veteres & barbari rotunda Lunæ comparant;* Semilunatus, *figura lunæ dimidiæ.*

GENUS III.

DITROCHUS.

§. 193. Eſt Cochlis Voluta, longa, quaſi ex gemino Trocho figurata. Conicus enim venter, ſpiraliter toroſus eſt.

§. 194. Spec. I. Semiplicatus; Semilentiginoſus; ſive Turbo tuberculis ubique diſtinctus, quæ ſupra colorem aureum mirifice albeſcunt. *Bonanni n.* 61. Figuram vide in Tab. Noſtra V. n. 86.

Spec. II. Cinereus & lividus, cujus teſtam formant decem ſpiræ aculeatæ, circa baſin auctiores; pars exterior circa labia lacteſcit; velut ſub Sandaracca. *Bonann. n.* 286.

GENUS IV.

TURRICULA.

§. 195. Turriculas dicimus Cochlides volutas, ex ventre conico longo in acutiſſimum Strombum productas.

§. 196. Species.

1. Articulata:
   a. Nigricans, ſpiris plicatis. *Rumph. pag.* 98. *n.* XIX.
   b. Sulcata in longum & rugoſa; ſpiraliter ſtriata; coloris rufi & flavi, aliquando rubris nigrisque faſciis cincta. Het Torentje / de Band-pen / *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* R.
   c. Plicata; Teſta craſſa, griſea, ob plicas, ſtriges, rugas, tota hiulca. Het geplooide Torentje. *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* S. Magna in his eſt colorum & figuræ varietas. *Bonann. n.* 64. Icon exſtat in Tab. Noſtra V. n. 87.
   d. Corallium. Bia Bidji gnemon; plicis anguloſis & faſciatis, mire ludens. *Rumph. p.* 98. *n.* XX.
2. Spiris rectangulis, ore contracto. *Schynvoet ad Rumph. T.* XLIX. *lit.* E.
3. Digitellus:
   a. Craſſus; ſemidigitum longus; ventre rotundo; pullo; nunc granulato, nunc faſciato; turbine plerumque incurvo; apice obtuſo. Het Vingertje / *Rumph. Tab.* XXIX *lit.* Q.
   b. Minor; lævis; albus; nitens. *Rumph. p.* 97. *n.* XVIII.
4. Filis cincta; ventre tereti; ſtriis ſpiralibus nigricantibus, inſtar

ſtar ferreorum filorum compoſitis. Het Torentje met draadjes of geribt Torentje/ *Belg. Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* T.

5. Granulata, cinereo alba. Het gebandeert Torentje of de Staten Vlag-pen/ *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* V.
6. Bozios *Luſitan.* ſeu Buccinum ſpirale, coloris cinereo-fuſci, rugoſum & plicatum. *Rumph. Tab.* XXIX. *lit.* X.
7. Multicolor; canaliculo recurvo; mucrone plicato; trochoide exſerto; colore vario picta. *Bonann. n.* 65.
8. Monozonos; cono partim plicato, partim rugoſo, interlabente faſcia, a mucrone plicato diviſa; coloris albi & pulli diverſimode confuſi. *Bonann. n.* 74.
9. Reticulata; vulgo *Garaggo;* ab Hiſpanico: *Scaragol;* multiplici colore tincta. *Bonann. n.* 78.

GENUS V.

THEMA MUSICUM.

§. 197. Sunt Trochi anguloſe plicati in conum diductum abeuntes, cujus apex per ſinum hiat; os labium craſſum exſerit, & ex oppoſito plicas, ſtriarum inſtar, format. In maculis & lineis notarum muſicarum ſimilitudo quæritur. Hoornbak Stampers.

§. 198. SPECIES:

1. Marmorea; rugoſa; craſſa teſta; in oceani fundo candida, rubris maculis cruentata. *Bon. n.* 284. *Liſt. Tab.* 810. *f.* 19.
2. Clavicula muricata, craſſum, *Liſt. T.* 805. *f.* 14. De Muſyk-hoorn. Picturam exhibet Tab. Noſtra V. n. 88.
3. Ebraicum, inſignis ex maculis vel ſanguineis vel terreis, quæ tanquam arbitrariæ notæ ſupra colorem album, aureo mixtum, diſperſæ, Hebræorum characteres multoties exprimunt. *Bon. n.* 393. Buccinum muſicum grave faſciatum. *Liſt. T.* 809. *f.* 18. De Wilde Muſyk-hoorn.
4. Gallorum muſica. *Bonann. n.* 296. 297.
5. Lividum; lineis luteis, ſerpentinis, inſcriptum. *Bon. n.* 305.
6. Anguſtum; clavicula leviter nodoſa. *Liſt. Tab.* 806. *f.* 15.
7. Sinuoſa clavicula, & ſtriata. *Liſt. Tab.* 812. *f.* 21.
8. Tenuis ex fuſco variegata; *Liſt. Tab.* 807. *f.* 16.

GENUS VI.

VESPERTILIO.

§. 199. Dicitur genus volutæ Cochlidis, quod ex Cono deducto Trochum muricatum & irregularem paucis ſpiris flectit. Bia Morſego, Bia Buduri, *Mal.* Vleermuis / *Belg.* Etiam Witte Muſpa / quia quidam eorum veri Muſici ſimilitudinem quandam referunt; *Schynvoet ad Rumph. p.* 107.

§. 200. SPECIES:

1. Pallide rufus, nigris undis; ore albo; muricibus longis, acutis. *Rumph. Tab.* XXXII. *lit.* H. *Bonann. n.* 294. *Liſt. Tab.* 808. *f.* 17. De getaalde Vleermuis *Belg.* Icon exſtat in Tab. Noſtra V. n. 89.
2. Mucrone nodoſus, longior; rufus; undis fuſcis. *Rumph. T.* XXXII. *lit.* I. De Iandtwerpſe Vleermuis *Belg.*
3. Murex Carthaginenſis, intus albus & roſeus; e Sandaracca valde pellucidus; *Bonann. n.* 321.

GENUS VII.

NUBECULA.

§. 201. NUBECULAS cum *Belgis* dicimus volutas longas, inter conum & cylindrum ſua gibboſitate ambigentes; in baſi conica dentatas, maculis nubium more pictas. Wolkje / Achaate Arcoubak.

§. 202. SPECIES:

1. Tulipa Gallorum; Puntu Madame. Coloris roſſi; albis nubibus diſtincti. *Rumph. Tab.* XXXI. *lit.* G. *Bonann. n.* 318. Figuram vide in Tab. Noſtra V. n. 90.
2. Purpuraſcens; nubibus cæruleis; *Rumph. p.* 103.
3. Tabula Geographica; ſuper teſta alba maculas & lineolas furvas, velut regiones, in tabulis Geographicis habet diſpoſitas. *Bonanni n.* 319.
4. Rhombus maximus, ex rufo vermiculatus; clavicula muricata. *Liſt. Tab.* 747. *f.* 41.

GE-

GENUS VIII.

DACTYLUS.

§. 203. DACTYLI (Dattlen; Wellen) ſunt cochlides cylindricæ voluttæ; ad ſpeciem oſſiculi fructus arboris dactyliferæ; in apice ſinus eſt ſemilunatus nonnihil incurvus. **Cylinders / Rollen / Dadels** / *Belg.*

§. 204. SPECIES:

1. Porphyriticus; obſcure cinereus, quaſi nigricans, inſtar porphyritæ; per medium faſciatus, intus flavus. *Rumph. Tab.* XXXIX. *n.* 1. *Liſt. T.* 727. *f.* 14. **De Porphyrſteene Dadel.**
2. Reticulatus & faſciatus. *Liſt. Tab.* 728. *f.* 15.
3. Nebulatus; *Liſt. Tab.* 728. *f.* 16. *Tab.* 739. *f.* 28.
4. Undatus *Liſt. Tab.* 732. *f.* 21. *Tab.* 734. *f.* 23. 24. *Tab.* 739. *f.* 26.
5. Niger; **Swarte Rolletje**; nitens; margine caſtaneo; labio ſæpe fimbriato; **Zwarte Dadel** nonnullis. *Rumph. T.* XXXIX. *n.* 2. *Liſt. Tab.* 739. *f.* 27.
6. Varius. **Ichaat Dadel**; *Rumph. p.* 119. *n.* 3. Olivacea, fuſca, leucophœa.
7. Sepultura; **Prince Begraaffenis**; **Prince Stamper**; maculis nigris & venis ſuper olivaceo, exequiis ſimilibus. *Rumph. Tab.* XXXIX. *n.* 4.
8. Vulgaris, ſuper viridi flave ex cæruleo flammeus. *Rumph. p.* 119. *n.* 5. *Liſt. Tab.* 731. *f.* 20. **De gemeene gemarmerde Dadel.**
9. **Kameletje** / undis nigricantibus; *Rumph. Tab.* XXXIX. *n.* 5.
10. Teſſellatus; *Liſt. Tab.* 720. & 721. *f.* 5. 6. 7.
11. Striatus & ex fuſco undatus. *Liſt. Tab.* 724. *f.* 11.
12. Ex fuſco & nigro undatus. *Liſt. Tab.* 735. *f.* 25. Figuram oſtendit Tab. Noſtra V. n. 91. a. & b.
13. Gibboſus, undis raris; *Liſt. Tab.* 740. *f.* 29.
14. Franciſcani: **Grauwe Monniken** *Belg.*
    Cinereo-nigri, ore violaceo. *Rumph. p.* 120. *n.* 6.
    Ex fuſco nigricans; *Liſt. Tab.* 718. *f.* 2.
15. Gutta cærulea. **Blauwdroppen** / *Rumph. Tab.* XXXIX. *n.* 6.
16. Mica magna. **Groote Glimmertje**; mucrone acute elongato. *Rumph. Tab.* XXXIX. *n.* 7.
17. Mica parva. **Kleine Glimmertje**. *Rumph. Tab.* XXXIX. *n.* 8.

18. Jaspidizans; *List. T.* 719. *f.* 3. *T.* 720. *f.* 4. *T.* 725. *f.* 12.
19. Venosus, seu nebulosus. *Schynvoet ad Rumph. T.* XXXIX. *n.* 9.
20. Cylindroides *Bon. n.* 141. **De lange dunne zeldzaame Dadel.**
21. Zimbo, e littore Brasiliano. *Bon. n.* 142. **De Brazilische Dadel**
22. Acutus; ex toto albidus seu leucophæus, unica stria acuta. *List. Tab.* 717. *f.* 1. **De witte Dadel.**
23. Brevis & ventricosus. *List. Tab.* 723. *f.* 10. an cylindrus Madraspatan: medio nubeculoso, clavicula carnea. *Petiv. Gaz. Tab.* 10. *f.* 9?
24. Callosus & diductus. *List. Tab.* 730. *f.* 18. 19.
25. Exiguæ; *List. Tab.* 733. *f.* 22. & *Tab.* 726.
26. Clavicula nodosa. *List. Tab.* 718. *fig. alt. parva.*

GENUS IX.

CUCUMIS.

§. 205. Hoc genus a Dactylis non nisi figura oblonge elliptica differt. Est igitur VOLUTA, oblonga, elliptica, leviter ad extremum turbinata, ore longo falcato sinuose, in apice resecto.

§. 206. SPECIES:

1. Undulatus & maculatus. *List. Tab.* 818. *f.* 31. 32. Pictura exstat in Tab. Nostra V. n. 92.
2. Crassus:
   a. Dense striatus, *List. Tab.* 813. *f.* 23.
   b. Subrufus, maculis albis *List. Tab.* 818. *f.* 29. *Tab.* 813. *alt. fig.*
3. Ad claviculam variegatus; *List. Tab.* 814. *fig. super.*
4. Profunde striatus; *List. Tab.* 819. *f.* 36.
5. Obscure nebulatus; *List. Tab.* 818. *fig. parva.*
6. Fasciis punctatis. *List. Tab.* 812. *f.* 22.

GENUS X.

FICUS.

§. 207. Cochlis tenuis in figuram FICUS voluta. **De Luit / Peer-hoorn / Spaansche Vyg /** *Belg.* **Spansche Feige.**

§. 208.

§. 208. SPECIES:

1. Grisea, rugosa; *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* K.
2. Magna, turbine neritico. Cochlea rugosa, & umbilicata. *Jonston. Tab.* XII.
3. Umbonata. *Bonann. n.* 15.
4. Alabastritica; costosa; *Bonann. n.* 338.
5. Maculata; vel nebulata & fasciata. *List. Tab.* 748. *f.* 42. 43.
6. Longa & teres ex fusco fasciata; *List. Tab.* 741. *f.* 37.
7. Parva, vel subpurpurea maculis fuscis; vel subfusca, bifasciata per strias. *List. Tab.* 749. *f.* 44. 45.
8. Cancellata. *List. Tab.* 750. *f.* 46. Icon exstat in Tab. Nostra V. n. 93.

GENUS XI.

CONCHYLIUM RONDELETII.

§. 209. Est VOLUTA magnæ Tulipæ similis, cujus ex basi turbinata mamilla cylindrica eminet; labium sinistrum plicatur; dextrum ad basin usque productum in apice sinuose resectum est.

§. 210. SPECIES *Unica:* Tela argentea; egregii coloris; instar Drap d'Argent. *Bonann. p.* 111. *n.* 10. *Aldrov. de Pisc. p.* 346. Figuram vide in Tab. Nostra V. n. 94.

GENUS XII.

RADIX BRYONIÆ.

§. 211. Huic radici assimilamus VOLUTAM conicam in decurrente mucrone radiatam.

§. 212. SPECIES.

1. Variegata; seu Buccinum ampullaceum grande, variegatum; clavicula extrema, plana; leviterque muricata. *List. Tab.* 882. *f.* 4.

GENUS XIII.

APORRHAIS.

§. 213. Dicitur obscuro nomine VOLUTA conica; ore longo ad turbinem sinuato.

§. 214.

§. 214. SPECIES:

1: Marmorata; *Liſt. Tab.* 149. *f.* 4. Icon exſtat in Tab. Noſtra V. n. 95.
2. Nubeculata; *Liſt. Tab.* 849. *f. altera;* & *Tab.* 850. *f.* 5.
3. Faſciata; *Liſt. Tab.* 851. *f.* 6.

GENUS XIV.

CONCHA NATATILIS.

§. 215. Eſt voluta Conchiformis, amplo admodum hiatu; infra ſe turbinem oblique colligens. *Fab. Columna de Purpura Cap.* XVIII.

§. 216. SPECIES:

1. Rotundata; ex pullo candicans. Concha natatilis, ſeu Νηκτοίδης minima; perſicæ dictæ recentiorum congenera; *Fab. Columnæ.*
2. Virideſcens, aut ex toto flaveſcens, aut rufa; *Liſt. de Cochl. p.* 164.
3. Faſciata. *Liſt. ib. pag.* 165.
4. Pellucida; in dorſo lævigata; coloris intus lactei, extus cinerei cum tyrio miſti. *Bonann. n.* 332. Figuram vide in Tab. Noſtra V. n. 96.

GENUS XV.

CYMBIUM.

§. 217. Eſt VOLUTA valde inflata; labio velut in Concham explanato, turbine baſeos manifeſto.

§. 218. SPEC. I. Umbilicatum:

1. Concha nautiloides altera magna, *Fab. Col.* Buccinum ſubfuſcum maximum, anguſtum, clavicula excavata; cujusque margo admodum acuta. *Liſt. Tab.* 800. *f.* 7.
2. Subrufa; *Liſt. Tab.* 102. *f.* 8.

SPEC. II. Mammillare: pro turbine mammillam exſerens.

1. Philippinum; ab Inſulis Philippinis. *Bonanni Claſſ.* 3. *n.* 2. Buccinum perſicum majus, clavicula pulvinata. *Liſt. Tab.* 794. *f.* 1. Perſica minor, *Aldrov.* Concha νεκτοίδης altera, lutea, minor: *Fab. Col.*

2. Ibe-

2. Ibericum, coloris modo albidi, modo lividi, modo carnei vel figulini, maculis nigris. *Bon. n. 6.* De Tepelbak *Belg.* Illa Iconem oſtendit Tab. Noſtra V. n. 97.
2. Rugoſum, foris colore ex fulvo caſtaneo; intus candicans, zonis diſtinctum flavis & cinereis. Teſta craſſa in vertice ſemilunata. *Fab. Col. de Purp. Cap.* XVIII.

§. 219. Spec. III. Auritum; labio concavo, inſtar auris in duas extremitates acutas terminante, altero latere voluto; turbine infra baſin.
1. Concha perſica major *Jonſtoni Tab.* XVII. & *Fab. Col. c.* XVIII. Semipedem & unciam longa, palmum lata; coloris ex cinereo flavicantis; intus pallida, nitida, circa Columellam externe rugoſa, aſpera & magis flavicans. Natare, additoque pondere circa interiora, latior pars velificare dicitur.
2. Buccinum perſicum ex rufo nebulatum, clavicula profunde ſulcata, ejusque margine acuta. *Liſt. Tab.* 796. *f.* 3.
3. Aliud parvum; clavicula obtuſa; labio craſſiore. *Liſt. Tab.* 795. *f.* 2.

Spec. IV. Coronatum. Gekroonde Bak of Kroonhoorn / *Rumph.* Bia Sempe *Malab.* *Aliis* Wina. *Chin.* Ongle, i. e. Koningshoorn. *Belg.* Kroontepelbak. Nomen Kroonhoorn rejicitur a *Schynvoetio ad Rumph. p.* 107.
1. Magnum; 15. poll. long. & 9. latitudine; coloris fuſci, maculis albis; intus albidum. Fiunt ex eo vaſa varia. *Rumph. p.* 102. *Tab.* XXXI. *lit.* A. *Liſt. Tab.* 801.
2. Minus; læve, flavo rufum; corona anguſta. *Rumph. Tab.* XXXI. *lit.* B.
3. Teſſeris caſtaneis & violaceis ſuper candido faſciatum; intus quaſi porcellaneum; corona anguſta, circa mucronem inſtar Emboli ſeu Obturaculi prominulum. Alias Velum nauticum, ſeu concha latina ex mari perſico. *Bonann. p.* 112. *n.* 1. *Liſt. Tab.* 797. *f.* 4. vid. *Tab.* 798. An idem, corona detrita? De gebandeerde Kroontepelbak *Belg.*

Spec. V. Muricatum:
1. Faſciatum; ventre breviore; teſta craſſa, rugoſa; in dorſo circa turbinem acute muricata; color albus faſciis lividis diviſus; intus lacteſcens; *Muſ. Klein.*
2. Ampullaceum: Turbine vel acuto vel obtuſo; labris patentioribus. *Liſt. Tab.* 904. *f.* 24. & *Tab.* 905.

Spec. VI. Cochleatum; cujus turbo per modum Cochleæ prominet.

1. Patulum; [illegible] *Belg.* Testa crassa; labio denticulato; dorso cinereo; maculis albis & nigris.
   a. Majus, ovo anatis æquale; rarius. *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* E.
   b. Minus, & globosius; ex cinereo calcarium. *Rumph. p.* 91. *n.* V.
   c. Buccinum persicum; maculis undatum; magnum. *List. Tab.* 799. *f.* 6.

CLASSIS III.

VOLUTA OVATA.

§. 220. Volutæ Ovales extra ventrem oviformem intortum, gyros alios ad extremum figurant.

GENUS I.

BULLA.

§. 221. Bulla videtur formata ex duabus ellipsibus coneavis continuis, quarum altera conglobata in alterius concavitatem, velut in concham, recta devolvitur. *Langio* Nuces maris audiunt. *Bonann.* Cochleæ quasi omnino in concham vulgarem explanatæ; *Belgis:* [illegible].

§. 222. Spec. I. Umbilico simplici; profundo:

1. Limbo simplici. [illegible] *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* G. H. *List. Tab.* 713. *f.* 69.
2. Limbo introrsum flexo; tenuis; coloris varii. *Bon. n.* 4.
3. Limbo simplici valde diducto; tenuis; diversicolor; ex mari Syracusano. *Bon. n.* 3. *Mus. Kircher. n.* 406. *List. T.* 714. *f.* 71.
4. Pyriformis; livida; sessilis; ex purpura violaceo-fusca & quasi velo albo tecta, ad latus sinistrum dentata. *Bon. n.* 246.
5. Ex fusco maculata; utroque latere se colligens; *Fab. Col.* Labro sinuoso; *List. Tab.* 714. *f.* 72. Veneroides *Barbad.* Minor marmorata *Petiv. Gaz. Tab.* 50. *n.* 13. *Sloane It. Jam.* II. *p.* 236.
6. Striis undatis quasi ramosa. *List. Tab.* 715. *f.* 74.

7. Li-

7. Lineis nigris, innumeris, circumpicta; tenuis; interque illas punctata. *List. Tab.* 715. *f.* 75. Figuram vide in Tab. Noſtra V. n. 98.

Spec. II. Umbilico duplici:

1. Subrotunda: *Bonann. Muſ. Kirch. n.* 330.
2. Utrinque acuminata; ore fimbriato. *Ibid. n.* 390.
3. Labro promiſſo & craſſiuſculo. *List. Tab.* 714. *f.* 73.

GENUS II.

OLIVA.

§. 223. Olivas denominamus Volutas parvas, quæ his figura ſunt ſimiles: os longitudinale integrum, nonnihil canaliculatum.

§. 224. Species:

1. Multifaſciata. *List. Tab.* 834. *f.* 61.
2. Bifaſciata. *List. Tab.* 834. *f.* 60.
3. Teſſellata in faſciis. *List. Tab.* 992. *f.* 54.
4. Variegata; rictu compreſſo. *List. Tab.* 824. *f.* 43.
5. Cylindrica; vel Nucleus olivæ. *List. Tab.* 714. *f.* 70. Figuram oſtendit Tab. Noſtra V. n. 99. a. & b.

GENUS III.

PILA.

§. 225. Eſt Voluta in ſphæram acta; circa os dentatum leviter complanata.

§. 226. Species:

1. Marmorea, alba; velut ex ſubucularibus (*a*) filis compacta. *Bonann. n.* 386. Icon exſtat in Tab. Noſtra V. n. 100.

(*a*) Subucula, *veſtis ex linteo ſeu lana interior*: ein unterramiſol/ unterhemde. *Sumitur aliquando pro* funiculo, *quaſi ex lino vel lana conſtricto, apud* autores.

GENUS IV.

PORCELLANA.

§. 227. Porcellanæ audiunt volutæ, utroque labio in ellipticam figuram inter duos velut cardines intortæ.

§. 228. *Synon* Conchæ venereæ. *Ennii* matriculus. *Græcorum* charina; a similitudine pudendæ muliebris; *Græci* χαῖρον, *Latini* porcum vel porculum vocant. *Belg.* Klipkoussen / Kliphoorns. *Malab.* Bia vel Sipo bilalo. Likhoorntjes / i. e. concha lævigatoria. *Amboin.* Huri Hulllu.

§. 229. Spec. I. Longa seu cylindroides.

1. Testudinaria; nitens elegantibus maculis. *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* C. De Karet of Schildpad-hoorn *Belg.* Olim, sed male, *Caap falso*, de valsche Caap. Maxima, longissima, maculis ex fusco rufescentibus. *List. Tab.* 688. *f.* 35. *Tab.* 689. *f.* 36. *Bonanni n.* 258.
2. Argus:
   a. Major, in dorso annulis albis geminis nitida. De dubbelde Argus / *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* D.
   b. Palearis; annulis aureis. *Bonann. n.* 263. De Argus.
   c. Minor; pullo in dorso ocellis albis, confluentibus. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* H. De kleine Argus.
   d. Ocellis albis maculas fuscas intercipientibus. Fusca magna. *List. Tab.* 698. *f.* 45. *Sloane It. Jam. p.* 234. Concha veneris Jamaicensis major oculata. *Petiv. mem. cur. An.* 1708. *p.* 157. *n.* 9.
   e. Ocellis majoribus fasciata. *List. Tab.* 699. *f.* 46.
   f. Ocellis fuscis super albo ventre, quatuor maculis insigni. *List. Tab.* 705. *f.* 54. Figuram ostendit Tab. Nostra VI. n. 101.
3. Talpa. Een Mol; fusca; lateribus nigricantibus; zona triplici in dorso. *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* I.
4. Carneola. Bia dading; coloris obscure carnei; zonis in dorso. *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* K. De Vleesch-hoorn of Vleeschverwige Klipkous *Belg.*
5. Variola; dorso punctato; lateribus maculis variolatis.
   a. Nigris majoribus. Pokken / Roode Maselen / *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* O.
   b. Purpureis minoribus. Maselen; *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* P.
6. Wadaat, *Arabum;* testulæ sunt albæ, nuei Been æquales, & similes species Cauris. *Rumph. p.* 117. Pharmaceutarum Entales, qui filo trajecto fasciculos formatos vendunt.

7. Ovum

7. Ovum Caſuarii. Caſuaris Ep. Inſtar hujusmodi ovi punctis variis diſtinctum; magna ſubinde macula in dorſo comparente. *Rumph. p.* 118. *n.* V.
8. Iſabella: Iſabelle of Garneelen *Belg.*
   a. Tota alba. *Rumph. p.* 118. *n.* 8.
   b. Dorſo pullo, faſciis nigris; circa extrema aurantia. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* G.
   c. Tribus faſciis nigricantibus. *Liſt. Tab.* 666. *f.* 10. vel bifaſciata. *Liſt. Tab.* 673. *f.* 19.
9. Anomala; dorſo hiulco; intus amethyſtina; foris livida, aureis notis. *Bonanni n.* 262.

§. 230. Spec. II. Brevis ſive elatior vel gibba.

1. Guttata; pugni magnitudine, maculis in dorſo nigris, fuſcis, flavisve, ventre candidiſſimo:
   a. Mas, teſta craſſior. *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* A. *Bonn.* 231. 232. *Liſt. Tab.* 672. *f.* 18. *Tab.* 682. *f.* 29. De groote gemeene Kliphoorn.
   b. Femina, teſta tenuior, labro introrſum flexo, maculis cæruleis, inter nigras & flavas; *Muſ. Klein.*
   c. Cinereis notulis, *Bonann. n.* 254.
   d. Sanguineis ſuper cute ceruſſata. *Bonann. n.* 256.
   e. Fuſca, lævis, trifaſciata; grandibus maculis albis. *Liſt. Tab.* 675. *f.* 22.
   f. Bifaſciata. *Liſt. Tab.* 676. *f.* 23.
2. Montoſa. De bergachtige Kliphoorn / de Caap. Caput bonæ ſpei. Super Teſta ſubalbida rubiginoſis maculis montoſa. *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* B.
3. Salita. Zoutkoreltje. Salt Coury. Salt Coralien; a maculis rotundis albis in dorſo cinereo-fuſco, nonnunquam eminentibus: intus venter ex flavedine rubet.
   a. Mas, craſſior; *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* L. *Liſt. T.* 697. *f.* 44.
   b. Femina, tenuior; *Rumph. p.* 115.
   c. Parva purpuraſcens, exiguis maculis albis denſe picta. *Liſt. Tab.* 694. *f.* 41.
   d. Rima candida, dorſo fuſco, maculis albis reticulata. *Liſt. Tab.* 701. *f.* 49. *Tab.* 704. *f.* 53.
4. Lentiginoſa. Kakkerlak; in dorſo elato inter maculas rubi-

ginosas nigras & flavas nonnihil cærulea; ventrem costa per longum dividit:

a. Mas; crassior.

b. Femina; tenuissima, sine costa, coloris dilutioris. *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* N.

5. Achatina, nubeculosa. **Schoon gewolkte Achaate Kliphoorn.** Rarissima species. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* Q.

6. Venter Felis; a macularum similitudine; Carthagenensis alias; rarissima. **De Cartagrense Kliphoorn** / *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* S.

7. Thoracica quarta. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* D. **Blaeuwe Cauris** *Belg.* Schlechte blaue Cauris; cujus dorsum plumbeum, per latera lutea, velut Turcois, ex auro eminet. *Bonanni n.* 240.

8. Nussatellana.

a. Granulata. **Ryskorrels** / *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* I. per longitudinem dorsi elati sulcata.

b. Plumbea ventre subpurpureo dentato. *List. Tab.* 710. *f.* 62.

c. Fusca extremis flavescentibus. *List. Tab.* 708. *f.* 58.

d. Bicornis; capitibus bicornibus subflava. *List. T.* 710. *f.* 60.

e. Fere albida, dorso striato & nodoso, capite utroque bicorni. *List. Tab.* 710. *f.* 61.

9. Globuli. **Knopjes**; sine extremitatibus productis, fibularum instar. Als Knopfe. *Rumph. p.* 118. *n.* II.

a. Granulati; **korrelige Knopjes**; luteoli & albi. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* K.

b. Læves, minores, dorso sulcato; **gladde Knopjes**; luteoli & albi. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* L.

10. Aselli; **Eseltjes**: triplici zona nigra transversali per dorsum album. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* M. Est species, quæ habet fascias aurantii coloris, *Schynvoet ad Rumph. p.* 119.

11. Perlæ; **Paereltjes**; unguis humani magnitudine. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* N.

12. Ursulæ; **Beertjes**; albæ, in dorso maculam pullam ursæ similem ferentes. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* O.

13. Pediculus; **de Luis**; dorso sulcato, per longum transversaliter dense striatus.

a. Nucis avellanæ magnitudine, subalbidus. *Bonann. n.* 239.

b. Pe-

b. Pediculi magnitudine, candidissimus. *Rumph. T.* XXXIX. *lit.* P.

c. Anglicus, sine notabili sulco, ex albido rufescens. Duns *Anglorum. List. de Cochl. p.* 168. & *Hist. Tab.* 707. *f.* 57. Concha veneris Americana, striata, dorso serrato. *Petiv. Mus. n.* 5. *p.* 18. American Duns. *Sloane It. Jam. p.* 235.

d. In dorso sulcata fuscis maculis. *List. Tab.* 706. *f.* 56. *Grew. Mus. Reg. p.* 138. An Concha veneris Americana, striata, exigua, carnea; *Petiv. mem. cur. An.* 1708. *p.* 157. *n.* 16. *Sloane It. Jam. p.* 236?

e. Striata, dorso sinuato nodis exasperato, leviter rufescens. *List. Tab.* 706. *f.* 55.

14. Gibbi; Hoch-ruffen. Hoogruggen/ witte Jamboesen *Belgis.*

a. In dorso angulus transversalis & in utraque extremitate emicans quasi granulum, cum adjuncta micula rubra, sensim evanescente. *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* H. *List. Tab.* 712. *f.* 67.

b. Extremitatibus obtuse rotundis. *Bonann. n.* 249. Concha utroque latere se colligens, *Fab. Col.* cujus medio velut annulo circumcingitur. *List. Tab.* 711. *f.* 64. Conchæ veneris affinis, albus, medio annuloso. *Petiv. Gaz. Tab.* 15. *f.* 5. Het bastaard Wevers-spoeltje of Jokje *Belg.*

c. Fimbriata in circuitu, coloris ossei. *Bonann. n.* 339.

15. Caricoides a figura, utroque extremo elongato, leucophæa, punctis subflavis distincta, *Bonann. n.* 243.

16. Interlinearis punctata, notulis rotundis & castaneis. *Bon. n.* 248.

17. Bezoardica seu Porcellana Sicula seu Tarentina. *Bon. n.* 251.

18. Literata seu Arabica; Arabische Letterhoorn/ *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* M.

19. Ficus a figura. *Bonann. n.* 259.

20. Cruciata, fasciis quatuor per longum & totidem per transversum exporrectis. *Bonann. n.* 266.

21. Fasciata guttata; innumeris fere coloribus aspersa. *Bon. n.* 267.

22. Ovalis, lævis in basi sensibili, spira in apice exserto, canaliculo ornato. *Bonanni n.* 325.

23. Tumida, seu toto ventre & lateribus leviter gibbosis, albido dorso. *List. Tab.* 657. *f.* 2.

24. Ci-

24. Cinerea, ventre candido, utroque capite croceo, dorſo nigris lineolis & puncturis depicto. *Liſt. Tab.* 660. *f.* 4.
25. Undoſa, parva, ventre ſubluteo, maculoſo. *Liſt. Tab.* 661. *f.* 5.
26. Admodum lævis, undatim nubeculoſa, clavicula acuta, prominula. *Liſt. Tab.* 662. *f.* 6.
27. Eadem aut valde ſimilis, dorſo gibboſo. *Liſt. T.* 663. *f.* 7.
28. Faſciata:
    a. Lævis, faſciis obſcuris & fere obliteratis. *Liſt. T.* 665. *f.* 9.
    b. Fuſca, valde lævis, duabus faſciis albidis. *Liſt. T.* 667. *f.* 11.
    c. Craſſa, ventre ſubcroceo, tribus faſciis albidis. *Liſt. Tab.* 667. *f.* 12.
    d. Parva, ſubcinerea, unica faſcia fuſca. *Liſt. T.* 668. *f.* 13.
    e. Subfuſca parva, lævis, elato dorſo bifaſciato. *Liſt. Tab.* 670. *f.* 16. Concha veneris Jamaic. fuſca, faſciata, rima rufeſcente. *Petiv. Gaz. Tab.* 8. *f.* 85. *Sloane It. Jam. p.* 235.
    f. Magna, lævis, trifaſciata, ſubcinerea; *Liſt. T.* 669. *f.* 15.
    g. Ex fuſco rufeſcens, bifaſciata. *Liſt. Tab.* 671. *f.* 17.
29. Oculata, parum latiuſcula, paululum gibboſa. *Liſt. Tab.* 696. *f.* 43. Concha veneris minor maculata & oculata. *Petiv. Gaz. Tab.* 9. *f.* 7.

§. 231. Spec. III. In uno latere fimbriata. *Fimbria* h. l. eſt latus impar vel per angulum, vel per labium duplicatum protuberans.

1. Achatina, candide maculoſa. De witgeplekte Achaate Kliphoorn/ *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* R.
2. Glauco-Dorſum. Blaauwrug/ oblongo labio dextro fimbriato; albo dorſo obſcure maculato; quatuor oculis circa extremitates nonnunquam conſpicuis. *Rumph. T.* XXXIX. *lit.* F.
3. Faſciata; faſciis
    a. Binis, albis in dorſo ex purpureo flaveſcente. *Bon. n.* 235.
    b. Bifaſciata, anguſta, livida; *Liſt. Tab.* 674. *f.* 20.; an Concha veneris cæruleſcens parva; *Petiv. Gaz. T.* 30. *f.* 3?
    c. Bifaſciata, fuſcis maculis picta. *Liſt. Tab.* 677. *f.* 24.
    d. Bifaſciata, pictura tabeſcente & quaſi detrita. *Liſt. Tab.* 679. *f.* 26.
    e. Trifaſciata, violaceo-lactea, maculis purpureis. *Bonann. n.* 234.
    f. Trifaſciata, lacteo-purpureis faſciis, marginaliter aureis. *Bonann. n.* 236.

g. Tri-

g. Trifaſciata, ipſo ventre & denticulis nigricantibus. *Liſt. Tab.* 668. *f.* 14.

h. Trifaſciata, angusta, divida, lateribus maculatis. *Liſt. Tab.* 674. *f.* 21. An concha veneris cæruleſcens, *Petiv. Gaz. Tab.* 30. *f.* 9.?

i. Pluribus faſciis aureis vittata. *Bonann. n.* 238.

4. Mitra polonica; labro albo excreſcente. *Bonann. n.* 237.

5. Undoſa ſeu flammea; varii coloris. *Bonann. n.* 242.

6. Belliculus (quaſi belliſſimus) minimus, lacteus, *Bonann. n.* 244. 245.

7. Teſtudo, dorſo longitudinaliter ſulcato. *Bonann. n.* 250.

8. Labiis niveis. *Bonann. n.* 253.

9. Chalcographica; ſuper livido albeſcens. *Bonann. n.* 260.

10. Oculata; parva; aureo fulgore tecta. *Bonann. n.* 359.

11. Sublivida, quaſi bifaſciata, magnis maculis in lateribus. *Liſt. Tab.* 680. *f.* 27.

12. Plumbea aut leviter purpuraſcens. *Liſt. Tab.* 656. *f.* 1.

13. Salita, craſſa, ſubfuſca, maculis albis, ad latus ſtriata. *Liſt. Tab.* 693. *f.* 40.

14. Lata, gibba, maculis fuſcis diſtincta; *Liſt. Tab.* 685. *f.* 32.

§. 232. SPEC. IV. In utroque latere fimbriatæ:

1. Caput Serpentum majus, ventre plano, nigricante, ex caſtaneo maculoſo. De groote Slangekop / *Rumph. T.* XXXVIII. *lit.* E. *Bon. n.* 261. *Liſt. Tab.* 703. *f.* 52.

2. Caput Serpentum minus. De kleine Slangekop *Belg.*

a. In dorſo ſubcæruleo venoſe luteum. De blaeuwe Slangekop / *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* G.

b. Craſſum, ventre lato, rima albida, lateribus nigricantibus; dorſo ſummo albis maculis picto, vel etiam faſcia flavida diſtincto. *Liſt. Tab.* 702. *f.* 50. *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* F.

3. Thoracica, oculata. Witoogje / Zandblakje; pollicem longa, fimbria laterum plicata, rima ventris dentata; intus rubra; dorſo ſubcinereo; lateribus maculatis. Longior: *Rumph. T.* XXXIX. *lit.* A. Brevior, vel latior; *Liſt. T.* 690. *f.* 37.

4. Stellata, thoracica; Sterretje; ſtellulis rubiginoſis in dorſo albido diſtincta, lateribus ex fuſco caſtaneis. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* B. *Bonann. n.* 247. In inſulis Philippinis uſum pecuniæ præſtat.

5. Thoracica vulgaris, sive Caurica; gemeene geele Cauris; vulgo: Schlangen-köpffe Pharmaceutarum, Siamensium nummi, thesauro digni habiti regibus. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* C. *Bon. n.* 233. *List. Tab.* 709. *f.* 59.
6. Circinata, in fimbria helva (*a*) sive lignea; ventre albo; in summo dorso amethystina. *Bonann. n.* 255.
7. In clathro stellata; ventre albo; in lateribus livida; in rufo dorsi gibbosi clathro albis stellulis insignis. *Bonann. n.* 247.
8. Dracæna, Draakenhooftje / cujus in dorso pallide cinereo, macula insulæ, vel, si mavis, Draconi similis, apparet. *Rumph. Tab.* XXXIX. *lit.* E.
9. Tygris, a maculis venustissime variis. De Mozambieksche Kliphoorn / *Bonann. n.* 264. & 265.
10. Literata; a Freto Sunda. *List. Tab.* 658. *f.* 3. *Tab.* 659. *f.* 51.
11. Clathrata, in dorso subflava. *List. Tab.* 664. *f.* 8.
12. Ex viridi fuscescens, gibbosa. *List. Tab.* 687. *f.* 34.
13. Salita:
    a. Cinerea, infinitis albis punctulis. *List. Tab.* 691. *f.* 39.
    b. Ventre leviter purpurascente; *List. Tab.* 701. *f.* 48.
    c. Ventre & lateribus flavescentibus; *List. Tab.* 692. *f.* 38.
    d. Dorso subflavo. *List. Tab.* 695. *f.* 42. an, concha veneris parva fulva circulis albis, *Petiv. Gaz. Tab.* 8. *f.* 3?

(*a*) Helvus, ledergelb.

§. 233. Spec. V. Rostrata.

1. Ovum *Rumphii; Malaice:* Sipat Saloacco. Testa uniformis, præter limbum ante & retro elongatum, extus alba & quasi vitrea; intus violacea. Mas habet testam crassiorem. Ey of witte Porcelein-hoorn / *Rumph. Tab.* XXXVIII. *lit.* Q. *Bonann. n.* 252. *List. Tab.* 711. *f.* 65.
2. Leviter striata, utroque capite valde rostrato. *List. T.* 711. *f.* 63. Est valde rara & pretiosa. Het Jokje of Wevers Spoeltje *Belg.*
3. Purpurascens leviter, tenuis, parva; *List. Tab.* 711. *f.* 66.
4. Dorso parumper annulato, leviter striato, unico, ut mihi videtur, latere fimbriato. *List. Tab.* 712. *f.* 68.

GE-

GENUS V.

CASSIS.

§. 234. CASSIDES ſunt Turbines ſua baſi in ventrem vaſtum, oblongum, dilatati, utroque labio exſerto, fimbriato, tandem in recurvum canaliculum abeunte, apprime ſimiles veterum Romanorum Caſſidibus. Kaskketten / Stormhoeden / *Belg.* Sturm-Hauben / Beckel-hauben.

§. 235. SPEC. I. Lævis:

1. Cinerea, globoſa; mucrone obtuſo trochoide, quaſi funiculis cincto, labio fimbriato, per faſcias latas diviſo, verſus canaliculum anteriorem recurvum & patulum per duos ſinus ſemilunares dentatus. Graauwe Kaskket of gemeene Bezoar-hoorn *Belg. Malab.* Bia bawang, ab odore allii, quem ſpirat caro comeſta; Bia Cabeſette Kitzjil. *Rumph. Tab.* XXV. *lit.* A.
2. Areola (*a*). Bedtelien. Mucro trochoides, acutus, paſſim fimbriatus.
   a. Alba, per ſeries caſtaneo colore teſſellata; De kleine geblakte Bezoar. *Rumph. Tab.* XXV. *lit.* B. Buccinum recurviroſtrum ventricoſum, *Liſt. Tab.* 996. *f.* 60.
   b. Alia, teſſeris majoribus. De groote geblakte Bezoar-hoorn / *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXV. *n.* 1.
   c. Teſſeris aureis ſuper albo, trocho rugoſo. *Bonann. n.* 154. Figuram vide in Tab. Noſtra VI. n. 102.
   d. Buccinum recurviroſtrum leviter cancellatum, magnis maculis quadratis rufis. *Liſt. Tab.* 997. *f.* 62.
3. Virgata; virgis a mucrone fimbriato ad verticem excurrentibus. De geſtreepte Bezoar-hoorn / *Rumph. Tab.* XXV. *n.* 2. *Liſt. Tab.* 1014. *f.* 78.
4. Dorſo fimbriato, mucrone cochleato, fimbriis maculoſis. *Rumph. Tab.* XXV. *n.* 9. Buccinum recurviroſtrum, ventricoſum, variegatum, ſtriis rarioribus exaſperatum, *Liſt. Tab.* 996. *f.* 61.
5. Arcularia minor; teſta exigua; mucrone elongato; coloris cinerei nitentis. Bia totombo. Dicitur *Arcularia*, quia ſtramineis

(*a*) Areola, ein klein garten Bett.

mineis ciſtulis intexitur. Kleine Kofferhoorntje / of Oogſtens Slek / *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* N.

6. Articularia major, mucrone acute elongato, coloris cinerei nitentis. Groote Kofferhoorntje of Oogſtens-Slek. *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* M.

7. Anglicana; Cochlea rufeſcens, faſciis maculatis, maxime ad imos orbes diſtincta; mucrone acuto. *Liſt. de Cochl. p.* 163.

8. Venoſa velut Achates. *Bon. n.* 152. *Liſt. Tab.* 1015. *f.* 73.

9. Buccinum recurviroſtrum, columella calloſa; rufum; læve. *Liſt. Tab.* 973. *f.* 28.

§. 236. Spec. II. Sulcata ſeu per longum ſtriata.

1. Flammea:

a. Flammis puniceis, fimbria albo-nigra parum tuberculoſa. De grolambe Kasket / *Rumph. Tab.* XXIII. *n.* 2. *Liſt. Tab.* 1007. *f.* 71.

b. Sulcis profundioribus, flammis obſcurioribus, mucrone nodoſo. De geribde Kasket / *Rumph. Tab.* XXIII. *n.* 3.

c. Flammis luteis; *Muſ. Klein.*

2. Crumena Gallorum; mucrone acuto, & circa calicem plicato. *Bonann. n.* 161. *Liſt. Tab.* 1002. *f.* 67.

3. Faſciatim flammea; mucrone ex ventre ovali velut neritico. *Bonann. n.* 162. *Liſt. Tab.* 1001. *f.* 66.

4. Plicata; rugoſa; mucrone echinato. *Bonann. n.* 163.

5. Breviroſtra, columella calloſa, *Liſt. Tab.* 971. *f.* 26.

6. Ponderoſa; Buccinum recurviroſtrum, ſummo labro & imo quoque orbe leviter muricatis. *Liſt. Tab.* 1016. *f.* 74.

§. 237. Spec. III. Striata.

1. Coſtoſa; coſtis rotundis, ſpiralibus, craſſis, labio nodoſe fimbriato. *Rumph. Tab.* XXV. *n.* 7. *Bonann. n.* 22.

2. Annularis: nam in concurſu dorſi & trochi eſt annulus: mucro elongatus. De dwarsgeſtreepte Bezoar. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXV. *n.* 4.

3. Coſtoſa & ſulcata; fimbria maculoſa; turbine obtuſo; maculis puniceis ſuper coſtis. De geribde of gebaarende Bezoar. *Rumph. Tab.* XXV. *n.* 5. *Bon. n.* 20. *Liſt. T.* 999. *f.* 64.

4. Labio triplicato, mucrone trochiformi. *Bonann. n.* 21.

5. Clathrata, fimbria altera in roſtrum falcatum producta. *Bon. n.* 157. *Liſt. Tab.* 1000. *f.* 65. magnis maculis quadratis, rufis.

6. Ro-

6. Rotundior; coſtoſa; coloris nunc calthei (*a*), burrhis (*b*) maculis diſcriminati, nunc maculis ſanguineis cruentati. *Bonann. n.* 158.
7. Faſciata, labio fimbriato, magno, coloris ravi (*c*). *Bon. n.* 159.
8. Recurviroſtra, ſulcata, ſtrigis profundis tripliciter diſpoſitis. *Bonann. n.* 160.
9. Multicolor. *Bonann. n.* 323.
10. Columella calloſa; buccinum cancellatum minus. *Liſt. Tab.* 970. *f.* 25.
11. Labroſa, aſpera, craſſa, ore croceo. *Liſt. Tab.* 988. *f.* 48.

(*a*) Calthæ paluſtri *concolor.*
(*b*) Burrhus röthlich/ roodagtig.
(*c*) Ravus, *flavo griſeus*, gelbgrau.

§. 238. SPEC. IV. Verrucoſa:
1. Setoſa; Haarige Oor; Oorlieze; Oorhoorn; Haarsteur; coloris ſubflavi, coſtis verrucoſis; ſetis ſiccis, tandem deciduis; ore labioſo, verrucoſo, auriformi, *Rumph.* T. XXIV. *lit.* F.
2. Piloſa; ventre planiore priori; cætera ſimilis, ſed pilis mollioribus & denſioribus. *Rumph. p.* 82. §. 6.

§. 239. SPEC. V. Muricata.
1. Caſſis cornuta ſeu tuberoſa. Offerhoy; gehoornde Storms hoed; Bia Cabeſette; Krang boekoe. Hubuſſata; an Aporrhais *Ariſtotelis? Rumphius* negat, quia non ad ſcopulos, ſed ſub arena hæret.
   a. Minor; dorſo ſtriato; per vices tuberculoſa; tuberculis, maxime in trochi & dorſi concurſu, eminentibus, ſuper albo exterius rufo micans, intus per labia denticulata flaveſcens. *Rumph. Tab.* XXIII. *lit.* A.
   b. Major & antiquior, quantitate humani capitis, quinque ſaltim muricibus in trochi & dorſi concurſu, reliquis in teſta ſepultis, labio craſſo, lato, faſciato; teſta exterior alba, minus elegans. *Rumph. p.* 80. *n.* 1. *Liſt. T.* 1008.
2. Caſſis rubra; roode Stormhoed. Red Kasket-Shell; rarior; in dorſo faſcias transverſales nigro fuſcas inter ſulcos & ſuper faſciis verrucas ordinans; ventre rufo, loturæ carnis ſimilis. *Rumph. Tab.* XXIII. *lit.* B.

3. Caſſis granulata; de gebreide Stormhoed of Hoedje. Tota ſtriis granulatis inter coſtas rotundas craſſiuſculas carminata, muricibus in trochi & dorſi concurſu condenſatis. *Rumph. Tab.* XXIII. *n.* 1. *Bonann. n.* 155. *Liſt. Tab.* 1006. *f.* 70. *Tab.* 1009.
4. Bezoar ferum; de wilde Bezoar; mucrone nigro, granulato, duabus ſeriebus verrucatum per dorſum transverſalibus; teſta tenuis, leucophæa. *Rumph. Tab.* XXV. *n.* 3.
5. Rugoſa per transverſales & obſcuras corporis globoſi coſtas, trochoide mucrone granulato, in concurſu dorſi lentiginoſo: teſta transparens leucophæa, nitens, velut faſciis obliteratis vittata. *Liſt. Tab.* 998. *f.* 63.
6. Drap d'Argent; ſulcata per longitudinem, maculis croceis ad quincuncem diſpoſitis. *Bon. n.* 156. Het geribt Weſtindiſch Stormhoedje.
7. Gibboſa; a gibbis, quæ in ſingulorum orbium latere intumeſcunt, oris apertura valde anguſta. *Bon. n.* 279. 280. *Liſt. Tab.* 833. *f.* 57.
8. Labroſa, ſeu craſſo labro circumſepta. *Bon. n.* 329.
9. Columella, velut callo quodam diffuſa. *Liſt. T.* 970. *f.* 24.
10. Dorſo bullato. *Liſt. Tab.* 972. *f.* 27.
11. Aurita & tuberculoſa; teſta inferne crocea, *Aldrov.* Hiulca, mucrone clathrato, eleganter marmorato. *Liſt. Tab.* 1004. *f.* 69. Burſa Jamaicenſis, maxima, nodoſa. *Pet. mem. curr. an.* 1708. *p.* 190. *n.* 18. *Sloane It. Jam. p.* 242.
12. Purpura, minus muricata, *Aldrov. p.* 284. Eſt Caſſis longiuſcula per longum ſegmentata, circa mucronem trochiformem muricibus parvis coronata; oris labium ſiniſtrum eſt calloſum, dextrum fimbriatum & muricatum; canalis anterior per lacinias muricatus; intus colore ferrugineo flaveſcente & eleganter cæruleo varia.

GENUS VI.

SEMICASSIS.

§. 240. Semi-Cassides ſunt Volutæ Caſſidibus a dextero latere apprime ſimiles, ſed ab altero ſiniſtro per ſcapum, ſimpliciter ſine labio intortum, diverſæ.

§. 241.

§. 241. Spec. I. Lævis.

1. Venter; **Buikje.** Testa tenuis mucrone trochoides; ore patulo.
   a. Sulcis per longum, densis maculis quadratis, obscuris. *Mus. Klein.*
   b. Major & globosior, sulcatus, coloris flavescentis. *Rumph. Tab.* XXV. *lit.* C. Icon exstat in Tab. Nostra VI. n. 103.
2. Serpentaria; testa tenuis; fimbria fasciata; ante dentata; lineis serpentinis super dorso lævi.
   a. Alba, serpentulis flavis. **Het gladde Koontje** / *Rumph. Tab.* XXV. *lit.* E.
   b. Clathrata, lineis fere insensibilibus per ventrem & clathrum; *Mus. Klein.* serpentibus obscure flavis.
3. Ignave viridis, minor, luteo micans, gyris verrucosis. *Rumph. p.* 84. *n.* IV.
4. Cochleata, in turbine; ventre magis longo quam rotundo; fimbria maculosa; anteriori in parte dentata; testa leviter rugosa, tota lactea. *Rumph. Tab.* XXV. *n.* 8.
5. Nubecula, globosa, alba; nubibus castaneis; mucrone cochleato, *Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* D. *List. Tab.* 1016. *f.* 75.
6. Citrea, mucrone per longum sinuose striato. *Bonann. n.* 8.
7. Eburnea, seu Turbo auritus *Aldrov. Bonann. n.* 151.
8. Corrugata; labio crasso; tyriis notulis tessellato; turbine cochleato; super dorso venose picta. *Mus. Klein.*
9. Trochoides; *List. Tab.* 1012. *f.* 76.
10. Musicalis; in rostro lentiginosa. *Bonann. n.* 298.
11. Labro brevi, simplici; *List. Tab.* 1007. *f.* 71.
12. Ex fusco undata. *List. Tab.* 818. *f.* 31.

§. 242. Spec. II. Striata.

1. Verrucosa ad Trochum; fimbria labii fasciata, coloris nunc albi, nunc pulli. **Het gestreepte Koontje** / *Rumph. Tab.* XXV. *lit.* D.
2. Costosa:
   a. Labio simplici, plicato; figuræ globosæ; maculis albis super luteo. **De geknobbelde Welhoorn of blikkige Olphoorn** / *Rumph. Tab.* XXVII. *lit.* B.

b. Ca-

b. Canaliculo tubuloso. *List. Tab.* 792. *f.* 45.
c. Umbilicata in fine spirarum. *Bonann. n.* 25.
d. Mucronata. *List. Tab.* 898. *f.* 18.

§. 243. Spec. III. Muricata,

1. Et in concursu mucronis dorsique verrucosa; sulcata; fimbria maculosa, coloris lactei. *Rumph. Tab.* XXV. *n.* 7.
2. Fasciis dorsi inter seriem muricum versus mucronem duplicem, versus canaliculum fimbriatum simplicem. *Rumph. Tab.* XXIV. *n.* 2. *Bon. n.* 186. De dubbelde getakte of gedoornde Beddeteik of Schildpadstaart/ *Belg.*
3. Crispata, instar pomi passi, spissis rugis aspera, intus alba, foris onychina. *Bonann. n.* 273.
4. Aculeata; aculeis longis; ore labra reflectente. *Bon. n.* 285.
5. Cassis aspera, *Rumph. Tab.* XXIII. *lit.* D. fusca, striata in concursu trochi & ventris conici muricata, labio simplici denticulato, & serrato, ore intus albo; *Mus. Klein.*

GENUS VII.

CASSIS BICORNIS.

§. 244. Est Turbo oris utroque labio diducto, antrorsum duos canaliculos recurvos formans, quibus a Cassidibus distinguitur.

§. 245. Species:

1. *Fabii Columnæ de purp. cap.* I. §. 27.; obsolete purpurea, vel cærulea vel flavicans, oblique percurrentibus purpuro-nigris maculis ex oris margine in interna parte ventricosa. *Id. ib.* §. 33. *List. Tab.* 952. *f.* 1. Purpura mediterranea rigosa, fasciis castaneis & albis translucidis; *Petiverii.*
2. Purpura Tarentina. *Bonann. n.* 272.
3. Echinophora, sive Echinata; a validis aculeis in primo circuitu eminentibus; ut plurimum alba in parte exteriore, quæ partim malleo videtur contusa, partim in pulvillis tumens; labium oris est plicatum, mucro nodosus, elongatus. *List. Tab.* 1010. *Bonann. n.* 274. Icon exstat in Tab. Nostra VI. n. 104.
4. Compressa, longis ac teretibus aculeis. *List. Tab.* 949. *f.* 44.

GE-

GENUS VIII.

CITHARA.

§. 246. CITHARA eſt Voluta valde diducta & inflata, coluris (*a*) longitudinariis, labio ſimplici, dentato, fimbriato; circa mucronem muricibus rectis coronata.

(*a*) Coluri *ſunt circuli per longitudinem teſtæ, ut ſolent in ſphæra geographica, ducti.*

§. 247. *Synon.* Bia Saraſſa. Bia Baſaghi. Ob Buſighi. Chiſant / Harp / *Belg.* Buccinum breviroſtrum, labroſum; coſtis latis plicabilibus & acutis diſtinctum. Concha μειρακίου altera minor variegata, *Fab. Col.* Tairwing, *Angl.*

§. 248. SPECIES:

1. Major; de graauwe Chiſant; coluris incarnatis; ſpatiis magnis, rubris albisque feneſtratis, ventre interiore nigricante. *Rumph. Tab.* XXXII. *lit.* K.
2. Media; nobilis; de edele Harp of bonte Chiſant; priori melius picta, quaſi floſculis, ſuper maculis rubris; coluri ſunt nigri fuſcis vittati, labium oris dentatum. *Rumph. ib. lit.* L. *Bonann. n.* 185.
3. Minor, oblonga, de kleine Chiſant; coluris exilibus; ſpatiis cinereis, leviter feneſtratis. *Rumph. Tab.* XXXII. *lit.* M. Figuram vide in Tab. Noſtra V. n. 105.
4. Alba; de witte Chiſant / *Schynvoet ad Rumph. p.* 107.
5. Roſea; de roozenroode Chiſant / *Schynvoet ibid.*
6. Valde craſſa; coſtis paucioribus longitudinariis. *Liſt. T.* 993. *f.* 56.
7. Anguſta, coſtis tenuioribus; *Liſt. Tab.* 994. *f.* 57.
8. Coſtis latis, plicabilibus, & acutis. *Liſt. Tab.* 992. *f.* 55.

CLASSIS IV.

ALATA.

§. 249. ALATAS dicimus, cum *Rumphio*, Cochlides compoſitas, quæ labium inſigniter expandunt, & ad anteriorem canaliculum ſinum exſciſſum habent. Si labium in murices abit, dicuntur ſpeciali nomine; CORNUTA. Gevleugelde Hoorns; Laphoorns / Krabben / *Belg.*

GENUS I.

MONO-DACTYLUS.

§. 250. Est TROCHO-CONUS alatus seu labiosus, in processum styliformem terminans.

§. 251. SPECIES:

1. Bilinguis, major, ex rufo radiatus, muricatus, unico digito in imo labro. *List. Tab.* 873. *f.* 29.
2. Alius subfuscus; rictu subcroceo. *List. Tab.* 871. *f.* 25. Murex bilinguis Jamaicensis, vulgaris. *Petiv. mem.* 1708. *p.* 189. *n.* 3.
3. Marmoreus, striatus & virgatus. *List. Tab.* 874. *f.* 30.
4. Undequaque candidus; notulis sanguineis. *Bon. n.* 309-310.
5. Pugiles: **Schermers; Wyzers**/ ab indice posteriore; **geknobbelde Laphoorntjes.**
   a. Striatus ex livido & flavo, super albo varius, intus ruber, & ad stylum vinosus. *Rumph. Tab.* XXXVII. *lit.* R. *Bonanni n.* 301. *List. Tab.* 872.
   b. Fuscus in dorso micans ex albo; labio crasso, rotundo; intus ruber; *Rumph. p.* 111. *n.* XI.
   c. Dentatus ad apicem. *Bonann. n.* 302. Iconem ostendit Tab. Nostra VI. n. 106.
   d. Ex rufo variegatus. *List. Tab.* 871. *f.* 26.
   e. Aureus, circa oris aperturam, digito curto. *Bon. n.* 306.

GENUS II.

HARPAGO.

§. 252. Ab uncis dicitur TROCHO-CONUS, labiosus, torosus, tympanosus, in sex murices acutos & aduncos fissus. Ultimus ad mucronem longissimus; duo sequentes & sibi oppositi sunt recurvi, instar cornu bovini; reliqui tres breviores, valde adunci. Testa ab extra alba; maculis fuscis picta. Pentadactylus, *Plinii.* **Vyf-vinger-Krab/ Bootshaak/ Duivelsklaauw/** *Belg.*

§. 253. SPECIES:

1. Mas; muricibus canaliculatis, gracilioribus clausis; testa crassa, maculis magis rufis quam nigris. **Het Manneken.** *Rumph.*

Rumph. Tab. XXXV. *lit.* A. *Bonann. n.* 312. *Liſt. Tab.* 870. *f.* 24. Pentadactylus *Bellon. Aldrov.*

2. Femina; teſta tenuis; micis nigris, muricibus breviſſimis. Het Wyfken/ *Rumph. Tab.* XXXV. *lit.* B.

GENUS III.

HEPTA-DACTYLUS.

§. 254. Eſt TROCHO-CONUS, labio in ſeptem murices diviſo. Bia Cattam. Tatallan-Sipe. Murex caracoides, *Jonſtoni.*

§. 255. SPECIES:

1. Maculoſus; muricibus longioribus; dorſo coſtato paſſim tuberculoſo; maculæ nigricantes; *Rumph. Tab.* XXXV. *lit.* E. De gepleckte of gebulte krab.
2. Flavus, muricibus anterioribus recurvis. *Rumph. T.* XXV. *lit.* F. De geele gebuchelde krab.
3. Aporrhais; mas. *Aldrov. Liſt. Tab.* 866. *f.* 21.
4. Femina; nigro maculoſa. Het Wyfje van de geele krab. *Rumph. Tab.* XXXVI. *lit.* G. Teſta tenuior, pro muricibus plicas habens, eodem ordine diſpoſitas.
5. Cornuta, decumana; teſta craſſa, gravis; in limbo murices breves; dorſum gibbum, ſalſilagine incruſtatum. *Rumph. Tab.* XXXV. *lit.* H.
6. Nodoſa, ſive Podagra; mas; Scorpius; Scorpioen of Podagra-kreeft. Knot-vinger; ſeptem muricibus longis & nodoſis per limbum diſpoſitis; roſtro longo & recurvo; ore ſtriato, ex rubro & nigro vario; coſtis albis. *Rumph. Tab.* XXXVI. *lit.* K. *Bonann. n.* 314. *Liſt. Tab.* 867. *f.* 22.
7. Femina; pro corniculis protendit plicas longiores quinque præ cæteris. Het Wyfje van de Podagra-kreeft/ *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XXXVI. *n.* 1. *Liſt. Tab.* 875. *f.* 31.

GENUS IV.

MILLEPES.

§. 256. Eſt TROCHO-CONUS labioſus & cornutus; ex labio 10. vel 11. murices curvos protendens; ſuper dorſo nodoſo lineis rufis & nigris piſtus. Duizendbeen of Zonneſtraal-krab/ *Belg.*

§. 257. SPECIES:

1. Subalba, dense micans; striis rufis. *Rumph. Tab.* XXXVI. *lit.* I. *List. Tab.* 868. *f.* 23. *Tab.* 869. *f.* 24.
2. Sanguinea, intus alba. *Bonann. n.* 311.

GENUS V.

LENTIGO.

§. 258. LENTIGO, seu Alata lentiginosa dicitur Testa Alata, tota velut lentibus obsita. **Sproetjes of Kikvorsen.** Bia Taylala.

§. 259. SPECIES:

1. Multicolor; super albo colore flavo, cinereo, distinctus. *Rumph. Tab.* XXXVII. *lit.* Q. *Bonann. n.* 300.
2. Tenuis; ex rufo nebulata. *List. Tab.* 860. *f.* 17. Icon exstat in Tab. Nostra VI. n. 107.
3. Gravis, labro crasso, seu pulvinato. *List. Tab.* 861. *f.* 18.

GENUS VI.

ALATA LATA.

§. 260. Est TROCHO-CONUS, quasi plicatus; obscure flavus; maculis rufis; intus lævis & carneus; labio rotundo effuso insignis.

§. 261. SPECIES:

1. Costosa; Tallan. **De groote Laphoorn of Talanhoorn / de Breedlip /** *Belg. Rumph. Tab.* XXXVI. *lit.* L. *List. T.* 862.
2. Clavicula dense striata. *List. Tab.* 856.
3. Labro & Columella subcrocea, muricibus acutis horrida. *Bonann. n.* 304. *List. Tab.* 864. *f.* 19.
4. Garagoi, cornuta. *Bonann. n.* 404. *List. Tab.* 863.
5. Variegata. *List. Tab.* 859. *f.* 15. ore interno subpurpureo.
6. Leviter rostrata. *Bonann. n.* 299. **De getakte of gekroonde Laphoorn.**
7. Carcer; labio insigniter expanso; ore valde angusto. *Bon. n.* 307. **Het Kemphaantje /** *Belg.* Figuram ostendit Tab. Nostra VI. n. 108.

CLAS-

CLASSIS V.

MUREX

§. 262. MURICES antiquo nomine, ſed vago, dicuntur hoc loco Cochlides angulares, quaſi ex duplici pyramide compoſitæ & exochis pluribus aſperæ. Getakte en doornachtige Kasketten/ *Belg.*

GENUS I.

MUREX FRONDOSUS.

§. 263. Cujus Exochæ ſunt criſpæ; foliis Braſſicæ nonnihil ſimiles.

§. 264. SPECIES:

1. Triangularis. Bia Unam; Laynoa; Paleynoa; Saſſalon; getakte Kasket/ Krulhoorn/ Oenam hoorn. Teſta dura, verrucoſa, muricibus canaliculatis, reclinatis, per tres ſeries diſpoſitis; pone cretata, ante nitida; intus alba; labiis carneis. *Rumph. Tab.* XXVI. *lit.* A.
2. Brandaris. Bia Papua. Mantyers. Brandhoorntjes.
   a. Niger & quaſi aduſtus ſuper albo, laciniis criſpis. *Rumph. Tab.* XXVI. *lit.* C. *Bonann. n.* 276. Purpura ſeu murex, pelagius, marmoreus; *Fab. Col. Liſt. Tab.* 946. *f.* 41.
   b. Fuſcus; muricibus longioribus. *Rumph. p.* 86.
   c. Flaveſcens; mucrone obtuſo; muricibus brevioribus. *Rumph. p.* 86. *Bonann. n.* 275.
   d. Brandaris duplex, nigris laciniis ſuper albo corpore per plures ſeries aſperata. De dubbelde Brandaris of Brandhoorn/ *Rumph. Tab.* XXVI. *n.* 2. Figuram vide in Tab. Noſtra VI. n. 109.
   e. Duplex; faſciis & laciniis nigris. *Schynvoet ad Rumph. pag.* 86. *Liſt. Tab.* 945. *f.* 40.
3. Scorpius parvus; mucrone brevi; ventre longo; faucibus ſimilibus Scorpionum forficulis; coloris cinerei. Het Scorpioentje/ *Rumph. Tab.* XXVI. *lit.* D.
4. Minor, cinereus; muricum breviorum ſeriebus. *Rumph. p.* 86. *n.* III.

GENUS II.

MUREX COSTOSUS.

§. 265. Definitio patet ex titulo.

§. 266. SPECIES:

1. Triangularis; labio duplicato. De Verkensbek. *List. Tab.* 941. *f.* 37. *Bonann. n.* 290. *Aldrov. p.* 285. Buccinum Jamaic. triangulare. *Petiv. mem.* 1708. *p.* 190. *n.* 15. Triangular Wilk. *Mus. Soc. Reg. p.* 130. *Tab.* 10. *f.* 12. *Sloane It. Jam. p.* 250.
2. Quinquangularis; *Rumph. p.* 85. *List. Tab.* 944.
3. Saxatilis, *Rumph. Tab.* XXVI. *lit.* B. De Voetthoorn/ etiam de gedroogde of roode gebrande Peer/ *Belg.*
4. Pyrum siccum; de gedroogde Peer; a similitudine: quo nomine appellatur a *Rumphio pag.* 86. *Tab.* XXVI. *lit.* E. Icon exstat in Tab. Nostra VI. n. 110.

PARTIS PRIMÆ.

APPENDIX.

COCHLIDUM OPERCULA.

GENUS I.

UMBILICUS.

§. 267. UMBILICI dicuntur lentes testaceæ convexo-planæ, umbilico similes, quibus cochleæ nonnullæ, velut operculo, clauduntur.

§. 268. *Synon.* Matta Bulan. Maans-Oogen. Venus-Nabelen.

§. 269. SPECIES:

1. Umbilicus maximus, cochlearum lunarium majorum, seu ex Aure Gigantum; palmam latus; leviter cochleatus; subtus fuscus; cute facile deterenda. Het dekzel van de Reuzen-Oor/ *Rumph. Tab.* XX. *lit.* A.
2. Niger, cochleæ petholatæ majoris, pulcherrimus, nitidus, viridi & ferruginoso mixtus. De zwarte Venus-Navel/ *Rumph. Tab.* XX. *lit.* B.

3. Pla-

3. Planior, & umbilici figura insignis, ex aurantio flavescens. De Middellandsche Nabel/ *Rumph. Tab.* XX. *lit.* C.
4. Granulatus, ex cochlea sulcata, nigra, & cochlea aspera minore, ignobilis:
   a. Sub planitie nigricans. De gekorrelde of gepaerelde Venus-Nabel. *Rumph. Tab.* XX. *lit.* D.
   b. Nonnihil cavus; extra albescens, sine nitore. De ongelaerde Middellandsche Nabel of van anderen / *Rumph. Tab.* XX. *lit.* E. Figuram vide in Tab. Nostra VI. n. 111.
5. Convexior, *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XX. *lit.* F.
6. Subviridis planior. *Idem ad Rumph. Tab.* XX. *lit.* G.
7. Carneolus. *Bonanni n.* 14.
8. Lentiformis, leviter convexus; in lithologicis aliquando sub titulo: Numismatum lapides, Transylvaniæ, aliorumque locorum. obvii similes. Umbilicus, parvulus, marinus, lapidem numismaticum referens, in Liburni littore repertus; *Jani Planci App. ad Phytobas. Fab. Col.*

GENUS II.

OPERCULUM CALLORUM.

§. 270. CALLUS est Limacis species, in dorso gerens testulam unguiformem, quæ operculum dicitur.

§. 271. SPECIES:
1. Oblongum. *Rumph. Tab.* XL. *lit.* L.
2. Rotundum, instar patellæ. *Rumph. Tab.* XL. *lit.* M.
3. Incurvum. *Rumph. Tab.* XL. *lit.* N.

GENUS III.

UNGUIS ODORATUS.

§. 272. UNGUES ODORATI dicuntur cochlearum opercula squamata & quasi cornea; unguibus & colore & figura quodammodo similia; in pharmaceuticis ad Thymiamata expetita.

§. 273. *Synon.* Onyx; Conchula indica; *Arab.* Adfaro Tibi. Ostraceon *Plinii. Hebr.* Schelet (*Exod.* XXX: 34.). Quod *Bochartus* minus convenienter BDELLION interpretatur. *Mal.* Uvam Carbou;

bou; Ambelau; Laccanuga; Lagnia Matta. *Sinenſ.* Lepi & Hicle. vid. *Rumph. p.* 89.

§. 274. SPECIES:

1. Major, ſeu Taurina; Muricis majoris operculum, acute ellipticum, ſinuoſe curvum; thalero æquale; extra cinereum, ſulcatum; intus altero latere craſſiuſculum & læve; altero tenuius & vorticoſum; coloris fuſci; odoris gravis. *Rumph. p.* 87. *num.* I.
2. Blatta Byzantina, a Byza, urbe Africæ, non *Byzantio*, priori ſimilis. *Rumph. ib.*
3. Onyx ſecunda, ſive Moſcha; Unam Caſturi. Operculum Purpuræ; ſemidigitum longum & unicum latum, craſſiuſculum, nigricans, ſinuoſe curvum; griſeum; intus fuſcum; margine fimbriato rotundo, lævi, altero plano & rugoſo. *Rumph. ib. n.* II.
4. Onyx minima & moſchata; Unam Caſturi. Ungui humano æqualis, curvus, ſinuoſus; operculum Muricis ramoſi, optimi odoris. *Rumph. p.* 88. *n.* III. *Tab.* XX. *n.* 6.
5. Onyx quarta; Blattæ ſpecies. Operculum Buccini Tritonis; folio ſimile, quinque pollices longum; 2½ latum; calamum ſtramineum craſſum, gibbum, planum, extra griſeo-tartareum, odore quam prior ignobiliori. *Rumph. ibid. n.* IV. *Tab.* XX. *n.* 4.
6. Onyx quinta; Blatta quinque uncias longa, duas lata, utrinque acuminata; fuſca; lævis; in medio ſinuoſa. Operculum Buccini Arvani. *Rumph. ibid. n.* V. *Tab.* XX. *n.* 3.
7. Onyx ſexta, plana, tenuis, ungui pollicis æqualis; extra coſtoſa, lamellis conſtans; operculum Hauſtelli & Tribuli. *Rumph. ibid. n.* VI. *Tab.* XX. *n.* 5.
8. Onyx ſeptima, tertiæ æqualis, ſed tenuior, planior; operculum Cochleæ patulæ; boni odoris. *Rumph. ibid. p.* 88. *n.* VII.
9. Onyx octava, minor, rotundior; craſſior; operculum Muricis minoris. *Rumph. p.* 88. *n.* VIII.
10. Onyx nona, *Dioſcoridis*, operculum Siſſe, ſeu Cochleæ paluſtris, planum, tenue, unciale; extra tophaceum, intus argenteum, nitens, odoris ignobilis. *Rumph. ibid. n.* IX.

Nota: Quia his Cochlidum operculis inter curioſa locus conceditur, nec ſemper conſtat, quibus præciſe teſtis olim adhæſerint; eadem appendicis loco recenſenda adinvenimus; plura, ſi quando obvia, addantur.

INDI-

INDICULUS.

Tabularum LISTERI (Hist. Conchyl.) in Paragraphis primæ hujus Operis Partis, quæ ad COCHLIDES pertinet, reperiundarum; prætermissis figuris dubiis, severiori examini relinquendis.

Sinistra *columna Numeros Tabularum Listeri*; Dextra *Paragraphos nostræ Methodi indicat.*

COCHLIDES.

Tabb. Listeri.	Par. Meth.
8. *f.* 2. 3. - -	90.
9. *f.* 10. - - -	89.
11. - - - -	90.
12. - - - -	86.
13. - - - -	147.
15. - - - -	70.
17. - - - -	90.
18. & 19. - -	89.
20. *f.* 15. - -	89.
20. *f.* 16. } 21. *f.* 17. } - -	74.
22. *f.* 19. }	
25. 26. & 27.	161.
28. - - - -	119.
30. - - - -	121.
31. - - - -	147.
32. - - - -	96.
34. & 35. - -	147.
37. - - - -	89.
38. - - - -	90.
40. - - - -	74.
42. & 43. - -	40.
50. - - - -	34.
55. - - - -	39.
56. - - - -	18.
59. - - - -	65.
60. - - - -	17.
61. *f.* 58. - -	65.
63. - - - -	20.
64. & 65. - -	17.
66. - - - -	21.
67. *f.* 65. - -	17.
f. 66. - -	20.
69. - - - -	20.
70. 71. & 72.	17.

Tabb. Listeri.	Par. Meth.
73. *f.* 71. - -	18.
f. 72. - -	20.
74. *f.* 73. - -	20.
75. - - - -	34.
76. - - - -	21.
77. - - - -	30.
78. *f.* 78. & 79.	17.
79. 80. & 81.	17.
83. - - - -	31.
84. - - - -	40.
85. & 86. - -	17.
87. & 88. - -	31.
91. 92. & 93.	31.
94. 95. & 96.	31.
97. 98. & 99.	31.
108. - - - -	147.
109. - - - -	90.
110. - - - -	89.
113. - - - -	90.
114. - - - -	157.
115. & 116. -	90.
117. & 118. -	89.
119. - - - -	90.
120. - - - -	76.
121. *f.* 16. & 17.	76.
122. - - - -	76.
123. - - - -	157. & 158.
124. - - - -	157.
126. - - - -	121.
128. - - - -	167.
129. - - - -	39.
131. - - - -	167.
136. - - - -	12.
137. - - - -	21.
138. - - - -	12.

Tabb. Listeri.	Par. Meth.
139. - - - -	17.
140. - - - -	17.
141. - - - -	55.
142. - - - -	59.
Vid. Indiculum II. CONCHARUM.	
550. *f.* 1. - -	6.
2. - -	10.
3. - -	6.
551. & 552. -	6.
554-557. - -	7.
559. *f.* 1. - -	39.
2. - -	40.
560. *f.* 3. & 4.	39.
5. - -	59.
561. - - - -	39.
563. - - - -	39.
564. - - - -	40.
565. *f.* 12. - -	39.
13. - -	40.
566. *f.* 14. - -	40.
15. - -	59.
16. - -	55.
567. *f.* 17. - -	39.
18. - -	40.
568. & 569. -	40.
571. - - - -	55.
572. *f.* 23. - -	29.
574. *f.* 26. & 27.	6.
576. *f.* 29. - - } 30. - - }	121.
577. *f.* 31. - -	31. & 43.
32. - -	31.

I N D I C U L U S.

Tabularum *Listeri* ad COCHLIDES.

Tabb. Listeri.	Par. Meth.
578. - - - -	90.
579. - - - -	137.
583. *f.* 36. - -	147.
37. & 38.	121.
584. *f.* 39. - -	111.
40. & 41.	121.
42. - -	119.
585. - - - -	121.
586. & 587. -	121.
588. *f.* 47-50. -	87.
51. - -	150.
52. - -	86.
589. - - - -	74.
590. - - - -	74.
591. - - - -	74.
592. & 593. -	74.
595. *f.* 1. - -	42.
2. & 3. -	43.
596. *f.* 4. & 5. -	42.
6. & 7. -	43.
597. - - - -	43.
598. *f.* 11. - -	43.
12. & 13.	42.
14. - -	43.
599. - - - -	43.
600. *f.* 17. - -	43.
601. 602. & 603.	42.
604. - - - -	55.
605. - - - -	55.
606. - - - -	55.
607. *f.* 39. & 40.	34.
41. & 42.	57.
43. & 44.	55.
608. *f.* 45. - -	37.
46. - -	27.
46. - -	36.
610. - - - -	51.
611. & 612. -	52.
613. & 614. -	52.
616. & 617. -	65.
618. - - - -	65.
619. - - - -	66.
620. - - - -	65.
622. - - - -	23.
623. - - - -	68.
624. - - - -	70.
625. & 626. -	66.
627. - - - -	25.
628. & 629. -	66.

Tabb. Listeri.	Par. Meth.
630. & 631. -	66.
632. - - - -	66.
634. & 635. -	17.
636. - - - -	17.
637. & 638. -	119.
640. *f.* 30. - -	115.
641. - - - -	119.
642. & 643. -	119.
644. - - - -	68.
645. - - - -	119.
646. - - - -	66.
647. - - - -	108.
648. *f.* 42. - -	35.
43. - -	31.
649. & 650. -	17.
651. & 652. -	17.
653. *f.* 51. - -	36.
52. - -	35.
53. - -	34.
654. - - - -	119.
656. - - - -	231.
657. - - - -	230.
658. - - - -	232.
659. - - - -	232.
660. & 661. -	230.
662. & 663. -	230.
664. - - - -	232.
665. - - - -	230.
666. - - - -	229.
667. - - - -	230.
668. *f.* 13. - -	230.
14. - -	231.
669. & 670. -	230.
671. & 672. -	230.
674. - - - -	231.
675. & 676. -	230.
677. - - - -	231.
678. - - - -	229.
679. & 680. -	231.
681. - - - -	233.
682. - - - -	230.
685. - - - -	231.
687. - - - -	232.
688. & 689. -	229.
690. & 691. -	232.
692. - - - -	232.
693. - - - -	231.
694. - - - -	230.
695. - - - -	232.

Tabb, Listeri.	Par. Meth.
696. & 697. -	230.
698. & 699. -	229.
701. *f.* 48. - -	232.
49. - -	230.
702. & 703. -	232.
704. - - - -	230.
705. - - - -	229.
706. - - - -	230.
707. & 708. -	230.
709. - - - -	232.
710. - - - -	230.
711. - - - -	233.
712. *f.* 67. - -	230.
68. - -	233.
713. - - - -	222.
714. *f.* 70. - -	224.
71-73. -	222.
715. - - - -	222.
717. & 718. -	204.
719. & 720. -	204.
721. *f.* 6. - -	204.
7. - -	207.
722. - - - -	101.
723. - - - -	204.
724. & 725. -	204.
727. & 728. -	204.
729. - - - -	101.
730. & 731. -	204.
732. & 733. -	204.
734. & 735. -	204.
736. & 737. -	101.
738. - - - -	187.
739. & 740. -	204.
741. - - - -	208.
744. & 745. -	187.
747. - - - -	202.
748. & 749. -	208.
750. - - - -	208.
751. - - - -	177.
753. & 754. -	187.
755. - - - -	187.
757. & 758. -	187.
759. - - - -	188.
760. - - - -	187.
761. - - - -	188.
763. & 764. -	187.
765. - - - -	187.
766. - - - -	188.
767. *f.* 16. - -	187.

I N D I C U L U S.

Tabularum *Liſteri* ad COCHLIDES.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
767. *f.* 17.	188.
768. & 769.	187.
770. & 771.	187.
772. & 773.	187.
774.	188.
775.	187.
777.	187.
779. *f.* 25.	188.
26.	187.
780. & 781.	187.
782. & 783.	187.
785. & 786.	187.
787.	188.
788. & 789.	187.
790.	187.
792.	242.
794.	218.
795. & 796.	219.
797. & 798.	219.
799.	219.
800.	218.
801.	219.
802.	218.
804.	45.
805. & 806.	198.
807.	198.
808.	200.
809.	198.
810.	192.
811.	167.
812. *f.* 21.	198.
22.	206.
813.	206.
814.	137. & 206.
815.	177.
816.	177.
818. *f.* 20.	206.
819. *f.* 33.	92.
34.	185.
35.	154.
36.	206.
820.	52.
821.	92.
122. *f.* 38.	92.
39.	92.
41.	141.
824.	224.
826.	141.
827.	141. & 137.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
828.	141.
829.	192.
830.	167.
831.	141.
832.	167.
833.	239.
834. *f.* 59.	96.
60. & 61.	224.
835.	96.
836.	76.
837.	73.
838.	92.
839.	92.
840.	92.
841. & 842.	73.
843. & 844.	73.
845. & 846.	73.
848.	155.
849. & 850.	214.
851.	214.
853.	165.
854.	173.
855.	152.
856.	261.
858.	155.
859. *f.* 15.	261.
16.	143.
860. & 861.	259.
862.	261.
863. & 864.	261.
865.	84.
866. *f.* 21.	255.
f. altera.	84.
867.	255.
868. & 869.	257.
870.	253.
871. & 872.	251.
873. & 874.	251.
875.	255.
877. & 878.	177.
882.	212.
883. *f.* 5.	177.
6.	191.
885. & 886.	192.
887.	192.
889.	191.
890.	192.
891.	191.
892.	177.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
893.	177. & 192.
894. & 895.	167.
896.	167.
897.	139.
898.	167.
899. & 900.	167. & 181.
901.	181.
902.	183.
903.	181.
904. & 905.	219.
906.	192.
907. & 908.	177.
911.	143.
912.	154.
913.	154.
914. *f.* 6.	175.
7.	154.
915.	175.
916.	173.
917.	175.
918.	175.
919.	154.
920.	175.
922.	155.
924.	175.
925.	154.
926. *f.* 19.	152.
20.	154.
927.	155.
928.	192.
929. *f.* 24.	152.
930.	155.
931.	143.
932. & 933.	143.
934.	134.
935.	143.
937.	143.
938.	141.
939.	130.
940.	141.
941.	266.
942.	167.
943.	137.
944.	266.
945. & 946.	264.
948.	155.
949.	245.
952.	245.
953.	141.

INDICULUS.

Tabularum *Liſteri* ad COCHLIDES.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
955. - - - -	167.
956. *f.* 7. - -	167.
8. - -	138.
957. *f.* 9. - -	167.
10. - -	167.
958. - - - -	132.
959. & 960. -	126.
962. - - - -	132.
963. - - - -	92.
967. - - - -	92.
968. - - - -	141.
969. - - - -	155.
970. *f.* 24. - -	239.
25. - -	237.
971. - - - -	236.
972. - - - -	239.
973. - - - -	235.
974. - - - -	94.
976. *f.* 31. - -	130.
32. - -	90.
977. *f.* 34. - -	92.
978. - - - -	92.
979. - - - -	73.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
980. - - -	86.
981. *f.* 40. - -	92.
41. - -	94.
982. & 983. -	94.
984. - - -	139.
985. - - -	167.
986. - - -	167.
987. - - -	165.
988. - - -	237.
989. - - -	59.
990. - - -	167. & 139.
991. *f.* 53. - -	167.
992. *f.* 54. - -	224.
55. - -	248.
993. - - -	248.
995. - - -	141.
996. - - -	235.
997. - - -	235.
998. - - -	239.
999. - - -	237.
1000. - - -	237.
1001. & 1002. -	236.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
1003. - - -	138.
1004. - - -	239.
1005. - - -	235.
1006. - - -	239.
1007. - - -	236.
1008. - - -	239.
1010. - - -	245.
1011. - - -	167.
1012. - - -	241.
1013. - - -	92.
1014. - - -	235.
1016. *f.* 74. - -	236.
75. - -	241.
1017. - - -	78.
1018. *f.* 80. - -	78.
81. - -	76.
1019. - - -	76.
1020. *f.* 83. - -	78.
84. - -	132.
1021. - - -	76. & 78.
1022. - - -	130.
1023. - - -	134.

METHODI
OSTRACOLOGICÆ.
PARS II.
EXHIBENS
CONCHAS.

CONCHARUM.
TABULA SYNOPTICA.

- CONCHA. §. 275.
  - I. MONO-CONCHA. §. 278.
    - 1. Patella. §. 280.
      - Integra. §. 282.
      - Lacera. §. 287.
    - 2. Anfata. §. 289.
      - Calyptra. §. 290.
      - Cochlearia. §. 293.
      - Mitra Hungarica. §. 295.
      - Cochlo-Lepas. §. 297.
  - II. DICONCHA. §. 299.
    - I. Æqualis. §. 299.
      - Connivens. §. 302.
        - Figurata. §. 303.
          - 1. Avicula. §. 304.
          - 2. Tudes polonica. §. 307.
          - 3. Isognomon. §. 310.
          - 4. Parallelepipedum. §. 312.
        - Oſtreum. §. 314.
          - Longum. §. 315.
          - Mater perlarum. §. 317.
          - Læve. §. 320.
          - Imbricatum. §. 322.
          - Plicatum. §. 324.
          - Muricatum. §. 326.
        - Muſculus. §. 328.
          - Acutus. §. 329.
          - In latum oblique expanſus. §. 331.
          - Mammarius. §. 333.
        - Cyclas. §. 335.
        - Aurita. §. 337.
          - Pecten. §. 338.
          - Amuſium. §. 342.
          - Pſeud-Amuſium. §. 345.
          - Ctenoides. §. 347.
          - Radula. §. 349.
          - Vola. §. 351.
          - Triquetra. §. 353.
          - Spondylus. §. 355.
          - Mytulo pedunculus. §. 357.
        - Cordiformis. §. 359.
          - Hemicardia. §. 360.
          - Iſocardia §. 362.
          - Anomalocardia. §. 366.

CON-

CONCHA.

- I. Æqualis.
  - Interrupta. §. 369.
    - Sulcata. §. 370.
  - Umbilicata. §. 372.
    - Cricomphalos. §. 373.
    - Actinobolus. §. 375.
    - Omphalo-Clathrum. §. 377.
  - Sinu profundo. Chama. §. 379.
    - Chamatrachæa. §. 380.
    - Chamæfæa. §. 384.
    - Quadrans. §. 388.
  - Sinu prominulo: Tellina. §. 390.
    - Circinata. §. 391.
    - Virgata. §. 394.
    - Striata. §. 396.
    - Granulata. §. 398.
    - Lævis. §. 400.
    - Muricata. §. 402.
  - Pyloris. §. 403.
    - Solenbivalvis. §. 405.
    - Concha longa biforis. §. 408.
    - Pholas. §. 410.
    - Concha longa uniforis. §. 412.
    - Muſculus polyleptoginglymus. §. 414.
    - Pinna. §. 416.
    - Concha Eboracenſis. §. 419.
    - Glicimeris. §. 420.
    - Mactra. §. 422.
- II. Inæqualis. §. 424.
  - Terebratula. §. 426.
  - Concha trilobas. §. 428.
  - ——— adunca. §. 430.
  - Burſula. §. 432.
  - Globus. §. 434.
  - Stola. §. 436.
  - Concha anſata. §. 438.

II. DICONCHA.

III. POLYCONCHA; Anatifera. §. 440.

IV. NIDULI TESTACEI. §. 445.
- Balanus. §. 446.
  - Monolopos. §. 448.
  - Polylopos. §. 450.
- Aſtrolepas. §. 452.
- Capitulum. §. 454.

V. Echinus marinus. §. 456.

VI. Tubulus marinus. §. 457.

METHODUS OSTRACOLOGICA SISTENS COCHLIDES ET CONCHAS.

PARS SECUNDA.

CONCHA.

§. 275. ONCHAS præcise vocamus teſtas vaſculorum inſtar explanatas & concavas; quas animalia, prout appellantur, exſanguia varii generis ita inhabitant, ut eorundem, pariter ac in COCHLIDIBUS obtinet, partes conſtitutivæ ſint, quibus orbatis peritura.

§. 276. Differentiam Concharum principalem & primam petimus a numero; quibusdam enim ejusmodi vaſculum unicum eſt; aliæ duabus Conchis gaudent. Quo reſpectu Conchas commode in MONOCONCHAS & DICONCHAS diſpeſcimus.

§. 277. Polyconchas, vulgo ſic dictas, Nidulosque teſtaceos, Methodi Parti III. reſervamus.

SECTIO I.

MONOCONCHA.

§. 278. MONOCONCHÆ ſunt Thalami teſtacei, ex una ſaltim concha fabrefactæ. Eenſchaalige Schulpen / [illegible] / *Belg.*

§. 279. Vulgo dicuntur UNIVALVES, pariter ac Cochlides Univalvia appellantur, μονόδυχα; nam conchæ in Diconchis nunc patulis, nunc clauſis, aſſimilantur valvis: quo caſu loquendi ratio convenit, ut conchæ concha valva ſit: ſed quid portæ, quid valvæ vices ſuſtinet in Cochlidibus & Monoconchis? Qui quodvis teſtaceorum, etiam turbinatorum, genus indiviſim ad univalvia pertrahunt, ex canalibus & tubulis valvas faciunt, non ſine rerum verborumque confuſione.

CLASSIS I.

PATELLA.

§. 280. PATELLÆ ſunt Monoconchæ convexo concavæ ad ſcutorum veterum ſimilitudinem plus minus, plerumque leviter acuminatæ.

§. 281. *Synon.* Lepas. Lopas *Plauti.* Lambroas ſeu Lampas *Luſit.* πομέλιοι; πελαγλὶς *Græc. Jonſt. Charlet.* Lapido, *Maſſil.* Oeil du Bouc *Gall.* Pantalena *Venet. Rondel.* [illegible] / Schotteltje / *Belg.* Bia Sabla *Malab.* Schüſſel-Napff / Schnal-Muſchel / Schüſſelgen *Gesner. Valent. Langio.* White and Red Lampet *Angl.*

GENUS I.

PATELLA INTEGRA.

§. 282. PATELLAM dicimus INTEGRAM, cujus margo ſubrotundus & æquabilis.

§. 283. SPEC. I. Striata:

1. Indica, major; ſtriis planis, ſtrigibus rugoſis; intus ſuper livido cruenta, extus opalina. *Bonann. cl.* 1. *n.* 4.
2. Cypria, ſtriis craſſis, ſtrigibus profundis; baſi elliptica, extus lutea, intus alba. *Bonann. n.* 3.
3. Striis rugoſis inæqualiter undata; *Jonſton. Tab.* XVI.

4. Denſe

4. Denſe ſtriata, circa os verticale fimbria lata, *Bellon. Jonſt. ib.*
5. Faſciata, *Jonſtoni.*
6. Leviter ſtriata; intus viridis, extra e fuſco rufeſcens. *Liſt. Tab.* 528. *f.* 4.
7. Viridis, ſtriis clarioribus, maculis albis, foramine utrinque nigricante. *Liſt. Tab.* 528. *f.* 5.
8. Nodoſa in ſtriis; *Liſt. ib. f.* 6. *Sloane Hin. Jam. p.* 232. Patella Barbadenſis rugoſa, *Petiv. Gaz. Nat. Tab.* 80. *f.* 12.
9. Variegatæ *Fab. Col.*, ambitu minus anguloſo, flavente, velut faſciata, maculis fuſcis binis per interſtitia exornata, interius alabaſtritica, in umbilico ſplendide flava; exterius parum ſtriata, pallida, maculis nigro flaventibus, radiatim ſuper margine poſitis, in ſuperna parte rufe flava; apex candicans.
10. Ex livido cinerea; *Liſt. de Cochl. p.* 195. Teſta craſſa, varie maculoſa ex livido & cinereo. Patella ſtriata mediæ magnitudinis, e rubro cinerea, vertice aperto. *Sloane p.* 233.
11. Plicata diverſimode, foramine circinato notabilis. *Liſt. Tab.* 528. *f.* 7.
12. Maculata ſtriis capillaribus, per plicas carminata. *Liſt. Tab.* 535. *f.* 14.
13. Papillaris, ſeu patella ſubfuſca, exiguis tuberculis ſecundum ſtrias rugoſas aſpera. *Liſt. Tab.* 536. *f.* 15.
14. Nigra magna, tenuiter admodum & rugoſe ſtriata, vertice acuto integro. *Liſt. Tab.* 537. *f.* 16.
15. Nigricans minor, capillaceis ſtriis pectinata, ex Africa. *Liſt. ib. f.* 17. Icon exſtat in Tab. Noſtra VIII. n. 1.
16. Albida, intus citrina, extus raris puncturis ſanguineis elegante picta. *Barbad. Liſt. Tab.* 537. *f.* 18. *Sloane p.* 231.
17. Nivea, plicis undoſe ſtriatis, vertice acuto. *Barbad. Liſt. Tab.* 537. *f.* 19. Figuram oſtendit Tab. Noſtra VIII. n. 2.
18. Oblonga, miniata, irregulariter & rugoſe ſtriata. *Liſt. Tab.* 538. *f.* 21.
19. Nigra, ſtriis latioribus albis alternatim radians ex vertice albicante. *Liſt. Tab.* 539. *f.* 23. Patella minor rotunda, nigra elata, radiis albis diſtincta, *Sloane p.* 231. Patella galeata, parva, coſtis albis, inæqualibus, *Petiv. mem.* 1708. *p.* 157. *n.* 4. *Gaznat. Tab.* 80. *n.* 10. *Cat.* 583.

20. Patella, ſtriis nigris donata; ipſo vertice albo, nigra linea cincto. *Liſt. Tab.* 539. *f.* 22.
21. Magna, fulva, lateribus paululum compreſſis, denſe & leviter ſtriata, vertice adunco. *Liſt. Tab.* 541. *f.* 25.
22. Decem radiis. *Liſt. Tab.* 529. Patella minor elata, radiis vel faſciis rubris, vertice aperto. *Sloane p.* 231.

§. 284. Spec. II. Reticulata ſeu clathrata:
1. Lutea, vel cinerea. *Bonann. n.* 6. *Jonſton. T.* XVI.
2. Clathri denſioris, eadem cum præcedenti. *Liſt. Tab.* 527. *f.* 2. (*a*) Figuram vide in Tab. Noſtra VIII. n. 3.
3. Teſſellata. Lepas nova. Myrti morbus, *Fab. Col.* Effigie terreſtris teſtudinis, tabellis anguloſis conſtructa; colore cinereo, ad purpuram inclinante; inferna parte, qua hæret caudici, cava; *de Purp. Cap.* VII.
4. Clathri muricati. *Liſt. Tab.* 527. *f.* 1.
5. Depreſſa, ad marginem ſinuoſa. *Liſt. Tab.* 528. *f.* 3. Patella minor compreſſa, oblonga, cinerea, vertice perforato. *Sloane p.* 232.
6. Ovalis, ſeu patella albida, cancellata, lateribus paululum compreſſis. *Liſt. Tab.* 537. *f.* 20. *Sloane p.* 232.
7. Exigua, alba; fiſſura notabilis in margine. *Liſt. Tab.* 543. *f.* 28.

(*a*) *Patella cinerea cancellata, vertice elato, aperto;* Sloane p. 233. Petiv. Gaz. Tab. 8. n°. II. Cat. n. 58. Barb. *Thimble Limpet* Muſ. Kirch. p. 463. n°. 6.

§. 285. Spec. III. Virgata vel circinata.
1. Major, *Rumphii Tab.* XL. *lit.* A.
2. Circinata, alba; variis coloribus punctata; *Bonann. n.* 7.
3. Patella oblonga, circinata, articulata; articulis ſtriatis, intus e viridi cæruleis. Oſcabrion Carolinenſis perelegans, ſquamis bifariam variegatus. *Pet. Gaz. Tab.* 1. *f.* 3. Limax marina *Rumphii pag.* 38. *Tab.* X. *n.* 4. *Sloane p.* 233.
4. Patella oblonga, articulata; articulis extus albidis, intus e viridi fuſcis. *Sloane ib.*

§. 286. Spec. IV. Lævis:
1. Cypria major; *Aldrov. Jonſt. Tab.* XVII. *n.* 2.
2. Cypria minor. *Rumph. Tab.* XL. *lit.* D.

3. Re-

3. Reticulatim picta, parva; vertice lævi. *Liſt. Tab.* 538. *f.* 8.
4. Ingens, nigris latisque maculis picta. *Liſt. Tab.* 531. *f.* 9.
5. Patella rotunda, lævis ad alterum latus maculis quibusdam ſpiralibus donata; ipſo vertice muricato. *Liſt. T.* 546. *f.* 39.

GENUS II.

PATELLA LACERA.

§. 287. LACERA nobis PATELLA audita cujus margo variis angulis diſcerpitur.

§. 288. SPECIES:

1. Irregulariter ſtriata, candida. *Bonann. n.* 5.
2. Mucronata, ſeptem angulis, velut totidem coſtis in marginem irregularem exporrectis. *Rumph. Tab.* XL. *lit.* B.
3. Laciniata, irregularibus canaliculis radioſa. *Rumph. Tab.* XL. *lit.* C.
4. Depreſſa, nigra; ſeptenis ſtriis, ſtellæ inſtar, radiata. *Liſt. Tab.* 532. *f.* 10. Figuram exhibet Tab. Noſtra VIII. n. 4.
5. Alba, paucis & valde eminentibus ſtriis ſeu plicis ſtellata. *Liſt. Tab.* 532. *f.* 11. *Sloane It. Jam. p.* 237. Icon videatur in Tab. Noſtra VIII. n. 5.
6. Irregulariter octangula; ſtriis maculatis & punctatis. *Liſt. Tab.* 538. *f. alt.*
7. Lepas maxima ſtriata. *Fab. Col. Liſt. Tab.* 533. *f.* 12.
8. Patella ingens variegata; quinque ſtrigibus radiata; cætera lævis. *Liſt. Tab.* 534. *f.* 13.
9. Patella major, tenuis; compreſſa, ſtriata, cinerea; maculis crebris e rufo fuſcis variegata, vertice albo; *Sloane p.* 232. *Tab.* 240. *f.* 16. 17.
10. Polylobos ſeu patella ingens; intus alba, extus maculoſa, quinque ſulcis ad magna intervalla donata, cætera lævis. *Liſt. Tab.* 540. *f.* 24.

CLASSIS II.

ANSATA.

§. 289. ANSATAS dicimus Monoconchas, proceſſu quodam inſtructas, quo veluti per anſam prehendi queunt.

GENUS I.

CALYPTRA.

§. 290. CALYPTRÆ nomen imponimus Monoconchis rotundis, notabili processu conico obliquo ad figuram pileorum, quos nautæ & mulieres plebejæ in Belgio gerunt, accedentes.

§. 291. *Synon.* Wischhutten / Schlapjes / Matroosen-Mutzen. Fischer-Weiber-Hauben.

§. 292. SPECIES:

1. *Rumphiana* alba, intra officula rotunda tubuli instar instructa *p.* 123. *Tab.* XL. *lit.* P. Q. De Kotskap *Belg.*
2. Canaria seu patella optime lævigata; uberis papillam exhibens, tota lactea, perspicuo fuco tecta. *Bonann. n.* 12.
3. Patella fluviatilis, fusca, vertice mucronato inflexoque. *List. de Cochl. p.* 151. & *Hist. Tab.* 141. *f.* 39.
4. Patella lævis, fusca, marina. *List. Tab.* 542. *f.* 26. Icon exstat in Tab. Nostra VIII. n. 6. & 7.
5. Patella alba, compressa, lævis. *List. Tab.* 545. *f.* 37. Figuram vide in Tab. Nostra VIII. n. 8.
6. Patella minima aliquot cæruleis lineis picta. *List. T.* 543. *f.* 27.
7. Patella alba, striata, sinu quodam ad lunulæ figuram donata. *List. Tab.* 546. *f.* 38.

GENUS II.

COCHLEARIA.

§. 293. Sunt Monoconchæ ovales in umbonem, velut ansam COCHLEARIS, terminantes.

§. 294. SPECIES:

1. Pennata, seu pennarum Gallinacearum more picta. De Hoorn-tebop / *Rumph. Tab.* XL. *lit.* O.
2. Maculosa ex nigro & albo. *Schynvoet ad Rumph. p.* 79. *Tab.* XXII. *n.* 8.
3. Subrufa tenuiter striata, sive cancellata, vertice inflexo. *List. Tab.* 544. *f.* 30. Figuram exhibet Tab. Nostra VIII. n. 9.

4. Pa-

4. Patella lævis, denſe maculata, admodum compreſſa. *Liſt. Tab.* 545. *f.* 34.
5. Patella lævis, ex purpura nigricans, eleganter reticulata, roſtro paululum inflexo. *Liſt. Tab.* 545. *f.* 36.

GENUS III.

MITRA HUNGARICA.

§. 295. Eſt Conulus valde diductus, apice parum intorto.

§. 296. SPECIES:

1. Patella alba, hirſuta, ſtriata, vertice intorto. *Liſt. Tab.* 544. *f.* 32. Figuram vide in Tab. Noſtra VIII. n. 10.
2. Patella ſtriata, craſſa, maculis exiguis rufis diſtincta. *Liſt. Tab.* 545. *f.* 33.
3. Patella ſtriata, vertice acuto, admodum oblique prociſa. *Liſt. Tab.* 544. *f.* 29.

GENUS IV.

COCHLO-LEPAS.

§. 297. Eſt Monoconcha in conum inclinantem irregulariter quaſi turbinata.

§. 298. SPECIES:

1. Patella rugoſa, alba, admodum craſſa, *Liſt. Tab.* 544. *f.* 31. Icon exſtat in Tab. Noſtra VIII. n. 11. & 12.

NB. Inter foſſilia Gedanenſia duas Patellarum ſpecies ſingulares offendi, nunquam antea viſas; miratus, neminem hactenus theſauros noſtros intra lapides arenoſo-lutoſos duriſſimos latitantes, in primis *Cochlitas* & *Conchitas*, aut obſervaſſe aut hactenus publicaſſe, teſte NOMENCLATORE LITHOLOGICO PROMOTO ſive AUCTARIO *Sciagraphiæ Lithologicæ curioſæ* (MS.) *cum figuris.*

SECTIO II.

DICONCHÆ ÆQUALES.

§. 299. DICONCHÆ ſunt Teſtæ ex duobus vaſculis cavis compoſitæ. Doubletſchulpen *Belg.*

§. 300. Requirimus duo vaſcula, non teſtæ qualiacunque ſegmenta vel acceſſoria, aut additamenta; ideoque excludimus Cochleas lunares reliquasque operculo quodam teſtaceo munitas, Conchasque anatiferas, quæ Polyconchæ communiter audiunt.

§. 301. ÆQUALES dicimus DICONCHAS, quarum utrumque vaſculum peripheriæ æqualis eſt.

CAPUT I.

CONNIVENTES.

§. 302. Diconchas æquales COINNVERE dicimus, quæ ubique ſibi congruunt; ſine teſtæ inter duas valvas interſtitio.

CLASSIS I.

DICONCHÆ FIGURATÆ.

§. 303. FIGURATAS DICONCHAS nominamus, quarum figura rei alicui animatæ, aut artificiali compoſitæ, aſſimilatur.

GENUS I.

AVICULA.

§. 304. Diconcha hæc clauſa AVICULÆ alis erectis ſimilis: ex corpore enim oblongo & roſtrato proceſſus pterygoides (*a*) erigitur, & alter inſtar caudæ latæ & rotundæ rectus extenditur; ex vertice byſſus erumpit, quo mediante lignis adhærent; limbus in aquis ſurſum ſpectat.

(*a*) Pterygoides, ausſtehende Schulter-Blätter.

§. 305. *Synon.* Muſculus niger clauſus aviculæ ſimilis. Het Gebierkte Vogeltje/ *Belg.* Datteci *Genuenſ.*

§. 306.

§. 306. Species:
1. Rubra; & Nigra; *Muſ. Klein.*
2. Longicauda. *Rumph. p.* 152. *n.* VI. *Tab.* XLVI. *lit.* G. Icon exſtat in Tab. Noſtra VIII. n. 13.
3. Pecten tenuis, aure altera productiore. *Liſt. Tab.* 220. *f.* 55.
4. Sartaniello. *Bonann. Cl.* 2. *n.* 58.

GENUS II.

TUDES POLONICA.

§. 307. Eſt Diconcha figurata plana; figuram literæ T ſed flexuoſe exprimens; ſubſtantiæ nigræ, nitentis, inſtar glutinis ſeu collæ ex pedibus hircorum paratæ.

§. 308. *Synon.* Bia Kris, *Malab.* Meshamer / Poolſche Hamer / Indiaanſche Kris / Kruis-doublet / *Belg.* Oſtreum diviſum. Quum primum innoteſceret hæc Concha, 1000 nummis argenteis, quos Ducatons vocant, emta fuiſſe perhibetur.

§. 309. Species:
1. Sciſſilis glottoides. (*a*) *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* H. Figuram vide in Tab. Noſtra VIII. n. 19.
2. Anguſta; Pecten anguſtus & margine & auribus productiſſimis. *Liſt. Tab.* 219. *f.* 54.

(*a*) *Quid* Glottis, *notum eſt.*

GENUS III.

ISOGNOMON.

§. 310. Eſt Diconcha plana glottoides, cum proceſſu rectangulari Γ Græcorum vel Iſognomonon, einen Winckelhaacken / repræſentans. Venus-Schaagt-doublet / Winkelhaak / *Belg.*

§. 311. Spec. I. Nigricans ex fuſco. *Rumph. p.* 158. *n.* XI. *Tab.* XLVII. *lit.* I. Icon exſtat in Tab. Noſtra VIII. n. 15.

GENUS IV.

PARALLEPIPEDUM.

§. 312. Est DICONCHA longa, ex duabus quasi pyramidibus in PARALLEPIPEDUM ruditer constructa. De gedzaaide Oester; Kromme Noachs-Ark; Haspel; *Belg.*

§. 313. SPEC. I. Cinereum, striatum, rarissimum. *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* K. Figuram ostendit Tab. Nostra VIII. n. 16.

CLASSIS II.

OSTREUM.

§. 314. Negligimus subtilem inter OSTREAM & OSTREUM differentiam, *Bonanni p.* 108. *n.* 7.; dicimusque Synonymice utroque nomine Diconchas conniventes, figuræ simplicis irregularis, in quibus vertex non semper una & constante ratione conformatur.

GENUS I.

OSTREUM LONGUM.

§. 315. LONGAM dicimus hic quamcunque figuram circulo non definiendam.

§. 316. SPECIES:

1. Ostreum radicum seu lignorum. Scolt-Oesters. Tiram Besoar. Tiram Accar. Est palmum longum, margine inæquali, repando, nunc plicato, nunc inciso; extra nigricat, intus perlæ color nitet. Adhæret radicibus, quibus formam accommodat. Græci moderni dicunt Gaideropoda: fors est *Plinii* Tridacna. Continet subinde lapillum, *Rumph. p.* 155. *n.* 1. *Tab.* XLVI. *lit.* O. Figuram vide in Tab. Nostra VIII. n. 17.
2. Ostrea virginiana; *List. Tab.* 200. *f.* 35. Est figuræ longæ irregularis, sine descriptione autoris, ex schemate difficulter explicanda.
3. Ostrea crassa & prælonga cardine longissimo. *Petiv. Coll.* 130. *List. Tab.* 201. *f.* 34.

GE-

GENUS II.

MATER PERLARUM.

§. 317. Eſt DICONCHA placentiformis, circa cardines neglectos ab una parte velut aurita; extus ſcabra; fiſſilis in bracteas, intus margaritica.

§. 318. *Synon.* Perlen-Mutter. Paarlemoer-Schulp *Belg.* Mater unionum. Concha margaritifera. (*a*)

(*a*) *Vid. Lucubrat. de format. ſtructura & cremento Teſtarum huic Methodo ſubjunctas.*

§. 319. SPECIES:

1. Fœcunda ſive margaritifera; teſta valida & ponderoſa, ultra ſpithamam lata, extus ſcabra, intus egregie margaritica. *Bonanni num.* 1. Berberis veterum Indorum; *Liſt. Tab.* 221. *f.* 56. & *Tab.* 222. ad juſtam magnitudinem depicta, cum ligamentorum teſtas conſtringentium veſtigio altero.
2. Sterilis. Tafelbodje / Silbere Piering; Telinga andya. Aſſo teleanus; Hondsoog; fere orbicularis, extus in bracteas flexiles fiſſilis, quæ in ſole rigeſcunt: ſub bracteis ſive ſquamis Teſta lævis, inſtar ſerpentum maculata; internus limbus niger eſt, reliqua concavitas argentea. *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* F. *Liſt. Tab.* 223. *f.* 57. Teſta prona; ſupina *Tab.* 224. *f.* 58.
3. Πολυγλυμος (*a*); vertice lato; teſta circinata; pecten margaritifer; *Liſt. Tab.* 227. *f.* 62. Icon exſtat in Tab. Noſtra VIII. n. 18.

(*a*) *Ginglymus*, eine Thür-Angel.

GENUS III.

OSTREUM LÆVE.

§. 320. LÆVE hoc loco OSTREUM dicimus, in remiſſiore gradu, quatenus teſta plicis, ſtriis, muricibus deſtituitur notabilibus.

§. 321. SPECIES:

1. Placentiforme ſeu Ephippium. Engelſcher oder Polniſcher Sattel.

Zadel-Schulp. Tiram lebbor. Testa tenuis plana, ad formam Ephippii accedens, substantiæ scissilis, extra nigro cinerea, intus margaritico-opalina, præcipue in sinu spondylorum (*a*), ubi & sæpe granula perlarum habitu protuberant. *Rumph. p.* 155. *n.* IV. *Tab.* XLVII. *lit.* B. De Engelsche of Poolsche Zadel/ *Belg.*

2. Ephippium intus cuprea rubedine splendens, extus cinereum, scissile. *Rumph. l. cit.* Has testas Heroës Tamboccenses ad domos suspendunt, ut earundem crepitu admoneantur prætereuntes: dat aldaar een stout Man woont/ die zich niet veel onder den neus laat peuteren; zoo dat deze Schulpen als Bazuinen van de Fama zyn/ ut scribit *Rumphius.*
3. Celebastanum, tenue, minus planum; *Rumph. l. c.*
4. Electrinum. Barnsteen-Zuyster; Bernsteen-Oestertje; parvum; Concha altera cava, instar maculæ; intus lutea, extus perlata, semidiaphana, instar succini, in sole splendens, unde ad ornamentum capitis adhibetur. Pars altera valde tenuis, saxis adhæret in fundo, unde rarissime in conspectum prodit. *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* L. an pecten leviter cavus. *List. Tab.* 228? infra *num.* 10.
5. Ostreum parvum, veluti striatum, testa intus virescente, cardine utrinque canaliculato. *List. de Conch. p.* 181. Rotunda, subviridis leviter striata & umbonata (*b*). *List. Tab.* 202. *f.* 36. testa prona. *Tab.* 203. *f.* 37. testa supina.
6. Rostratum, Jamaicense, parvum; figuræ ovalis in canaliculum rectum verticalem terminantis. *List. Tab.* 199. *f.* 33.
7. Vertice altero mastoide, altero sinuose patente. *List. Tab.* 204. *f.* 38.
8. Ostrea lævis purpurea vel subaurea, instar margaritæ, intus & extus resplendens; *List. Tab.* 205. *f.* 39. Ostrea sylvestris *Rondel.*
9. Ostreum binis apophysibus longis conjunctis pellucidum; seu pecten planus pellucidus. *List. Tab.* 225. 226. *f.* 60. 61.
10. Pecten leviter cavus; lævis, ex rufo striatus, ternis quaternisve articulationibus donatus, vertice acuto, sive rostrato. *List. Tab.* 228. *f.* 63. vid. supra *num.* 4. Figuram vide in Tab. Nostra VIII. n. 19. & 20.

(*a*) *Spondyli*, Beinlein aus den Gelencken.
(*b*) Umbo *proprie centrum scuti eminens.*

GENUS IV.

OSTREUM IMBRICATUM.

§. 322. Ita audiunt, quæ Exochis seu Eminentiis divisis tegularum in tectis dispositionem seu ordinem imitantur. Ostrea echinata

§. 323. SPEC. I. Ostreum in cœnis notum *Bonann. p.* 108. *n.* 70. Ostreum vulgare *List. de Cochl. p.* 176. Ostrea major sulcata inæqualiter, utrinque ad marginem denticulata. *List. Tab.* 193. & 194. Icon exstat in Tab. Nostra VIII. n. 21. Differunt inter se magnitudine, productione & bonitate; præferuntur Anglicanæ cæteris.

GENUS V.

OSTREUM PLICATUM.

§. 324. Vel SINUOSE CANALICULATUM: dicuntur, quæ limbum anguloſe conserunt, & sinuose in plures quasi canaliculos inflectunt.

§. 325. SPECIES:

1. Ostreum Cratium. **Hery Oester**; quia hujus plantæ surculis adhærent coacervata. **Laurier-Blad** *Belg.* Extus grisei, pulli, nunc argentei coloris; figuræ irregularis. *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* A. Iconem ostendit Tab. Nostra VIII. n. 22. Ostrea foliata
2. Saxatile parvum, multis gibbis & sinubus ludens; nunc rotundum, nunc planum, vix nuci sæpe æquale. *Rumph. p.* 155. *n.* III.
3. Plicatum majus; **De diſſchaalige of groote geplooide Oester/ de gekakte Haanekam**; testa crassa, plicis lacmiatis, seu clavatim muricatis; mucosa & sallilaginosa, intus alba, limbo nigro. *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* C.
4. Plicatum sine clavis, cribrosa; extus petrosum; intus Alabastrinum. *Rumph. p.* 156. *n.* V.
5. Ostreum plicatum minus. **De kleine Haanekam of geplooide Oester**; magnis plicis acutangulis, cribrosum, griseum & argenteum; rarissimum. *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* D.
6. Mater perlarum spuria, coloris pulli; testa tenuis; circa limbum per plicas muricata. *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* G.

7. Oſtreum pelagium; teſta plicata, craſſa; baſi lata; inſidens ſaxis. *Rumph. p.* 159. *n.* XVI.
8. Oſtrea arborea, dorſo adunco; Jamaic. Oſtrea annexa baculo *Aldrov. Liſt. Tab.* 197. *f.* 32. & *Tab.* 198. *Sloane It. Jamaic. p.* 261.

GENUS VI.

OSTREUM MURICATUM.

§. 326. OSTREUM exochis altioribus aſperum dicimus MURICATUM.

§. 327. SPECIES:

1. Echinatum. Bia Tsjoeppo; **Lazarus-Klap**: quia per ginglymum fortiter cohærent teſtæ, ut crepitaculorum more compulſa ſonent. Communiter gaudent baſi complanata; ſeu proceſſu quodam coralloide, quo mediante ſaxis adhærent.
   a. Convexo-planum, contha altera cava, inſtar vaſculi, ex quo caldam bibimus, cui planior altera congruit; brevibus muricibus uncis. Hoc ſi rubet, inſtar Corallii, magni eſt pretii. *Rumph. Tab.* XLVII. *n.* 1. **De bloedroode Lazarus Klap** / *Belg.*
   b. Convexo convexum, fuſcum, muricibus longis irregularibus & inæqualibus. *Muſ. Klein.*
   c. Laticlavium; muricibus latis; operculo parvo; quaſi cæmentata. *Rumph. Tab.* XLVII. *lit.* E. Figuram exhibet Tab. Noſtra VIII. n. 23.
   d Cinereum, clavis longis, rubris. **De graauwe Lazarus-Klap met roode vlammen.** *Rumph. Tab.* XLVII. *n.* 2.
   e. Ramoſum. **De Rots-Doublet.** *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLVIII. *n.* 3.
   f. Aurantium; *Muſ. Klein.* **De Orange Lazarus-Klap.**
   g. Citreum. *Muſ. Klein.*
2. Monſtroſum; Echinatum maximum; palmam longum per diametrum, muricibus inæqualibus, nunc ad digiti latitudinem exſertis & teretibus, nunc ſubſidentibus planis. Sonans inſtar Porcellanæ; coloris albidi. *Rumph. p.* 157. *Schynvoet in not. p.* 160.
3. Gaideropoda, ſeu pes aſini, a ſimilitudine; Tarentinorum Scataponzolo; ſaxea; a ſaxis finditur. Teſta valde irregularis,

laris, finuoſa, ſcabra, ſquamata; ſuperior magis concava; ſpiſſis bronchis (*a*) canaliculatis armatur. *Bon. n.* 20. *p.*100.

4. Gaideropoda roſtrata, ſquamata, muricata; vertice velut cornuto propter proceſſum aduncum, coloris eſt candidi, punctis varie rubris. *Bonann. n.* 22.
5. Gaideropoda valvas unitas & apertas oſtendens; intus ſunt ut lapis parius candidæ, foris pars inferior concolor eſt ſaxis; bronchi ſunt rufi coloris. *Bonann. n.* 21.
6. Oſtrea arborea, Proteiformis, albida; admodum cava. *Sloane It. Jam. p.* 262.

(*a*) *Bronchus*, mit aufgeworffenem Maul.

CLASSIS III.

MUSCULUS.

§. 328. Musculos dicimus Diconchas conniventes oblongas, ſimplici ligamento lateris cohærentes.

GENUS I.

MUSCULUS ACUTUS.

§. 329. Musculos in longum ex acuto vertice irregulariter expanſos dicimus Acutos; Spitz-Muſcheln.

§. 330. Species:

1. Vulgaris, *Mal.* Aſſuſeng; circa Cardines gibbus, tandem glottoides.
   a. Major, *Rumphii Tab.* XLVI. *lit.* B.
   b. Minor, *Rumphii Tab.* XLVI. *lit.* C.
   c. } *Norvagicus; Holſaticus;* magnitudine & colore ex fuſco
   d. } cæruleo varian
2. Saxatilis, auriformi parvus, extus granulatus, margine piloſo, ex virore [illegible]ns; ex ſaxis pendulus: anatibus expetitur. *Rumph. T* VI. *lit.* D. De Eende-Maſſel *Belg.*
3. Anglicanus ex c[illegible]ger. *Liſt. de Cochl. p.* 182. Teſta tenuis, pruc[illegible]e; lævis; foris ex cæruleo nigra, intus ex cæru[illegible] adverſa; a cardine ad oram venæ cæruleæ ra[illegible]derit e ſinu magis reducto, adverſus

ſus quem angulus acutus eminet. Ipſe cardo ima ora acuminatior. Biſſus ſubtilis & quaſi ſericeus. Frequens in mari & fluminibus. Hunc iisdem *Liſteri* verbis deſcribit *Bonann. p.* 102. *n.* 30. qui & habuit hujus generis teſtas cinabarinas, ſandychinas (*a*), argenteas, thalaſſicas (*b*) e Littore Drepanitano & Luſitanico.

4. Muſculus purpureus, craſſe ſtriatus, pinnæ ſimilis. *Liſt. Tab.* 356. *f.* 193. Figuram exhibet Tab. Noſtra IX. n. 24.
5. Muſculus tenuis, lævis, ſubpurpureus. *Liſt. Tab.* 356. *f.* 195. & *Tab.* 159. *f.* 198. Bahamenſis fere radiatus. *Petiv. Gaz. Tab.* 71. *n.* XI. Sloanio audit muſculus vulgaris major *Rumph. Tab.* XLVI. *lit.* B. (ſupra) *It. Jam. p.* 263. Icon exſtat in Tab. Noſtra IX. n. 25.
6. Muſculus major, ſubniger, Jamaic. *Liſt. Tab.* 360. *f.* 199.
7. Muſculus *Rondeletii;* ſeu muſculus ſubcæruleus fere virgatus. *Liſt. Tab.* 362. *f.* 200.
8. Muſculus parvus, albidus, tenuis, anguſtior, roſtro recurvo. *Liſt. Tab.* 362. *f.* 200.
9. Muſculus parvus, ſubcæruleus, latus, roſtro tenui adunco. *Liſt. ib. f.* 201.
10. Muſculus major, latiſſimus, ex caſtaneo purpuraſcens. *Liſt. Tab.* 364. *f.* 203.
11. Muſculus curvus, ex nigro virideſcens, anguſtior. *Liſt. Tab.* 363. *f.* 204.

(*a*) *Sandyx:* Mennig (Farbe.)
(*b*) *Thalaſſicus*, Meergrün/ Zeegroen.

GENUS II.

MUSCULUS LATUS.

§. 331. Sive in latum oblique expanſus, reſpectu cardinis.
§. 332. SPECIES:

1. Muſculus latus; teſta admodum tenui; ex fuſco virideſcens, interdum rufeſcens. *Liſt. de Cochl. p.* 146. & *Hiſt. Tab.* 156. *f.* 11. Chamæ glycimeridi ſimilis, ſed majoris mytuli ſpecies, *Aldrov. p.* 472. An Chama glycimeris margaritifera *Velſchii Eph. Germ. An.* III. *obſerv.* 36.?

2. Muſcu-

2. Muſculus fluviatilis, tenuis, minor, ſubfuſcus, latiuſculus, cardine lævi. *Liſt. Tab.* 153. *f.* 8. Figuram vide in Tab. Noſtra IX. n. 26.
3. Muſculus anguſtior, ſubfuſcus, paulo craſſior. *Liſt. Tab.* 154. *f.* 9.
4. Muſculus latior ex flavo ſubviridis, duplici ſtriatura ad uncum. *Liſt. Tab.* 155. *f.* 10. ſimilis *Tab.* 157.
5. Muſculus lacuſtris & fluviatilis Suecicus, fluminis Elſter, & Gedanenſis, margaritiferi; ex flavo ſubviridis; an idem cum præcedenti?

GENUS III.

MUSCULUS MAMMARIUS.

§. 333. Oblique latus; cardinibus maſtoidibus, mammillarum inſtar, prominentibus.

§. 334. Spec. I. Muſculus mammarius, *Liſt. Tab.* 361. Figuram oſtendit Tab. Noſtra IX. n. 27.

CLASSIS IV.

CYCLAS.

§. 335. Cyclades dicimus Diconchas conniventes, planas, rotundas, ex vertice umbonato æqualiter expanſas.

§. 336. Species:

1. Circinata, craſſa, alba; Pectunculus albus, orbicularis, craſſe faſciatus utrinque ad roſtrum integer. *Liſt. Tab.* 296. *f.* 133.
2. Circinata & virgata; ſive Pectunculus planus, craſſus, ex rufo radiatus. *Liſt. Tab.* 299. *f.* 136.
3. Declinans; plana; Jamaicenſis, ex interna parte luteſcens, vertice leviter declinante. *Liſt. Tab.* 298. *f.* 135.
4. Norvagica; tenuis, alba; ſubtiliter circinata, vertice acuto, leviter declinante. *Liſt. Tab.* 297. *f.* 134.
5. Undata; Pectunculus parvus, albus, profundior, tenuiter undatus. *Liſt. Tab.* 301. *f.* 142. *Sloane p.* 261. Icon exſtat in Tab. Noſtra IX. n. 28.

CLASSIS V.

DICONCHA AURITA.

§. 337. AURES Concharum dicuntur planæ illæ appendices verticum, quæ sua commissura, intercedente ligamento, cardinem constituunt; hinc quæ ejusmodi appendicibus gaudent CONCHÆ AURITÆ appellantur.

GENUS I.

PECTEN.

§. 338. Est DICONCHA rotunda; striata; vertice aurito.

§. 339. *Synon.* **Bonte Mantels; St. Jacobs Schulpen.** Qui unicam habent appendicem sive aurem, PECTUNCULI vocari solent.

§. 340. SPEC. I. Convexo-planus.

1. Anglicanus. Pecten maximus; circiter 14. plicis admodum crassis & eminentibus; iisdemque striatis. Scallop, *Listeri de Cochl. p.* 184. Testa intus alba, extus ex albido rufescens; altera modice cava; altera plana, utraque æqualiter aurita in parte strictiore, ex qua paulatim amplificantur & rotundantur. *List. Tab.* 163. *f.* 1.
2. Cappa Sancta; sive S. Giacomo; magnitudine palmaris, striis densis super auriculis & plicis perpendicularibus, strigibus rugosis; intus alba, foris ex albo rufa; maculis cruentatis, vel heluaceis; varia in parte plana, in gibbosa alba, raro nigra. *Bonann. n.* 3. 4.
3. Imbricatus, super plicis subtiliter striatus & rugosus; coloris albi; circa cardines cerasini. *Bonann. n.* 8.

§. 341. SPEC. II. Convexo-convexus seu utrinque convexus.

1. Pecten vulgaris. **De gemeene St. Jacobs Schulp.** Bia sissia. **Kam-Schulp.** Bia Terbang. **Vliegende Schulp**; quia in aqua mediante rubra manu, prout vocatur, subsilit, quod aliter interpretatur *Jonston* notatus *Rumphio p.* 143. Græcis modernis Ctenia, ἀπὸ τοῦ κτένος. Conchæ ambæ æqualiter complanatæ sunt quodammodo, pollicesque 4. habent in diametro; aures vero sunt æquales, striæ canaliculatæ crassiores, exterius rugosæ, subalbidæ, nigris maculis. *Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* A.

2. Pal-

2. Pallium variegatum; de bonte Mantel; Pecten utrinque convexior, minor, inæqualiter auritus, ſtriis canaliculatis, claviculis aſperis.
   a. Ad limbum cinereus; ad cardines albidus; micis nigris, intus albus, in limbo purpureus.
   b. Flammeus ſuper albo, claviculis intenſe rubris.
   c. Albus, nigromaculatus. *Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* B.
3. Pecten tenuis; de Weſtindiſche of Baſtaard bonte Mantel/ aurium altera majori diducta; ſtriis ſubtilibus ſquamatis. Eorum ſunt Caſtanei; Cinerei minores maculis nigris; Albi; Rubri; Citrei, plicis elatioribus, *rariſſimi;* Aurantii; Cinnabarini; Purpurei; vid. *Rumph. p.* 141. *n.* III. & *Tab.* XLIV. *lit.* C.; item *Liſt. Tab.* 168. *f.* 5. Pecten Jamaicenſis ſtriis lævibus *Petiv. mem.* 1708. *p.* 221. *n°.* 1. *Sloane p.* 256. *Tab.* 241. *f.* 12. 13.
4. Pallium minus. Bia Sabander. De kleine of gewolkte bonte Mantel. Sabander Scallop; ſtriis paucioribus ad modum plicarum vaſtis ac turgidis, nigraque, inſtar piſcis Sabander, unda pictis. *Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* O.
5. Pecten Corallinus, ingens; concha altera in plicis latis undoſe rugoſa, altera in plicis ſimilibus verrucoſa. De Koraal-doublet/ *Belg.*
   a. Purpureus, ex albo cinereus. *Rumph. T.* XLVIII. *n.* 7. 8.
   b. Citreus flammis albis. *Id. p.* 160.
6. Pecten tenuis ſubrufus, maculoſus, circiter 20. ſtriis majoribus, ac lævibus donatus. *Liſt. p.* 185. *de Cochl.* Vix binis digitis per diametrum æqualis; ſtriarum interſtitia ipſa ſtriata & rugoſa, prout & auriculæ fere æquales. Color rubeus, nubeculis albis per modum marmoris variegatus.
7. Pecten minimus, anguſtior, inæqualis fere & aſper, ſinu ad cardinem cylindraceo, creberrimis minutiſſimisque ſtriis donatus, *Liſt. de Cochl. p.* 186. Teſta irregularis & ſinuoſa, non ſemper æqualiter craſſa & ſcabra; coloris fuſci, nunc albi nunc ſubcrocei.
8. Aquitanicus, auriculas habens æquales; ſtriis minutis, ſæpe monotes (*a*); multicolor. *Bonann. n.* 5.
9. Depreſſus, auriculis a cæteris differentibus, i. e. per modum val-

(*a*) *i. e. unam auriculam habens.*

valvulæ longius a cardine propendentibus; colore lateus, nunc albus, nunc thalaſſinus, nigricans & ſanguineus. *Bon. n. 6.*

10. Citreum maturum, a colore; denſe ſtriatum ſuper plicis, auricula majore clathrata; altera minima, lævi; figuræ longioris. *Bonann. n. 7.*

11. Fimbriatus, quinque tantum plicis elatus; auriculis inæqualibus; colore albus ſuper terreo, circa oram frequentibus rimulis ſignatus. *Bonann. n. 9.*

12. Faſciatus; æqualiter auritus; verſus umbonem plicatus.

13. Inter plicas læves ſtriatus, faſciatus; æqualiter auritus. *Bonann. n. 11.* Per medium duæ faſciæ. Icon exſtat in Tab. Noſtra IX. n. 29.

14. Maculatus, margine rotundo, auribus inæqualibus, magnis, ſtriatis, dorſo inter ſex plicas valde planas pariter denſe & ſubtiliter ſtriato; maculæ ſuper flavo candidæ & cruentatæ. *Bonann. n. 12.* Up-taſch *Belg.*

15. Πολύζωνος, minutiſſime ſuper plicis ſtriatus, coloris onychini, ductis faſciis concentricis, punctatis, varii coloris. *Bonann. n. 13.*

16. Circulariter per plicas maculatus; ſtrigibus rugoſis; teſta lucida, notulis plicarum flavis & roſeis; auribus æqualibus. *Bonann. n. 14.*

17. Longus, denſiſſime ſtriatus, fere monotes, i. e. unica auricula, nunc uni-nunc multi-color. *Bon. n. 15.* Konings Mantel *Belg.*

18. Roſeus, quinque ſtriis albis, irregularibus. *Bonann. n. 16.*

19. Magnus, ſubrufus, variegatus, 16. plicis planis, ſtriatis, canaliculis lævioribus. *Liſt. Tab. 165. & 166. f. 2. 3.* Pecten mediterraneus major, coſtis alte ſtriatis; *Petiv.* Caſſa veneta, *Italis; Bonann. p. 98. n. 3. 4.*

20. Pecten omnium longe maximus; minus cavus; octo vel decem ſtriis donatus, canaliculis profundis. *Liſt. Tab. 167. f. 4.* Minori alicui orbi ſimilis & æqualis, ſtrias habens aſperas in plicis & ſulcis latis; circa limbum eſt undoſe rugoſus.

21. Pecten ſtriis demiſſis creberrimis inter omnes reliquos, a circumferentia vix in mediam teſtam excurrentibus, quaſi gibboſam. *Liſt. Tab. 168. a.* auriculis replicatis; æqualibus.

22. Rotundus, auribus teretibus, ſeu pecten minor variegatus per ſtrias altas & aſperas; Ind. Orient. *Liſt. Tab. 169. f. 6.*

23. Bipecten; ſive pecten minor, ternis quaternisve plicis minus ex-

extantibus hiulcus; circa marginem quaſi duplicatus. *Liſt. Tab.* 171. *f.* 8. An Spondulus variegatus, ſtriatus margine digitata. *Morton. N. H. N. p.* 200. *n.* 44.? *Sloane It. Jam. p.* 257.

24. Minor ex croceo variegatus, aſper & fere ſinuoſus ac inæqualis, leviter & admodum crebro ſtriatus. *Liſt. Tab.* 172. *f.* 9.
25. Duplicatus auribus inæqualibus, plicis latis ſtriatus; *Liſt. Tab.* 174. *f.* 11.
26. Oblongus, inæqualiter auritus, plicis latis ſtriatis. *Liſt. Tab.* 175. *f.* 12.
27. Albus, muricatus, inæqualiter auritus. *Liſt. Tab.* 178. *f.* 15.
28. Subrufus, inæqualiter auritus, ſtriis 24. rugoſis. *Liſt. Tab.* 180. *f.* 17. nonnunquam circa marginem imbricatus; *Idem de Cochleis p.* 185. *Morton p.* 200. *n.* 2. *Tab.* 4. *f.* 1. *Sloane p.* 256. *Liſt. T.* 181. *f.* 18.
29. Rotundior, auribus inæqualibus, illis & plicis ſimpliciter ſtriatis. *Liſt. Tab.* 182. *f.* 19.
30. Pecten minor, æqualiter auritus, per plicas ſtriatas dentatus. *Liſt. Tab.* 183. *f.* 20.
31. Variegatus, inæqualiter auritus, ſtriis circiter octodecim. *Liſt. Tab.* 179. *f.* 16. vid. *Sloane p.* 256.
32. Alius per plicas dentatus, raris & latioribus ſtrigibus variegatus, inæqualiter auritus. *Liſt. Tab.* 184. *f.* 21.
33. In vertice & medio circinatus, ad latus ſaltem dentatus; ſtriis reliquis lævibus. *Liſt. Tab.* 185. *f.* 22.
34. Ex croceo variegatus, parvus, tenuiter admodum ſtriatus, alternis fere ſtriis paulo minoribus. *Liſt. Tab.* 189. *f.* 23. vid. *Sloane l. c.* Eſt pectunculus, altera aure carens.
35. Pecten major, ruber, plicis decem ſtriatis, bullatis & inæqualibus. *Liſt. Tab.* 186. *f.* 24.
36. Pecten plicis dentatis, ſulcis rugoſis, auribus inæqualibus, pari modo ſtriatis & exaſperatis. *Liſt. Tab.* 187. *f.* 25.
37. Compreſſus, decem plicis villoſe ſtriatis; auribus inæqualibus; altera imbricata, altera ſtriata. *Liſt. T.* 188. *f.* 26.
38. Pectines mediocres, lati & rotundi; auribus inæqualibus dentatis, variegati; circiter 20. plicis tenuibus. *Liſt. Tab.* 190. 191. & 192.
39. Pecten in medio ſtriis circiter quinque majoribus, inæqualiter auritus. Undulatus *Liſt. Tab.* 175. *fig. minima.*

40. Pecten ſtriatus, maculatus & raro undulatus, altera aure perexigua; *Liſt. Tab.* 175. *fig. major.*
41. Pecten, auribus ſtriatis; ſtriis æqualiter decurrentibus. *Liſt. Tab.* 170. *f.* 7.

GENUS II.

AMUSIUM.

§. 342. Eſt DICONCHA utrinque fere plana, exacte rotunda, margine acuto; læviſſima; valva inferiore tota lactea, ſuperiore hepatica; ex cardine utrinque æqualiter aurito inſtar horologii horizontalis, ſubtilibus coſtis interne radians. Intus enim habet utraque concha coſtas rectas canaliculatas, adverſo lumine agnoſcendas. Teſta olim inter pretioſiſſimas numerata.

§. 343. *Synon.* Terbang, ſeu **vliegende Schulp**/ quia celerrimo quaſi volatu ſe in aquis ſubducit piſcatoribus. *Rumph. p.* 144. **De Compas-Schulp of Maan-Doublet** *Belg.*

§. 344. SPEC. I. Indica, ſeu genuina; jam deſcripta; *Rumph. Tab.* XLV. *lit.* A. B. *Bonann. n.* 354. Iconem oſtendit Tab. Noſtra IX. n. 30.

GENUS III.

PSEUD-AMUSIUM.

§. 345. Hoc nomine dicimus DICONCHAS auritas planas, Pectinibus læviores nec carminatas nec ſulcatas, ſed ad ſummum ſubtiliſſimis lineis radiantes. In lithologicis (& circa Gedanum) occurrunt ſingularia talia ſpecimina, ab Amuſio genuino non differentia, niſi quod coſtis canaliculatis careant.

§. 346. SPEC. I. Pecten lævis, variegatus, admodum planus, margine quodammodo irregulari. *Liſt. Tab.* 173. *f.* 10. Figuram vide in Tab. Noſtra IX. n. 31.

GENUS IV.

CTENOIDES.

§. 347. Hoc nomen damus DICONCHIS, quæ a Pectinibus corpore irregulari differunt, auribus & ſtriis conveniunt cum illis.

§. 348.

§. 348. SPECIES:

1. Pecten albus, anguſtus; ſtriis crebris, tenuibus & imbricatis exaſperatis. *Liſt. Tab.* 176. *f.* 13. Icon exſtat in Tab. Noſtra IX. n. 32. & 33. Pecten albus minor ſquamoſus, *Petiv.* 1708. *p.* 221. *n.* 4. *Sloane p.* 256.
2. Rhomboides albus, ſtriatus; ad Chamam pectinatam monotem accedens. *Liſt. Tab.* 177. *f.* 14.

GENUS V.

RADULA.

§. 349. Eſt quaſi PECTEN dimidius, in latere auritus in longiore recto inſtar Chameleæ ſinuatus; ſtriæ ſunt ſquamulis exſertis aſperæ; teſta glaciei inſtar pellucida; unde Belgis dicitur Ys-Doublet/ atque etiam Kaſp-Doublet. Figuram vide in Tab. Noſtra IX. n. 34.

§. 350. SPECIES:

1. *Rumphiana Tab.* XLIV. *lit.* D. jam deſcripta.
2. Canaliculata, *Bonann. n.* 4. candida, in ſtriis ſquamata circa marginem; vertice quaſi triangulari.

GENUS VI.

VOLA.

§. 351. Valva altera valde concava, inſtar VOLÆ, altera plana, plicis ad cardinem complanatis; vertice producto & leviter utrinque aurito.

§. 352. SPEC. I. Indica; foris caſtanea, intus candida. *Bonann. n.* 87. Figuram oſtendit Tab. Noſtra IX. n. 35.

GENUS VII.

TRIQUETRA.

§. 353. Eſt TELLINA ad cardines utrinque labia, auricularum inſtar, producens, ut Conchæ fere triangulares videantur.

§. 354. SPEC. I. Pectunculus ſubviridis, Triquetrus *Liſteri* ex muſeo Oxonienſi, *Tab.* 160. *f.* 16. Icon exſtat in Tab. Noſtra IX. n. 36.

GE-

GENUS VIII.

SPONDYLUS.

§. 355. Ex *Liſteri* autoritate dicimus SPONDYLOS Diconchas craſſas, auribus & figura, ſed irregulari, Pectinibus ſimiles; quidni Oſtreis ſimiles?

§. 356. SPEC. I. Lævis

Aldrovandi, gravis & lævis, cardinibus per Gomphoſin junctis; *Liſt. Tab.* 207. *f.* 41.

SPEC. II. Striatus

1. Cinereus; irregulariter ſtriatus, bullatis diſotis pyxidibus dentatus. *Liſt. Tab.* 208. *f.* 42.
2. Spondylus craſſus, minimus, albus, ſtriis vel faſciis extantibus imbricatus. *Sloane p.* 255. *Tab.* 241. *f.* 10. 11.

SPEC. III. Muricatus

1. Ruber *Liſteri*, muricatus. *Tab.* 206. *f.* 40. *Sloane p.* 255. Figuram exhibet Tab. Noſtra IX. n. 37.
2. Minor, ſubruber, tenuis, imbricatus, apice diſtorto, cavitate interiore auriculam referens. *Sloane ib. T.* 241. *f.* 4. 5. 6. 7.
3. Spondylus major, craſſiſſimus, ſcaber, anguſtus; e cinereo ſubruber, apice diſtorto, cavitate interna auriculam referens. *Sloane ib. f.* 8. 9.

SPEC. IV. Roſtratus.

1. Pectunculus ſubviridis, craſſiſſimus, roſtratus. *Liſt. Tab.* 158. *f.* 13.

GENUS IX.

MYTULO-PECTUNCULUS.

§. 357. MUSCULUS AURITUS, hoc nomine primo a Fabio Columna eſt nominatus, cujus autoritatem ſequimur.

§. 258. SPEC. I. Berberoides rarior *Fab. Col.* Jamaic. *Liſt. Tab.* 224. *f.* 59. vid. Dn. *Hans Sloane* II. *p.* 262. qui erronee *Liſteri* teſtas *Tab.* 223. 224. *f.* 57. & 58. pro Mytulo-pectunculis agnovit, itemque falſo Aviculam *Rumphii* & Concham tenuis teſtæ *Bonanni* ſimul allegavit. Iconem vide in Tab. Noſtra IX. n. 38.

CLAS-

CLASSIS VI.

DICONCHA CORDIFORMIS.

§. 359. Sunt, quæ duplicis valvæ curvatura præcipua, verticibus nutantibus, cordis figuram exprimunt, per concharum lateralem conjunctionem inſpectæ.

GENUS I.

HEMICARDIA.

§. 360. Dicitur DICONCHA plana, minimum inæqualiter convexa, cordiformis, ſutura perpendiculari diviſa.

§. 361. SPECIES:

1. Cardiſſa ſimplex. **Venus Hertje**; Bia hari. Diconcha tenuis ſtriata, ſtriis in cordis figuram concurrentibus. *Rumph. p.* 132. *n.* VI.
   a. Convexo convexa, ſed inæqualiter, margine dentato, coloris albidi. *Bonann. n.* 374.
   b. Fimbriato margine; candidiſſima; *Muſ. noſt.*
   c. Convexo convexa, micis rubris teſtam commendantibus; raro citrea, margine dentato. *Liſt. Tab.* 318. *f.* 155.
   d. Margine ſimplici, rugoſa, coſtis lævibus; Concha relata a *Liſtero* cordis figuram aliquantulum depreſſi referens, coloris gypſei. *Bonann. n.* 49. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* E.
   e. Margine lævi ex Ind. Orient. *Liſt. Tab.* 319. *f.* 156. Figuram vide in Tab. Noſtra X. n. 39. Eadem ex ſitu inverſo aliam faciem præbens. *Liſt. Tab.* 370. *f.* 157.
2. Cardiſſa duplex. **Het dubbelde Venus-Hertje**; in parte planiore ſubtilius & rarius, in convexiore craſſius & aſperius ſtriata. Olim ſi habebat maculas rubras, 60. Aureis vendita; jam communior, attamen cara. *Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* H.
3. Fragum album; **de witte of geele Hardbei-doublet**; pollicem latum, ſtriis aſperis ex ſquamulis. Color flavidus. *Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* G. Eſt Cardiſſæ duplici figura, ſed non ſignatura, ſimilis.

GENUS II.

ISOCARDIA.

§. 362. ISOCARDIÆ nobis dicendæ veniunt Diconchæ gibbosæ, seu utrinque convexæ, quæ cardinibus nutantibus utrinque cordis figuram ad sensum æqualem efformant.

§. 363. SPEC. I. Striata:

1. Pectunculus vulgaris. *Mal.* Bia Cucuran, i. e. Lima; *Lusitanis:* Brigigoins; *Chinens:* Ham. Testa globosa, striis per dorsum lævibus ad limbum dentatis & squamatis, cardine instar pectinum simplici ligamento cohærente; coloris est albi, leviter ex nigro micantis, intus citrei. *Rumph. p.* 142. *n.* V. *Tab.* XLIV. *lit.* E.
2. Concha venerea duplex; de geribde Venus-Doublet; raro integra & utraque valva congruens. Testa eburnea transparens super superficie rugosa plicas concavo convexas in murices acutos protendit. Conjunctio fit per ginglymum totius lateris. *Rumph. Tab.* XLVIII. *n.* 6. *Tab. Col. de Purp. C.* XVII. Concha exotica, margine in mucronem emissa, *List. Tab.* 327. *f.* 164.
3. Fragum a colore & asperitate. Roode en witte Aardbey-Doublet. *Mal.* Cacura mera; striis densis, claviculis asperis per ginglymum articulatum.
   a. Dense striatum, rubro maculatum & claviculis asperum. *Schynvoetii ad Rumph. Tab.* XLVIII. *n.* 9.
   b. Massilianum, per limbum saltem aliquot seriebus longius aculeatum. *Bonann. n.* 96.
   c. Persicum, striis crassis, squamatis, totum asperum, intus rosaceum. *Bonann. n.* 95. Pectunculus crassus striis imbricatis. *List. Tab.* 323. *f.* 160. De Carthageensche Nagel-Doublet.
   d. Sriis latioribus imbricatum. *Schynvoetii ad Rumph. Tab.* XLVIII. *n.* 11.
   e. Adriaticum, subrotundum, striis distantioribus, aculeis, plumularum instar, crispatis, colore osseo, vel puniceo. *Bonann. n.* 97.
   f. Plicis magnis, aculeis rubris, sed raris, per totam exteriorem superficiem. *Bonann. n.* 375.

g. Mi-

g. Minus concavum: Pectunculus maximus. *Liſt. de Cochl. p.* 187. pluribus munitioribus & parum eminentibus ſtriis donatum, roſtro acuto, minusque incurvato. Teſta valida, ponderoſa. Articulatio fit per Gomphoſin. Color albidus.

h. Pectunculus echinatus. *Liſt. p.* 188. *de Cochl.* Concha echinata *Rondel. Gesn. Aldrov.* Utraque teſta æqualis & valde concava, modice craſſa. Foris circiter 20. ſtriæ, planæ, aculeatæ, eminent. Striges rugoſæ ſunt; margines invicem ſinubus congruunt. Color albidus, intus candidus. *Bonann. n.* 90. *Liſt. Tab.* 324. *f.* 161. Icon exſtat in Tab. Noſtra X. n. 40.

i. Albidus rotundus; pectunculus vulgaris; circiter 26. ſtriis majuſculis, planioribus, ad verticem lævibus, verſus marginem rugoſis, fere imbricatis. Edulis eſt, & ex arenoſis legitur littoribus.

k. Coralſina concha ſeu Pictorum *Bonann. n.* 18. quia pars anterior trita purpuram ſubminiſtrat. Intus lævis & nitida; extus tuberculis inæqualiter ſuper ſtriis elatioribus aſpera.

l. Stella; intus per limbum denticulata, foris circinata; in limbo ſtriata; circa cardines conſerti vertices colore albo ſtellam magnam oſtendunt. *Bonann. n.* 62.

m. Concha Gaditana, minutis dentibus in circuitu interiore aſpera. Colorum varietate & eleganti mixtura valde ſpectabilis; phrygiæ enim quaſi zonæ rugoſæ per ſtrias undoſe ducuntur. *Bonann. n.* 63.

4. Nux; piloſa Tarentinorum. Teſta admodum craſſa & firma, dentibus trigonis exaſperata; ad cardinem duplices dentium ſeries ordinatæ; figuræ cæterum globoſæ, tegitur cute holoſerico villoſo ſimili. Meer-Nuſs. Zee-Noot *Belg.*

a. Ex rufo nigricans, ad cardinem rubens, in concavo ex albo nigreſcens, præcipue ad oram, ubi colorem linearem oſtendit. *Bonann. n.* 80.

b. Nux maris Tarentini, ſtriis ſpiſſis & rotundatis, colore albo, fulvis & rufis maculis notato. *Bonanni n.* 98.

c. Nuces maris Africani; intus candidæ, foris flavidæ; ſtrias habent zonis diverſimode flaveſcentibus & caſtaneis faſciatas. *Bonann. n.* 100.

d. Pectunculus polyleptoginglymus, rotundus, maculatus, ſtriis rarioribus. *Liſt. Tab.* 239. *f.* 73.

e. Subrufus, paululum ſinuoſus, denſe & leviter ſtriatus. *Liſt. Tab.* 245. *f.* 76. *Sloane It. Jam. p.* 259.

f. Vertice acutiore, rugoſe ſtriatus. *Liſt. Tab.* 243. *f.* 74.

g. Pectunculus ruber bifariam ſtriatus. *Liſt. Tab.* 314. *f.* 150. videntur faſciæ concentricæ detritæ, ſub quibus ſtriæ longitudinales latuerunt.

h. Pectunculus tenuis, ſtriis acutis rarioribus, muricatis; *Liſt. Tab.* 325. *f.* 162.

i. Subluteus, priori major, circa limbum alterius ſolum lateris imbricatus. *Liſt. Tab.* 326. *f.* 163.

k. Pectunculus orbicularis, quaſi duplicatus, ex altero latere prælongis latisque dentibus conſpicuus. *Liſt. Tab.* 330. *f.* 167.

§. 364. Spec. II. Lævis:

1. Bucardia

a. Conſuta. De dubbelde Lots-kap Schulp. Teſta cordiformis, per ſuturam notabilem juncta, mucronata, verticibus aduncis & velut intortis apicem ex media ſutura intercipientibus. *Rumph. Tab.* XLVIII. *n.* 10.

b. Dalmatica, quia in profundiſſimis Adriatici maris partibus ſtabulatur. Teſta tenuis, friabilis, intus eburnea, in convexo cute tecta, cujus color ſubrufus; ad cardines & ad marginem diluitur in rubiginoſum. Concha globoſa magna, verticibus aduncis. *Bonann. n.* 88. *Liſt. Tab.* 275. *f.* 111. Oſſen-hert *Belg.*

c. Muſculus exiguus, piſi magnitudine, rotundus, ſubflavus, ipſis valvarum oris albidis. *Liſt. de Cochl. p.* 150. Teſta lævis, tenuis, pellucida, quaſi cornea, figuræ ſubrotundæ; junctura gomphoſis.

d. Concha, quaſi perfecte rotundata, in omnibus partibus lævis & nitida, niſi in extrema margine minutiſſimis dentibus aſpera, coloris pulli; ubi teſtæ junguntur, color fulvus, nigro paulatim dilutus. Aſſem mole æquat. *Bonann. n.* 33. Pauel-hoontje *Belg.*

e. Conchula rotunda, in convexo eburnea, in concavo margaritica, circa marginem denticulis criſpa, frequens in littore Adriatico. *Bonann. n.* 34.

f. Concha marmorata, fulvis ſerpentibus, craſſa, candida, intus denticulata. *Bonanni n.* 60.

2. Ca-

2. Camadia
   a. De Luna Tarentinorum, quia in plenilunio impinguatur: testa crassa, alba, furvis zonis cincta; in margine interiore dentata. *Bonann. n.* 99.
   b. Corculum pellucidum; extra aureo diluto maculatum, intermixtis maculis fulvis ad sanguinem inclinantibus. *Bonanni n.* 397.
   c. Punctata rufis maculis, exigua. *List. Tab.* 239. *f.* 81. Figuram ostendit Tab. Nostra X. n. 41.

§. 365. SPEC. III. Rugosa:
1. Concha globosa, profundis & densis sulcis circa verticem, paulo declinantem, parallelis. Coloris lutei; ex mari medit. *Bonann. n.* 76. Nabel-Schelp *Belg.*
2. Circinata; sive pectunculus subviridis, parvus, subglobosus *List. Tab.* 159. *f.* 14.
3. Perpusilla rostrata, virginiana; *List. Tab.* 159. *f.* 15.
4. Crassiuscula, albida, circinata, in rectum expansa, *List. Tab.* 253. *f.* 87. Icon exstat in Tab. Nostra X. n. 42.
5. Lata, plana, tenuis, albida, acuti verticis. *List. Tab.* 253. *f.* 88.
6. Admodum profunde circinata; extra albida, intus subaurea. *List. Tab.* 260. *f.* 96. Jamaic.

GENUS III.

ANOMALOCARDIA.

§. 366. ANOMALOCARDIAS vocamus Diconchas conniventes, quæ per commissuras inspectæ cor irregulare huc illuc productum exhibent.

§. 367. SPEC. I. Effusæ
1. Pecten virgineus, a menstruo, quod, Virginum instar, stillat. Bia Anadara. Vastaart Mrk *Belg.* Testa crassa, dentata, latere altero effuso; sine ginglymo; mediante membrana juncta; striis planis & latis, sulcis angustis, coloris pallide albi; salsilagine obducta. *Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* I. an, *List. Tab.* 236. *f.* 70.? vid. infra *num.* 5. *lit.* C.
2. Pecten granosus; testa tenuis, plicis elatis, circulariter sulcatis. *Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* K.

3. Pectunculus diconcha connivens, convexa, umbone adunco.
   a. In alterum latus acute effusa, per longum & transversum striata; coloris fusco cinerei; *Mus. Klein.*
   b. Planior, in altero margine 4. vel 6. squamis aspera. *Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* M.
4. Pecten bullatus. Bia sileos. Testa tenuis; ex fusco flava; paucis micis parum striata, membrana cincta; intus rubra, valde concava. *Rumph. Tab.* XLIX. *lit.* N.
5. Concha πολυλεπιδογγλυμος.
   a. *Fabii Col. de Purp. C.* XI. inter Cardines longo latere confertis denticulis velut consuta; cervice dependente; dense striata; quasi imbricata; in limbo interno dentes congrui. *Bonann. n.* 73.
   b. Alia, striis externis, raris; acute eminentibus & asperis, interne capillaceis. *List. Tab.* 234. *f.* 68. Figuram vide in Tab. Nostra X. n. 43. & 44.
   c. Alia fere semicircularis, alba, crassa, profunde sulcata, edulis, margine irregulariter undoso. *List. Tbb.* 236. *f.* 70. Pectunculus major polyginglymus, hirsutus; *Sloane p.* 257. *Tab.* 241. *f.* 14. 15. An pecten virgineus *Rumphii?* supra *n°.* I.
   d. Alia, exigua, alba, admodum tenuiter striata. *List. Tab.* 235. *f.* 69. Pectunculus minor polyginglymus, albus, lævis, vertice ad latus distorto, intus argenteus, splendens; *Sloane p.* 258. An, Pectunculus exiguus, albus, tenuiter striatus, gibbosior. Ejusdem *p.* 259.?
   e. Orientalis; rostro, sive vertice tenuiore, striis admodum dentatis. *List. Tab.* 244. *f.* 75.
   f. Muricatus super plicis latis & striatis. *List. Tab.* 241. *f.* 78. Iconem ostendit Tab. Nostra X. n. 45. & 46.
   g. Pectunculus striis planis & dentatis. *List. Tab.* 242. *f.* 79.
6. Concha striis serratis densis, strigibus lævibus; vertice obtuso, inæqualiter, per gibbum diffuso; margine fere circulari. *Bonann. n.* 72.
7. Pyrum, dicitur a figura; in margine enim rotunda, ad verticem incurve producta est. Striæ sunt densæ, subtiles, aliquoties per dorsum sectæ lineis fulvis, undosis. Color albus, circa centrum citreus & subviridis. Indicum. *Bonann. n.* 89.

8. Ar-

8. Archipelagus, ſeu concha indica prodigioſa viſu. Nam ſinuoſis rugis criſpas maris undas exprimit. *Bonann. n.* 91.
9. Pyrum pictum. Concha pyriformis, ſed in altero ſinu labia nonnihil expandens; ſulcis denſis, ſtriis diverſo colore velut acu pictis. *Bonann. n.* 92.
10. Concha intricata; maris Atlantici; ſulcis duplicatis & quaſi tricis capillorum contextis; coloris ſubflavi, in ſtriis rufeſcentis. Zonis inſuper pulcherrimis fulvis, heluacibus & rubeſcentibus, in limbo evanidis; figura oblique rotunda. *Bonann. n.* 93.
11. Labiata, quia in altero latere, rotundo oppoſito, ex vertice obtuſo labium, inſtar valvulæ producit; concha ſtriata, umbone roſtrato, colore venoſo, terreis maculis diſtincto. *Bonann. n.* 94.
12. Concha adunca a vertice, altero latere parum producta, plicis planis & transverſim crenatis. *Bonann. n.* 395.
13. Pectunculus polyleptoginglymus, denſe ſtriatus, margine fere inæquali & ſinuoſo. *Liſt. Tab.* 229. *f.* 64. *Sloane p.* 258. *Tab.* 241. *f.* 17.
14. Pectunculus e fuſco rufeſcens admodum denſe ſtriatus. *Liſt. Tab.* 231. *f.* 65. *Tab.* 232. *f.* 66. *Sloane ib. p.* 258.
15. Pectunculus ovalis, denſe, profunde & dentatim ſtriatus, in margine interiore dentes ſunt largiores circa cardines polyginglymos. *Liſt. Tab.* 237. *f.* 71. *Sloane ibid.*
16. Pectunculus gravis, raro vel minus profunde ſulcatus, ex fuſco virideſcens, articulationibus laminatis. *Liſt.* 238. *f.* 72.
17. Pectunculus maximus ſubfuſcus, leviter ſulcatus, margine interiore dentato. *Liſt. Tab.* 240. *f.* 77.
18. Rhomboides, ſtriis imbricatis; *Liſt. Tab.* 315. *f.* 151. *Sloane p.* 259.
19. Citrinus, priori ſimilis, denſius imbricatus, roſtro lævi. *Liſt. Tab.* 315. *f.* 152.
20. Fragum abſciſſum, ſeu pectunculus ſubruſus, ſtriis craſſis. *Liſt. Tab.* 316. *f.* 153.
21. Pectunculus exiguus, anguloſus ſubfuſcus. *Liſt. Tab.* 317. *f.* 154. *Sloane p.* 259.
22. Pectunculus magnus, mediis ſtriis planis & muricatis; iisdemque ad latera utrinque bullatis. *Liſt. Tab.* 321. *f.* 158.
23. Tenuis, oblongus, modo ruber, modo citrinus; ſtriis nunc ex

ex toto nunc ex parte muricatis. *Liſt. Tab.* 322. *f.* 159. vid. *Sloane p.* 259. An pectunculus vulgaris *Rumphii?*

24. Pectunculus orbicularis, fuſcus, ſtriis mediis (*plicis latis latitudinaliter in medio*) muricatis (*acute dentatis*) *Liſt. Tab.* 324. *f.* 161. quem cum conchinata *Rondeletii* contulimus ſupra.
25. Pectunculus magnus orbicularis, maculatus, intus leviter ruſeſcens. *Liſt. Tab.* 328. *f.* 165.
26. Alius major, craſſis ſtriis, & veluti faſciatus ex rufo. *Liſt. Tab.* 329. *f.* 166.
27. Alius anguſtior, oblongus, rufeſcens, ſtriis imbricatis. *Liſt. Tab.* 331. *f.* 168.
28. Oblongus, ſubfuſcus, ſtriis leviter tantum inciſis. *Liſt. Tab.* 332 *f.* 169.
29. Capite minore, rotundiore & fere æquali margine, ſtriis rugoſis. *Liſt. Tab.* 334. *f.* 171.
30. Ex altera parte fuſcus & productior, capite ſeu roſtro majuſculo, ſtriis rugoſis. *Liſt. Tab.* 333. *f.* 170.
31. Tenuis, pellucidus, leviter purpuraſcens, denſe ſtriatus, in latum obliqua expanſus, vertice obtuſo. *Liſt. Tab.* 342. *f.* 179.
32. Pectunculus fuſcus, ſtriis paululum flexuoſis eminentibus & aſperis; oblongus, vertice acuto. *Liſt. Tab.* 343. *f.* 180.
33. Exiguus ſubrufus, leviter cancellatus. *Liſt. Tab.* 344. *f.* 181.
34. Pectunculus oblique in latum expanſus, anguſtior, maculatus *Liſt. Tab.* 347. *f.* 184. alius *ib. f.* 184. latior magis.
35. Subfuſcus ex latere productus & pedi humano inferiori ſimilis. *Liſt. Tab.* 347. *f.* 185.

§. 368. SPEC. II. Sinuoſa, circa cardines utrinque ad planitiem inſinuata.

1. Braſiliana, fere rotunda, lineis corrugata, utrinque in ſinu complanata, quorum anguſtior cordis figuram imitatur, diverſimode pingitur a violaceo colore; reliquæ partes fulvæ, circa antrum albeſcunt. *Bonann. n.* 345.
2. Tiburtina; ejusmodi lapidi ſimilis. *Bonann. n.* 380.
3. Circinata, ſeu pectunculus ſubviridis, craſſiſſimus roſtratus; *Liſt. Tab.* 158. *f.* 13.
4. Tellina magna, intus purpurea; extra ſtriis transverſalibus profundis & lamellatis circinata. *Liſt. Tab.* 377. *f.* 220.

SECTIONIS II.

CAPUT II.

DICONCHA INTERRUPTA.

§. 369. INTERRUPTAS dicimus DICONCHAS, quæ toto limbo ita non connivent, quin alicubi post plausum aliquam relinquant aperturam.

CLASSIS I.

DICONCHA SULCATA.

§. 370. SULCATAS dicimus DICONCHAS, quæ sua, per Ginglymum sive Enarthrosin (*a*), conjunctione inter cardines sulcum notabilem, non sinum, formant.

(*a*) Die Eingliederung.

§. 371. SPECIES:

1. Margaritica. Musculus fluviatilis angustior, ex flavo virideſcens; validus, umbonibus acutis, valvarum cardinibus, velut pinnis, donatus. *List. de Cochl. p.* 149. Valvæ crassæ sub cortice scabro margariticeæ, qualis & interior testa, nisi sit ex argenteo cærulea. In senio, velut homo, ex calculis margarititicis laborare dicitur communiter, quod non est hujus loci; conf. *List. Tab.* 147. *f.* 2.
2. Fragilis; concha longa lataque in mediis cardinibus, cavitate quadam pyriformi insignita. An chama glycimeris *Rondeletii?* Testa valde fragilis; quatuor digitos longa, duos lata; plana, lævis; intus alba, extra flaveſcens, subfusca membrana. *List. de Cochl. p.* 170. Musculus latus, maximus, & tenuissimus, e cæruleo virideſcens; ferus, palustris; *List. Hist. Tab.* 156. *f.* 11.
3. Rhomboides, in medio cardine utrinque circiter tribus exiguis denticulis donata. *List. de Cochl. p.* 171. Testa modice crassa, firma, extra rugosa, alicubi quasi subtilissime striata; umbo exiguus acutusque conjungitur per ginglymum. Color albus, intus ex parte violaceus.

4. Plana fere & perfecte circinata, ampliſſima, alba intus, foris caſtanea, ligamento ſingulari juncta. *Bonann. n.* 19.
5. Craſſiſſima; muſculus niger, omnium craſſiſſimus; conchæ longæ ſpecies *Gesn. Aldrov. Liſt. Tab.* 149. *f.* 4. Icon exſtat in Tab. Noſtra X. n. 47.
6. Anguſta. Muſculus anguſtus, ſubflavus ſeu citrinus. *Liſt. Tab.* 147. *f.* 3.

CLASSIS II.

DICONCHA UMBILICATA.

§. 372. DICONCHÆ UMBILICATÆ ſunt, quæ circa Cardines a latere habent foveolam inſtar umbilici magis minusve profundam (reliquo corpore Chamas æmulantes).

GENUS I.

CIRCOMPHALOS.

§. 373. CIRCOMPHALOS a Κίρκος, circus, & ὀμφαλός, umbilicus. Eſt DICONCHA UMBILICATA CIRCINATA.

§. 374. SPECIES:

1. Nux maris *Jonii*, cortice rugoſo, coloris terrei. *Bon. n.* 39. Gerihi Poffertje *Belg.*
2. Luſitanica; albo cortice tecta; quam ſubminius, citreus, purpureus & palearis color diſtinguunt. *Bonann. n.* 75. Valvæ circulariter & concentrice rugoſæ ſunt, vertex acutus & oblique incurvus.
3. Pectunculus maculoſus, faſciis rarioribus, exaſperatis. *Liſt. Tab.* 277. *f.* 114. An pectunculus, lunatus, americanus, faſciis alte ſtriatis. *Petiv. Gaz. Tab.* 25. *f.* 52.? Figuram exhibet Tab. Noſtra X. n. 48. & 49.
4. Orbicularis plana, rugoſa. *Liſt. Tab.* 281. *f.* 119. *Sloan. p.* 261.
5. Mauritanica, rotunda, alba. *Liſt. Tab.* 261. *f.* 97.
6. Alba creberrimis faſciis, acutis, exaſperata. *Liſt. Tab.* 289. *f.* 125.
7. Roſtrata, irregulariter expanſa; pectunculus variegatus, roſtratus, rugoſus. *Liſt. Tab.* 280. *f.* 117.

8. Pectun-

8. Pectunculus craſſiſſimus, faſciis ex latere bullatis. *Liſt. Tab.* 284. *f.* 122. maris medit. *Tab.* 285. *eod. num.* 122.
9. Tellina parva, ex rufo maculata, paululum cava; ſtriis faſciatis valde aſpera. *Liſt. Tab.* 396. *f.* 243. Icon exſtat in Tab. Noſtra X. n. 50.
10. Pectunculus variegatus Jamaic. *Liſt. Tab.* 286. *f.* 123.
11. Crebris faſciis, Jamaic. *Liſt. Tab.* 278. *f.* 115. *Sloan. p.* 260.
12. Toroides, ſive pectunculus variegatus, gravis faſciis latis ac pulvinatis. *Liſt. Tab.* 279. *f.* 116.
13. Ex rubro undata ſuper circulis denſis. *Liſt. Tab.* 291. *f.* 127.
14. Latiſſima albida, denſe circinata, admodum plana. *Liſt. Tab.* 288. *f.* 124.
15. An eadem minor? *Liſt. Tab.* 289. *f.* 125.
16. Roſtrata, faſciis capillaceis. *Liſt. Tab.* 290. *f.* 126.
17. Craſſa, denſe circinata, leviter ex rufo variegata. *Liſt. Tab.* 292. *f.* 128.
18. Subfuſca, ſubtiliſſime circinata. *Liſt. Tab.* 293. *f.* 129.
19. Acuta, in vertice denſe circinata. *Liſt. Tab.* 294. *f.* 130.
20. Lunata, minuta ex Anglia. *Liſt. Tab.* 295. *f.* 132.
21. Lunata ad verticem, major. *Liſt. Tab.* 295. *f.* 131.
22. Virgata, ſeu Tellina faſciata compactius ſubaurea. *Liſt. Tab.* 404. *f.* 249.
23. Literata. Tellina faſciata anguſtior, intus luteſcens. *Liſt. Tab.* 404. *f.* 248.
24. Muſculus tenuis, ſubruber, ex interna parte roſtro recurvo. *Liſt. Tab.* 157. *f.* 12.
25. Muſculus brevior, admodum craſſus, ex parte interna ſubroſeus, cardine inciſuris minutis exaſperato. *Liſt. T.* 150. *f.* 5.
26. Fuſcus anguſtior. *Liſt. Tab.* 151. *f.* 6.
27. Danubialis, ex flavo virideſcens, cardine dentato, medio dorſo leviter circinatus. *Liſt. Tab.* 146. *f.* 1.

GENUS II.

ACTINOBOLUS.

§. 375. ACTINOBOLOS, ſeu radios emittens dicitur DICONCHA UMBILICATA STRIATA.

§. 376. SPECIES:

1. Æquilatera, *Rumphio p.* 139. *Tab.* XLIII. *lit.* D. Chama

pectinata, plana, crassa, striis planis, incurvis, aliquoties circulariter sulcatis. Intus est luteola, ad marginem rubra, striis detritis fit ex albo leucophæa, lævissima. De Ham-Doublet *Belg.*

2. Scabionata rotunda, plana, alba; striis planis densis transversim circinatis, umbone exserto. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* E. De geschobde Doublet *Belg.*
3. Granosa, fere perfecte rotunda, umbonata, plana, striis granulatis seu asperis quasi imbricata. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* H. De gekorrelde Doublet *Belg.*
4. Striata, concentricis circulis aliquot strias transeuntibus; parum excavata, & quasi perfecte circino rotundata; tota albida; ab altero verticis latere per lineam rectam ad aliquod spatium transcurrit. *Bonanni n.* 69.
5. Pectunculus parvus, albidus. *List. Tab.* 311. *f.* 147.
6. Bengalensis, maculatus; majoribus striis; *List. Tab.* 345. *f.* 182. Plicæ sunt latæ, rugosæ, planæ; sulci striati; vertex acutus & lunatus.
7. Rostratus; striis asperis & majoribus. *List. Tab.* 346. *f.* 183. Figuram ostendit Tab. Nostra X. n. 51.

GENUS III.

OMPHALO-CLATHRUM.

§. 377. Dicitur DICONCHA UMBILICATA, CLATHRATA.

§. 378. SPECIES:

1. Bengalensis, cancellatus, cardine croceo. *List. Tab.* 336. a. *f.* 172. Icon exstat in Tab. Nostra X. n. 52.
2. Ex fusco variegata & cancellata minor. *List. T.* 336. b. *f.* 173.

CLASSIS III.

DICONCHA SINU PROFUNDO.

CHAMÆ.

§. 379. DICONCHAS SINUATAS dicimus, quæ labiis lateris longioris figurant sinum venereum, magis minusve patentem. Græco nomine vocantur CHAMÆ (*a*).

(*a*) Cha-

(a) Chamæ *sunt* Diconchæ sinuosæ; *vertice adunco; dorso utrinque alto; limbo acuto, simplici; lateribus labiatis; quorum alterum sinum venereum deorsum, alterum, sive latus posticum, umbilicum retrorsum, nonnunquam utrinquè venereas figuras ex vertice describunt.*

Pseudo venereæ, *quæ utrinque ad latera compressa, schemata describunt venerea; ita tamen, ut labia æqualiter concurrant, cum limbo acuto ad verticem usque, nullumque vestigium nympharum relinquant. Breviter:* Sinus venerei umbratiles.

GENUS I.

CHAMÆTRACHÆA.

§. 380. Chamæ χάζω vel χάω hic dicitur Diconcha sinuata crassa, in maris fundo hians, vel ut loquitur *Plinius*, ad plausum aperta; unde Batavis *Gapers* audiunt.

§. 381. Chamætrachæa autem a τραχὺς, asper, cognominata est Chama exochis variis aspera.

§. 382. Spec. I. Plicata. *Mal.* Bia garu. *Amboin.* Maêka. *Ternat.* Kima *Aliis* Morabo, Maniwo, Alibo. *Belg.* Nagel-Schulpen / Nagel-Doubletten. Klip-Houssen vocantur etiam a quibusdam, sed male, teste *Rumphio*, quem vide *p.* 126.

1. Decumana seu Pelagia; Testa semilunaris, salsilagine obducta, ad 5. pedes longa, dimidium pedem crassa; ex lamellis conflata, gravans octo bajulos; plicis squamatis; squamis crassis obtusis; margo, cultri instar, acutus, ut navium funes secet. *Rumph. p.* 127. *Tab.* XLII. *lit.* A. Fiunt inde clypeoli Lunæ, cum testis nativis non confundendi; *Rumph. p.* 129. & 130.
2. Littoralis, mas; testa semilunaris, longior, super plicis 9. vel 10. squamas breves & densas ordinans; sinu patentiore. *Rumph. p.* 127.
3. Littoralis, femina; communissima, cujus testa inter quinque plicas conicas, fluctuum instar, ex centro productas habet striges concavo conicas, sibi invicem in limbo insinuatas, excepto latere altero, ubi sinus longiusculus, instar rimæ, hiat; squamæ plicarum sunt unguiformes; color est ignave albus, intus eburneus; *Rumph. p.* 127.

4. Rotunda, tenuior, ſquamis brevioribus, coloris nunc lutei pallentis nunc rubri flaveſcentis. In hac *Chamites* occurrit, ſive lapillus ignave perlatus, quaſi alabaſtrinus, inſtar Achatæ; *Rumph. p.* 128. Nonnunquam & alius *Chamites* apparet, qui digitalis audit, ſeu longior, in baſi convexa ruber, reliquo corpore albus. *Rumph. p.* 129. Pectunculus admodum tenuiter imbricatus. *Liſt. Tab.* 353. *f.* 190. Cui congener pectunculus ingens, raris imbricibus exaſperatus. *Liſt. Tab.* 351. *f.* 189. adde *Tabulam* 352. Concha imbricata, *Bonann. n.* 83.

5. Abſciſſa, eſt Diconcha, plicis ſquamoſis undata, altero latere plana, coloris ſubcinerei; generans *Chamitem* lenticularem, flaveſcentem; *Rumph. p.* 130. *Bonann. n.* 84. Concha marina marmorea imbricata. *Fab. Col. Liſt. Tab.* 354. *f.* 191. Figuram vide in Tab. Noſtra X. n. 53.

6. Obtuſa, palmam longa, rotunda, craſſa, convexa, plicis ſquamoſis; ſquamis brevibus; coloris cinerei, ſinu patentiore; margine luteo. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* B.

7. Lingua Tigyrina, fera, ſquamoſa fuliginoſa. *Rumph. p.* 140. *n.* XII.

8. Ovalis, alba; inter profundos ſulcos plicas ſquamatas extendens, cortice lævi & fragili; ideoque raro integra; *Bonann. n.* 351.

9. Spondylus variegatus, ſtriatus; margine digitato. *Liſt. Tab.* 210. *f.* 44. Oſtrea minor ſulcata, oblonga, gibboſa, ambitu ſerrato. *Sloane It. Jam. p.* 262. *Tab.* 241. *f.* 20, 21. Spondylus barbadenſis, parvus, alte ſulcatus; *Petiv. Gaz. Tab.* 24. *n.* 12. Speckled Barbadoes, Ragoyſter *Ejusd. Cat. p.* 93. *n.* 571.

10. Pectunculus ſtriatus & muricatus parvus. *Liſt. T.* 355. *f.* 192.

§. 383. Spec. II. Striata:

1. Pes equinus. Bia Coromrong. Paarde-Voetje / perſpective Doublet *Belg.* Teſta craſſo, plano, clauſo ſinu; ſtriis ad cordis figuram compoſitis; ſi ſinui inſiſtit Teſta, ungulam equinam plicatam, plicis ſtriatis & apicibus acutis aſperam præſentat; in margine pellucet; conjunctio fit per ſuturam latam. Color ſuper albo puniceus. Chamites incluſus nonnunquam eſt avellanæ æqualis. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* C. *Bonann. n.* 81, 82. *Liſt. Tab.* 350. *f.* 188.

2. Scherfje.

2. Scherfje. Testa parva, rotunda, complanata, crassa, per striας granulata.
   a. Languide alba, maculis in margine nigricantibus. *Mus. Klein.*
   b. Alba, similis grumo oryzæ coctæ. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* D.
   c. Pectinata; wilde Scherfje: exigua, rotunda, crasse striata, languide alba, maculis nigris. *Rumph. p.* 132. *n.* V.
3. Cristata in singulis sulcis, coloris plumbei. *Bonann. n.* 336.
4. Pectunculus major variegatus profundo sinu. *List. Tab.* 349. *f.* 187.

GENUS II.

CHAMELÆA.

§. 384. Vox idem, quod CHAMA lævis sonat, labiis lateralibus in plano velut vulvam cum nymphis exprimens. *Batavis* Gapers.

§. 385. SPEC. I. Circinata, sive concentrice sulcata.
1. Optica, picturis fuscis confusis. vid. *List. Tab.* 254. *f.* 89. *Tab.* 255. *f.* 90. *Tab.* 256. *f.* 91. *Tab.* 257. *f.* 92, 93. *Tab.* 258. *f.* 94. *Tab.* 287. *f.* 123.
2. Chama literata, rotunda, umbone cardinum protenso; æqualiter expansa; plana; tennis, super circinis nigris undis inscripta. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* C. De ronde Letter-Schulp of Bastaart Strik-Doublet *Belg.* lituris quibusdam rufis eleganter exaratis; minor Pectunculus undatim pictus. *List. Tab.* 246. *f.* 80.
3. Favus; Wafel-pier / Lip-Doublet *Belg.*
   a. Crassa, alba, quadraticis cellulis per circulos exasperata, in latere brevi sinum profundum formans. Figuræ est convexæ, quodammodo parabolicæ. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* F.
   b. Alia, seu pectunculus admodum crassus; an lapideus margine dense crenato. *List. Tab.* 341. *f.* 178.?
4. Lingua Tygerina, Gapers-Tonge / globosior; sinu altero rotundo, circinis obliquis, asperis; coloris rufi, ad marginem nigricans. *Rumph. p.* 140. *n.* XI. *Tab.* XLIII. *lit.* G.
5. Remies. *Mal.* Remis; diconcha plana, leviter umbonata, costulis planis circinata.
   a. Testa crassa, tres pollices fere rotunda. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* I.
   b. Minor

b. Minor ungui æqualis. *Id. p.* 140.
c. Minima ex griſeo picta, ſuper circinis.
d. Craſſa, ſtriata, lutoſa, maculis paucis, nigris.

6. Bia matta doa; **Schulp met twee oogen**; fere elliptica, plana, micis ſubviridibus, vel fuliginoſis, ſive nigricantibus confuſis albo mixtis, circa cardines per duas aperturas, velut oculus. Aquam projiciunt in apprehenſuros. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* A.
7. Teſtulæ, circulis granulatis, albæ & hepaticæ. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* O.
8. Toeda Baya; teſta elliptice acuta, circinatis ſtriis.
a. Craſſa, fuliginoſa, radiis albis interlabentibus, palmam lata. *Muſ. Klein.*
b. Minor, obſcurior, virgis albis. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* K.
9. Luſitanica, fere rotunda, in ambitu ſerrata, coloris lactei *Bonann. n.* 45.
10. Trigona; foris alba cum quodam rubore, intus tota alba. *Bonann. n.* 50.
11. Concha rugata *Rondelet.* coloris terrei; rugæ ſunt concentricæ, vertex elatus; *Bonann. n.* 54.
12. Muſculus fluviatilis e fluvio Tameſi ad Batterſey. *Liſt. Tab.* 148. *f.* 2.
13. Chama glycimeris *Bellon.*, ingens, variegata ex rufo. *Liſt. Tab.* 247. *f.* 82.
14. Triquetra, ex flavo radiata. *Liſt. Tab.* 251. *f.* 85.
15. Pectunculus tenuis, leviter purpuraſcens, radiatus. *Liſt. Tab.* 264. *f.* 100.
16. Fuſcus, denſe faſciatus, eleganti quadam pictura undulata. *Liſt. Tab.* 282. *f.* 120. Icon exſtat in Tab. Noſtra X. n. 54.
17. Albus, admodum craſſus. *Liſt. Tab.* 305. *f.* 138. *Sloane p.* 261. ſimilis Quadranti *Rumphii*, muricibus carens.
18. Alius ſimilis Rhomboides, rarioribus faſciis aſper. *Liſt. Tab.* 308. *f.* 141.
19. Cuneiformis, ſubfuſca anguſtior, intus purpuraſcens, ambitu ſerrato. *Liſt. Tab.* 376. *f.* 217.
20. Tellina lata rugoſa. *Liſt. Tab.* 390. *f.* 229.
21. Albida, ex rubro radiata, anglica. *Liſt. Tab.* 385. *f.* 232.
22. Triangularis, albida, tenuis, faſciata. *Liſt. Tab.* 401. *f.* 244.
23. Triangularis, admodum craſſa. *Liſt. Tab.* 401. *f.* 245.

§. 386.

§. 386. Spec. II. Striata ſeu pectinata:

1. Optica, caſtanea, albis picturis paucis. *Rumph. pag.* 139. *n.* IV.
2. Clathrata; coloris plumbei ut plurimum, ex fulvo maculata. *Bonann. n.* 348.
3. Punto Francoiſe. Maculas habet undatim; fine certa inflexione, coloris aurei ſuper oſſeo, nitente; circumferentiam faſcia lata flava lineolis fulvis inæqualiter diſtincta ambit; intus candet ſub nitore. *Bonann. n.* 398.
4. Tenuis, ſeu pectunculus lævis, aut certe admodum tenuiter ſtriatus, margine dentato flaveſcens, & interdum purpuraſcens. *Liſt. Tab.* 249. *f.* 83.
5. Pectunculus orientalis, ex rufo variegatus, ſtriis craſſiuſculis, diverſi centri. *Liſt. Tab.* 312. *f.* 148.
6. Pectunculus ex rufo variegatus, ſtriis tenuibus a vertice ad medium dorſum per circulares faſcias concurrentibus. *Liſt. Tab.* 310. *f.* 146.
7. Ruſeſcens, ſtriis ad marginem alicubi bullatis. *Liſt. Tab.* 340. *f.* 177.
8. Alius, craſſior, ex fuſco variegatus, ſtriis rugoſis. *Liſt. Tab.* 348. *f.* 186.
9. Diverſimode ſtriata, in latum expanſa. *Liſt. Tab.* 313. *f.* 149. conf. *Tab.* 346. *f.* 183.

§. 387. Spec. III. Lævis, ſiue circinis umbratilibus, tactu lævissimis:

1. Chama lævis, *Rumphii;* Chama nigra ſeu Concha Molæna *Athenæi.* De gladde Gaper of Japanſche Speel-Doublet *Belg.* quaſi quarta pars lentis convexo-convexæ, in utraque laterum conjunctione rugoſe plana, ſed in altera ſemper nigricante, ſinuata; extus varii coloris. Plinio Glycimeris, ut arbitratur *Rumphius.* Bia Letter & Bia Tenember Indis dicta.
   a. Glycimeris Amboinenſis 3. digitorum.
   b. Chinenſis, palmam longa. *Rumph. p.* 138. *n.* I. *Tab.* XLII. *lit.* G.
2. Chama lutaria, ſive coaxans. De Quakker vel Quaakker *Belg.* Bia Cadock, a plauſu ſonoro ita dicta, ſubrotunda, palmaris, lævis, lutoſi coloris. Latet in illa nonnunquam lapillus rotundus, argenteus, aliquando tuberculoſus. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* H.
3. Chama virgata. Bia Baguala, teſta fere rectangularis.

a. Tenuis, extus chalybea, radiis seu virgis obscurè flavis, ad cardinem concurrentibus, intus violacea. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* I.

b. Gravis, subfusce radiata. *List. Tab.* 268. *f.* 104.

4. Chama optica. Perspectiefie. Concha subrotunda, in rectum expansa, duos pollices lata; testa crassa, lævis.

a. Nigris macularum ordinibus domunculas, colles, & quid non? figurans. *Bonann. p.* 166. *n.* 376. *List. Hist. Tab.* 259. *f.* 95.

b. Tentoriis fasciis picta, quibus aplustra (*a*) insident. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* K.

c. Duabus fasciis concentricis & subtilibus cincta, lineis angulose parallelis, furvis & sanguineis. *Bonann. n.* 67.

d. Inter duas circinatas fascias concentricas, maculis flammeis & velut minutissime squamatis discriminata. *Bonann. n.* 327.

5. Chama Anglicana prima. Concha crassa, ex altera parte compressa, ex altera subrotunda, coloris albi. *List. de Coch. p.* 173.

6. Chama Anglicana secunda. *List. ib. p.* 174.

7. Chamula rubra; concha parva, subrotunda, ex parte interna rubens. Testa tenuis. *List. de Cochl. p.* 175.

8. Concha lævis *Rondelet.* magna, compressa, cinerea; circa oram rufa, rugosa; umbone exiguo, acuto; articulata per gomphosin. *Bonann. n.* 48.

9. Flammea; intus dentata, candida, lineis undosis, subflavis belle inscripta. *Bonann. n.* 61.

10. Virgata & fasciata, subtili & tereti testa, in concavo cyanea, in convexo livida, zonis castaneis & subflavis. *Bonann. n.* 66.

11. Fasciata, præstans & rara; testa lævissima, argentea veste induta, fasciolis holosericis nigris segmentata. *Bonann. n.* 85.

12. Quadrangularis, seu pectunculus ex flavo variegatus, rhomboides, sive ima margine quasi in angulum exeunte. *List. Tab.* 250. *f.* 84.

13. Africana; triquetra; alba; intus ex viola purpurascens. *List. Tab.* 252. *f.* 86.

14. Tenuis, albida, umbone rubescente. *List. Tab.* 263. *f.* 99.

15. La-

(*a*) *Aplustra*, Schreps-cieradien / Schiffs-zierahten.

15. Latiſſima, plana, intra & extra alba, Jamaicenſis. *Liſt. Tab.* 266. *f.* 102. *Tab.* 269. *f.* 105.
16. Maculata; Jamaic. maculæ ſunt inſtar nubecularum diſperſæ. *Liſt. Tab.* 270. *f.* 106.
17. Magna, margine denſe crenata, intus ex viola purpuraſcens. *Liſt. Tab.* 271. *f.* 107.
18. Pectunculus maximus, ſubfuſcus, valde gravis. *Liſt. Tab.* 272. *f.* 108.
19. Alba, paulo planior, Jamaic. *Liſt. Tab.* 273. *f.* 109.
20. Profunda; ad alterum humerum ſinus longiuſculus; Jamaic. *Liſt. Tab.* 274. *f.* 110.

GENUS III.

QUADRANS.

§. 388. Eſt quaſi quarta pars lentis circularis utrinque convexæ, in longiore latere ſinum formans vulvæ ſimilem; unde & Vulvaria dicitur. Venus-Schulp.

§. 389. SPECIES:

1. Remies, Gargadja alba; margine ſinus dentato. De getande Venus-Doublet. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* N. Icon exſtat in Tab. Noſtra X. n. 55.
2. Quadrans, het Quadrantje / *Rumphio* quaſi quarta pars caſeoli rotundi & compreſſi in latere plano; cordiformis & rufus, in dorſo circulariter lamellatus, cinerei coloris. *Liſt. Tab.* 307. *f.* 140. faſciis ad ſinum muricatis.
3. Sulcis circularibus raris, utroque ſinu circa mucronem dentato. *Rumph. Tab.* XLII. *lit.* F.
4. Vulvaria piloſa; circa ſinum pinnulis longis aculeata, longitudinaliter ſtriata, vel potius inter lamellas ſulcata. De Venus-Schulp met Haar. *Rumph. Tab.* XLVIII. *n.* 4.
5. Plicata, de gerimpelde oude Apfs-Schulp / *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLVIII. *n.* 5.
6. Granulata, alba; micis puniceis; circa ſinum pinnulis latis muricata. *Muſ. Klein.*
7. Anguloſe per longum ſulcata; plicis contentricis, caſtaneis faſciis velut conſtrictis; ad ſinum pauci adunci aculei. *Bonanni n.* 86.

CLASSIS IV.

DICONCHA SINU PROMINULO.

TELLINA.

§. 390. TELLINAS a conchis reliquis distinguimus per labia sinus in longiore conjunctionis latere prolapsa (*a*). Nomen antiquum sed vagum est; ut ut a πλέω, perficio, quia velocissime ejusmodi conchæ perficiuntur, etymon petas, tamen ex hoc criterio nemo Tellinas agnoscet. Ex collatione testarum hujus nominis aliam ex sinu differentiam addiscimus, hic per genera subordinata expositam.

(*a*) *Sive: sunt Diconchæ Sinuosæ, quarum labia prominula neglectis sinubus vel longiore vel breviore conjunctione leviter complicantur.*

GENUS I.

TELLINA CIRCINATA.

§. 391. CIRCINATAS dicimus TELLINAS, laxa denominatione, quæ lineas ducunt limbo parallelas.

§. 392. SPEC. I. Ἀγεαφος, rudis; sine inscriptione:

1. An virginiana seu Musculus brevior, fluviatilis, admodum crassus, ex interna parte subroseus, cardine incisuris minutis exasperato; *List. Tab.* 150. *f.* 5.? Est Tellina majuscula oblique in latum expansa; conf. *List. Tab.* 507. 154. & 155.
2. Virginiana II. seu Musculus fluviatilis fuscus, angustior, ex altera parte cuneatim protensus. *List. Tab.* 151. *f.* 6.
3. Pectunculus planus, albidus, intus leviter flavescens; cardinibus acute umbonatis. Jamaic. *List. Tab.* 265. *f.* 101. *Sloane It. Jam. p.* 259. 260. *List. Tab.* 267. *f.* 103.
4. Pectunculus ruber, crasse fasciatus & obscure virgatus. *List. Tab.* 306. *f.* 139.
5. Radiata lata i. e. per circulos subtiliter striata. *List. Tab.* 381. *f.* 224.
6. Tellina major, intus & extus purpurascens. *List. Tab.* 391. *f.* 230.

7. Tel-

7. Tellina ad umbonem extra maxime rubescens. *List. T.* 397. *f.* 236. *Sloane p.* 264.
8. Pallide admodum rufescens, lata, ex altera parte sinuosa. *List. Tab.* 395. *f.* 242. Figuram exhibet Tab. Nostra X. n. 56.
9. Tellina ex rufo maculata, fasciisque exasperata. *List. Tab.* 394. *f.* 241.
10. Fasciata, ex rubro variegata, anglica, oblonga. *List. Tab.* 403. *f.* 247.
11. Pectunculus crassus, ex rufo variegatus. *List. Tab.* 304. *f.* 145. Icon exstat in Tab. Nostra XI. n. 57.
12. Tellina maxima, latissima, subrubra circinata (non radiata) ad alterum latus sinuosa. *List. Tab.* 387. *f.* 234.
13. Subalbida. *List. Tab.* 388. *f.* 235; an ead. cum præced.?
14. Tellina a Madagascar. *List. Tab.* 386. *f.* 233.

§. 393. Spec. II. Ἔγγραφος sive literata. *Rumphio* dicitur Chama.

1. Oblonga; Strik-Doublet; Japansche Matje; Letter-Schulp. Bia letter; ad 5. digitos longa, tres lata, ex cardinibus umbonatis, oblique in latum expansa; super fundo leucophæo nigris lineis angularibus inscripta. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* B. Hujus speciei dantur quinque vel sex varietates. Tellina major, intus lactescens, fasciis exasperata, radiata. *List. Tab.* 399. *f.* 238.
2. Tenuis, minor; subcinerea, punctis nigris incompositis. *Rumph. p.* 139. *n.* VI. *List. Tab.* 380. *f.* 223. Iconem vide in Tab. Nostra XI. n. 58.
3. Crassa, oblonga, undis fuscis. *Rumph. ib. List. T.* 378. *f.* 221.
4. Xulanensis, plana; super circulis acute undosa. *Rumph. Tab.* XLIII. *lit.* L. *List. Tab.* 379. *f.* 222.; quasi literis Runicis notata. Figuram exhibet Tab. Nostra XI. n. 59.
5. Neapolitana; subtilis, fragilis, subalba; colore punctatim subviridi, aspera & lineolis undosis, ostrinis, dilutis, cinereis & heluaceis notata. *Bonann. n.* 43.
6. Drepanitana; alba; lineis castaneis, huc illuc sine regula discurrentibus signata, & punctis subflavis aspera. *Bon. n.* 46.
7. Brasiliensis, lacteo colore albicans, veluti plicis quasi tunica composita, ob lineolas, quibus signatur, quas aliæ lineæ transversales undose secant. *Bonann. n.* 349.

8. Neapolitana, undosa, flavescens, maculis punctatis; coloris subvulterini (*a*) & sanguinei. *Bonann. n.* 68.
9. Tellina major reticulata. *List. Tab.* 400. *f.* 239.
10. Tellina magna lutescens. *List. Tab.* 402. *f.* 246.
11. Ex viola purpurascens, runice inscripta leviter. *List. Tab.* 303. *f.* 144.

(*a*) Subvulterinus; *ex rubore fusco nigrescit, ut Vultur;* braunschwartz.

GENUS II.

TELLINA VIRGATA.

§. 394. Bia malum; Nacht-Schulp. Loco literarum virgis latis rubris & albis super circinis ex umbone ad speciem radiorum per foramen in conclave obscurum projectorum. *Rumph. p.* 139. *n.* VI.

§. 395. Species:

1. *Rumphii.*
   a. Sonnestralen. Bia Matta Hary; digitum longa, duos pollices lata, altero latere rotundo, altero labioso; rugis margini parallelis & asperis; *Tab.* XLV. *lit.* H.
   b. Alia luteola; virgis rubris in cardine concurrentibus. *Rumph. p.* 147. *n.* VIII.
2. *Bonanni:*
   a. Rubra virgis albis & flavis. *Bon. n.* 382. *List. Tab.* 383. *f.* 226.
   b. Coloribus diversimode temperatis & evanidis, in ambitu serrata, ex mari Lusitanico. *Bonann. n.* 36.
   c. Fasciata; fasciola perpendiculari candida, quam color castaneus in vinosum abiens hinc inde terminat; e littore German. & Britan. *Bonann. n.* 42.
3. *Listeri:*
   a. Subrufa lata, ex Ind. Orient. *List. Tab.* 392. *f.* 231.
   b. Magna, albida, ex rubro late radiata, Jamaic. *List. Tab.* 393. *f.* 240. Icon exstat in Tab. Nostra XI. n. 60.
   c. Variegata, unico radio sive plagula albescente conspicua. *List. Tab.* 384. *f.* 227.; an eadem cum *Bon. lit.* C. *n.* 42.?
   d. Parva, albida, ex purpureis maculis virgatim radiata. *List. Tab.* 389. *f.* 228.

GE-

GENUS III.

TELLINA STRIATA.

§. 396. Titulus patet ex definitis jam nominibus.

§. 397. SPECIES:

1. Arenosa. Bia Passir. Digitum longa, duos pollices lata, crassa, striis subtilibus, incurvis, granulatis pectinata.
   a. Coloris cinerei & subalbidi.
   b. Rubicundi, maxime circa limbum internum. Lapillus in his conchis margariticus audit. Bia bocassan, *Rumph. p.* 146. *Tab.* XLV. *lit.* C.
2. Saxatilis; Bia Batu; crassa, rugosa, parum striata; in antica parte hians; lanugine adhæret saxis. *Rumph. ibid.*
3. Anglicana; intus ex viola purpurascens; in ambitu serrata, *List. de Cochl. p.* 190. Testa pulchra; foris alba, plana, subtilissime striata. conf. *Bonanni p.* 104. *n.* 37.
4. Concha candida dupliciter striata, & veluti aculeata; *List. de Cochl. p.* 193. Testa tenuis, fragilis, candida sesqui digitum longa & lata, valde concava, angusta. Fors Dactyli veterum quædam species.
5. Tellina, umbone omnium acutissimo; testa, quæ coloribus diversis quasi opere tessellato decoratur, admodum tenui. *Bonann. p.* 105. *n.* 38.
6. Cozze Italorum, concha oblonga, angusta, dense striata ex vertice obtuso:
   a. Simul fasciata. *Bonann. n.* 78.
   b. Crenata ad sinum prolapsum & concentrice circinata. *Bonann. n.* 79. *List. Tab.* 233. *f.* 67.
7. Brasil., minutissimis crenulis circa limbum signata. Intus purpurea, foris ex cardine circa peripheriam alba. *Bon. n.* 384.
8. Pectunculus tenuis, subruber, minutissimis striis undatis exaratis. *List. Tab.* 339. *f.* 176. Pectunculus Jamaic. rubescens, undis capillaceis tenuissimis. *Petiv. Phil. Transf. n.* 299. *Mem.* 1708. *p.* 222. *n.* 24. *Sloane p.* 260.
9. Pectunculus parvus, intus ex viola purpurascens, striis densis circa maginem imbricatis. *Sloane p.* 260. *List. Tab.* 338. *f.* 175. ((Tellina parva, radiata, intus omnino purpurascens. *Petiv. Gaz. Tab.* 18. *Transf. Phil. n.* 299. *Sloane p.* 264.))

10. Cunei

10. Cuneiformis, crassa, densè striata; ambitu serrato; intus violacea. *List. Tab.* 375. *f.* 216. *Tab.* 376. *f.* 218. Huc pertinent, quæ *num.* 9. (x). Figuram vide in Tab. Nostra XI. n. 61.
11. Purpurascens, margine sinuosa; Jamaic. *List. Tab.* 376. *f.* 219. *Sloane p.* 265.
12. Musculus latior, subfuscus, cæruleis lineis radiatus. *List. Tab.* 152. *f.* 7.

GENUS IV.

TELLINA GRANULATA.

§. 398. Denominatio patet ex vocibus sigillatim definitis (granulata, chagrinirt).

§. 399. Species:

1. Picta. Kappya; striata granulata, geographica.
   a. Cinerea, intus alba; *Mus. Klein.*
   b. Rufa cinere picta; intus rubra; pollicem longa. *Rumph. p.* 147. *n.* 17.
2. Lingua felis; **Katte-tonge; Robbe-tonge; Segzeine Doublet.** Testa lata plana, uno latere rotundo, altero labiosè exserto, squamulis seu papillis aspera, instar linguæ felinæ.
   a. Super albo virgæ rubræ, ad cardinem confluentes.
   b. Alba, striis granulatis, minus nobilis. *Rumph. p.* 147. *n.* VII. *Tab.* XLV. *lit.* G. Figuram ostendit Tab. Nostra XI. n. 62.
3. Fasciis, quasi dentatis aspera. *List. Tab.* 302. *f.* 143.
4. Magna, plana, orbicularis, fere rubescens, capillaribus striis quasi cancellata & aspera; Jamaic. *List. Tab.* 337. *f.* 174. *Sloane p.* 260.

GENUS V.

TELLINA LÆVIS.

§. 400. Ventricosa, oblonga, profusis labiis sinuosis, altero latere citò decrescens; cæterum nomen per se clarum.

§. 401. Species:

1. Tellina Gari; quod est Bellariorum genus; constans carne con-

condita hujus generis concharum, ſæpe & inteſtinis piſcium. Bia Bocaſſan, Blaſtor & Blaſtol; digitum longa; pollicem lata; in labiis exſertis rugoſa; coloris cærulei; virgis albis; ad cardinem parum hians. *Rumph. Tab.* XLV. *lit.* D.

2. Fuſca, quatuor pollices longa, duos lata, rariſſima. *Rumph. Tab.* XLV. *lit.* H.

3. Tellina lævis *Rumphii.* Roos-Doublet; altero latere rotunda, altero labiata.
   a. Eburnea
   b. Flava, ad cardinem rubra; } *Muſ. Klein.*
   c. Alba, obſcure virgata. Alba tenuis, ad alterum latus ſinuoſa; *Liſt. Tab.* 406. *f.* 252. Norvagica. *Liſt. Tab.* 407. *f.* 253.
   d. Rubra; *Rumph. Tab.* XLV. *lit.* I. *Liſt. Tab.* 405. *f.* 250. Tellina parva, intus rubra, ad alterum latus ſinuata. Tellina lævis albida, rotunda, *Sloane Vol.* II. *p.* 264. Liſteri Tellina lævis, intus & extus rubra, ad latus ſinuoſa. *Liſt. Tab.* 405. *f.* 251.

4. Petasunculus (*a*); Hammetje / Banquet-Hammetje. Tellina cultriformis ſeu oblonga, altera extremitate acuminata, digitum longa, pollicem lata, tenuiſſima.
   a. Rubra, *Liſt. Tab.* 382. *f.* 225. cuneo anguſto, productiſſimoque. Icon exſtat in Tab. Noſtra XI. n. 63.
   b. Carnea latior; } *Muſ. Klein.*
   c. Flava velut eburnea; }
   d. Minor rubra, ſine cardinis umbone.
   e. Striata, longa, alba, vel candide cinerea. An eadem *Liſt. T.* 398. *f.* 237.? *Bon. n.* 354. *Rumph. T.* XLV. *lit.* L.

5. Literata Xulanenſis, lævis, lineis undoſis. Tour de Bia *Belg.* Vid. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLV. *lit.* M.

6. Subrotunda, tenuis, omnium minime cava; cardinis medio ſinu & amplo & pyriformi; *Liſt. de Coebl. p.* 174. Teſta tenuis, fragilis, alba.

7. Longa, ſine dentibus; adeo expolita, ut arte nitor videatur ſuperadditus. Igneo colore fulget, aut rubeſcit; interdum roſea, aliquibus zonis circa cardinem candidis decoratur; *Muſ. Klein.*

8. Concha

(*a*) *Petasunculus*, ein kleiner Hammer.

8. Concha Pictorum, ſub indumento furvo; in concavo margaritica, in qua parvulas uniones invenis. *Bonanni n.* 41. Teſta acute oblonga.
9. Roſea, faſciis albis, rotunda; in mari Luſitanico. *Bon. n.* 44.
10. Virgata, oblonga. *Bonanni n.* 47.
   a. Dilute flava, furva, vel cyanea & terrea.
   b. Pellucidâ, velut ex velo duplicato compoſita.
   c. Citrea.
   d. Nivea puriſſima.
11. Rugata; rotunda, ab altera parte verticis acutioris procedens per lineam rectam, ſed brevem. *Bonann. n.* 55.
12. Camadie Tarentinorum. Concha faſciata. *Bonann. n.* 64. Faſciis ex Caſtaneo rubris, ex vertice ad oram perpendiculariter, & aliis concentrice ductis, quibus interſeruntur maculæ rubicundiores, velut muſicæ notæ, aut muſici operis fragmenta, pellucida, ſandaraca nitentia. Intus eſt lævis, candida, ut Parius lapis.
13. Subcærulea, Braſil. faſcia venoſa & carnea cincta, ubique valde pellucida & nitida. *Bonanni n.* 352.
14. Subflava, plana, tenuis, utrinque a roſtro ſinuoſa. *Liſt. Tab.* 300. *f.* 137.
15. Tellina alba, craſſa ad dorſum, extra purpuraſcens. *Liſt. Tab.* 408. *f.* 254.

GENUS VI.

TELLINA MURICATA.

§. 402. Species:

1. Folium. Bia Lida. Leve, tenue, ſine umbone, latere altero oblongo, & rotundo, altero labioſo, aſpero & dentato.
   a. Flavum.
   b. Virgatum. *Rumph, p.* 148. *n.* X. *Tab.* XLV. *lit.* K. Figuram oſtendit Tab. Noſtra XI. n. 64.

CLAS-

CLASSIS V.

PYLORIS.

§. 403. Sub hoc titulo comprehendimus Diconchas numquam perfecte circa marginem clausas, sed hiatu aliquo diductas (in utraque extremitate, minimum duobus in locis, hiatulas).

§. 404. Derivamus vocem a πύλη, porta, unde πύλωρος, janitor; pro quo forte *Plinius* & *Athenæus* legerunt, πυλείς; nomen obscurum.

GENUS I.

SOLEN BIVALVIS.

§. 405. SOLEN veteribus notat tubulum; unde testas tubulosas Solenes appellavimus (*Descript. Tubulorum marinorum*). Hic Diconchas longas simplices, & Tubulorum more cavas, non ubivis perfecte clausas, SOLENES BIVALVES dicimus cum *Rumphio*.

§. 406. *Synon.* Unguis, dactylus, vagina. *Belg.* Orgelpyp; Goot-Doublet. *Mal.* Bia butu. Bia Saron. Krang Silli. Bia Kolkoe, quia testa velut ex squamis composita. Sulinus modernorum *Græcorum*. Languetti, *Italis*. Pesce Canella, *Bonon.* Concha longa *Venet.* & Canna lichio. *Plinio:* Solen, Aulos, Donax, Onix, Dactylus. Couteaux *Gall.* Couteliers ou Couteaux seringue *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1712. *p.* 115. 116. Ressemblent assés aux manches de divers Couteaux anciens; ils sortent de leur trou, lorsqu'on y jette du sel. *Ibid. p.* 119. 120.

§. 407. SPECIES:

1. Solen bivalvis *Rumphii Tab.* XLV. *lit.* M. quinque pollices longa, unum lata; testa tenuis, ex tereti plana, membrana in altero latere ex parte juncta, utroque extremo patens; quorum alterum rectum, alterum rotundum est. Color fuscus, albis virgis notatus; generantur in arena, in qua perpendiculariter eriguntur. *Bon. n.* 57. *List. Tab.* 409. *f.* 225. Solen major subfuscus, rectus. Hic Solenes conchas dicit tenues longissimas, ab utraque parte naturaliter hiantes. Figuram vide in Tab. Nostra XI. n. 65.

2. Rectus, brevior, ex purpura radiatus. *Liſt. Tab.* 410. *f.* 256. & *Tab.* 414.
3. Curvus maximus. *Liſt. Tab.* 413. Minor; *Tab.* 411. *f.* 257.
4. Mas; virgatus & ſubcærūleus Athenæi. *Liſt. Tab.* 412. Major.
5. Fæmina; Athenæi; *Liſt. Tab.* 412. Minor.
6. Cylinder, Coutelier d'Aunis & de Poitou; figura ab omnibus differt. *Mem. de l'Acad.* 1712. *p.* 117. *Planche* 6. proxime tamen accedens ad ſpeciem I. *Rumphii, Bonanni & Liſteri.*

GENUS II.

CONCHA LONGA BIFORIS.

§. 408. Ad diſtinctionem Solenum; ſunt Diconchæ longæ, in utraque extremitate notabiliter patentes.

§. 409. SPECIES:

1. Tellina violacea, *Rumphii Tab.* XLV. *lit.* E. Teſta tenuiſſima, quinque pollices longa, unum lata, vaginæ inſtar; in utroque extremo patula; violacea virgis albis; in arena perpendiculariter hærens. De Sonneſtraal van Baguala/ de groote Tour de Bra/ de purpere Sonneſtraal *Belg.*
2. Soleniformis; chama ſubfuſca anguſtiſſima. *Liſt. Tab.* 420. *f.* 264. Figuram exhibet Tab. Noſtra XI. n. 66.
3. Chama tenuis; violacea radiata; coſta unica ex interna parte firmata, *Liſt. Tab.* 422. *f.* 266. Latior & brevior eſt. *n°* I.

GENUS III.

PHOLAS.

§. 410. PHOLADES ſunt Diconchæ longæ, margine inæquali, biſores; in ſummitatibus *nonnullarum* apophyſi, vel teſtula acceſſoriâ, cardini ſuper injecta (qualem vide ſis *Liſt. Tab.* 437.); plerumque in corporibus duris nidulantes. La Coquille eſt compoſée de trois pieces, dont deux ſont ſemblables, egales & fort grandes, par rapport à la troiſieme; celle-ci eſt poſée aupres du ſommet des deux autres; elle remplit un petit eſpace, qui reſteroit vuide entre elles. *Mem. de l'Acad.* 1712. *p.* 126. *Planche* 7. Ideoque hæc teſtula acceſſoria conſideranda venit, quaſi operculum, quarundam Cochlidum domiportas claudens. Dail Cuillier, *Gallis.*

§. 411.

§. 411. Spec. I. Saxorum. *Malaice*: Aſſuſengbatu. Steen-Scheede / Steen-Moſſel / *Belg.*

1. Rumphiana; oblonga; digito æqualis, nigra, rugoſa, infra obtuſa & alba, in altera parte ſuperiori acuta. Reperitur in ſaxo calcario, in den Kalk-koppen / per quæ ductus patent ad animalculum. *Rumph. Lib.* 12. *Herb. Amboin.* & *Muſei p.* 152. *n.* V. *Tab.* XLVI. *lit.* F.
2. Anglica; Concha inter lapidem cretaceum hærens. *Liſt. de Cochl. p.* 172. Admodum fragilis; umbonata; digito brevior, vix dimidio latitudine æqualis, modice cava; extus rugoſa, intus lævis, coloris albi.
3. Pholas Aldrovandi, elliptice oblonga & acuta. vid. *Jonſton. Tab.* XV.
4. Narbonenſis, medium palmum longa, ſeſqui digitum lata; vertex quaſi bifidus; intus alba, foris cinerea, reticulata, corrugata, ea parte, qua ſaxum penetrat, aſperior. *Bonanni n.* 25. 26. 27.
5. Dactylus, a fructu Palmæ, cui aſſimilatur, longus; tunica ſubtili circumtegitur rugoſa, caſtanea; intus eſt lævis & albidus; frequens in littoribus Italiæ. *Bonann. n.* 28.
6. Pholas albus, anguſtus, ad dimidium fere dorſi lævis, carè dinibus perforatis. *Liſt. Tab.* 431. *f.* 274.
7. Alius, anguſtus, albus, ſtriis tenuibus aſper. *Liſt. Tab.* 234. *f.* 277.
8. Striatus, ſinuatus ex altera parte, Anglicus. *Liſt. T.* 433. *f.* 278.
9. Virginianus ſeu maximus; albus; ſtriis raris & imbricatis aſper, cardine integro. *Liſt. Tab.* 434. *f.* 277.
10. Pholas parvus, aſper. *Liſt. Tab.* 435. *f.* 278.
11. Pholas latus, Anglicus, rugoſus ex dimidio, dorſo aſper. *Liſt. Tab.* 436. *f.* 279. Ad hunc accedit Pholas ſur les Côtes de Poitou & d'Aunis *Mem. de l'Acad.* 1712. *p.* 126. Ibidem alter parum diverſus ab illo; videtur altera Concha longa *Plinii* apud *Rondeletium.* An, *Liſteri Tab.* 433. *f.* 276. ſupra *n.* 8.?

Spec. II. Lignorum:

1. Rumphiana; longa; acute elliptica; fragilis; verticali foramine rotundo; coloris cinerei; in palis putridis vivens. *Rumph. Tab.* XLVI. *lit.* H.

Spec. III. Corallorum:

1. Pholas niger, e magnis radicibus Corallii albi Indiæ Occiden-

talis exemtus. *Liſt. Tab.* 327. *f.* 268. Pholas minor, atro rubens, tenuis, ſtriatus. *Sloane p.* 263. *Tab.* 241. *n.* 22. 23.

SPEC. IV. Arenæ:

1. Dactylus arenoſus, longiuſculus, corallorum ſimilis, ſed paulo incurvus; in arena olivaris. *Bonanni n.* 29. *p.* 102.
2. Mytulus anatarius. Aſſugeng Bebec. Aerd-Moſſelen; *Amboin.* Ihul, Lulat; articulum digiti longus, 1½ latus; effodiuntur, ut anatibus in eſcam cedant. *Rumph. Tab.* XLVI. *lit.* C. Figuram vide in Tab. Noſtra XI. n. 67.
3. Muſculus arenarius; Aſſuſen Paſſir; fragilis; griſeus, ad pullum inclinans; ex vertice obtuſo in figuram vitulini lienis expanditur. *Rumph. Tab.* XLVI. *lit.* E. In hoc reperitur Myites.

GENUS IV.

CONCHA LONGA UNIFORIS.

§. 412. Ita nominare licet Diconchas longas, quæ uno quodam loco marginis hiant.

§. 413. SPECIES:

1. Roſtrum Anatis. Eende-Bek / eenwigduurende Goper / *Belg.*
   a. Majus, craſſum, latum; margine ſimbriato; inſtar muſculi extenſum, in altero extremo circa cardines clauſum, in altero patulum, coloris cinerei; in arena perpendiculariter hærens. *Rumph. Tab.* XLV. *lit.* N.
   b. Breve, fere transparens; ventricoſum; altero extremo valde patulo, ſuper griſeo piloſum. *Rumph. Tab.* XLV. *lit.* C.
   c. Longiuſculum, digitum minimum longum & craſſum, transverſim ſtriatum, valde hians, labiis diductis. *Rumph. Tab.* XLV. *lit.* P.
2. Volſella (*a*) Baardkupper. Diconcha longa, in extremitate umbonata; altero latere per ginglymum cohærens; teſta tenuis, plana, hians inſtar Volſellæ.
   a. Quatuor pollices longa, rugoſa, pulla, alias & *roſtrum Anatis.*
   b. Parum incurva, minor; coloris terrei; harum copia mediante muſco cohæret. *Rumph. Tab.* XLVI. *lit.* A.

3. Bia

(*a*) Kornjange / Baartjange.

3. Bia Catsjo seu Hua, Ily vel Huilli. Parvus solen, pollicem longus; instar haustelli tuberosus; albus, vel cæruleo virore mixtus, dorso lævi. *Rumph. p.* 150. *n.* III.
4. Solen rostratus, seu altera extremitate canaliculatus, ad cardines diductus, testa rugosa. Concha altera *Jonstoni Tab.* XI.
5. Concha lævis; altera tantum parte claudenda, apophysi admodum prominente lataque prædita. *List. de Cochl. p.* 191. Vix duos digitos longa, sesquidigitum lata; foris rugosa, intus lævis. An *List.* Chamæ-Pholas *Tab.* 428. *f.* 269.?
6. Concha longa, *Rondelet.* rectius Peloris *Plinii*; quia frequens ad *Pelorum*, montem Siciliæ, valde pulchra visu; colore albo; circa cardinem distincta fasciis roseis, quibus binæ notæ candidæ, radiorum instar, ab eodem cardine extensæ super imponuntur, sulcos subtiles circinatos alii transversales discindunt, ut dupliciter corticosa videatur. *Bonanni n.* 77.
7. Chama nigra *Rondel.* ex mari medit. seu chama angusta, subrubra, oblique striata, duobus radiis medio dorso insignita. *List. Tab.* 416. *f.* 260.
8. Lutescens, ex rubro radiata. *List. Tab.* 417. *f.* 261.
9. Angustior, ex altera parte sinuosa. *List. Tab.* 421. *f.* 265. Icon exstat in Tab. Nostra XI. n. 68. a. b.
10. Chamæ Pholas, fasciata ex altera parte, intus violacea. *List. Tab.* 429. *f.* 270.
11. Chamæ Pholas, angusta parva, sinu utrinque leviter muricato. *List. Tab.* 426. *f.* 267. Potius Tellinæ Pholas dicenda, quia est quasi Tellina longa abscissa.

GENUS V.

MUSCULUS POLYLEPTO GINGLYMUS.

§. 414. Est Diconcha hiatula; intra vertices umbonatos planum latus intercipiens, quod medium per futuram dividitur & lineis inscriptis plures Rhombos signat.

§. 415. Species:

1. Arca Noæ. De Noachs Arck. *Schynvoet ad Rumph. Tab.* XLIV. *lit.* P. Concha Rhomboidalis, naviculam exprimens *Bonann. n.* 32. Musculus striatus, *Matthioli.* Mitylus seu musculus striatus, fasciis undatis depictus. *List. Tab.* 368. *f.* 208.

f. 208. Bi-Indian, Large muſcle; *Petiv. mem.* 1708. *p.* 247. *n.* 62. *Sloane p.* 257. Eſt Diconcha umbonatis verticibus intercipiens planum rhomboidale, pluribus rhombis inſcriptum & per medium, crenularum conjunctione, quaſi conſutum.

2. Balanus *Bellonii* tenuiter ſtriatus. *Liſt. Tab.* 367. *f.* 207. Figuram vide in Tab. Noſtra XI. n. 69, 70.

3. Muſculus anguſtior, craſſioribus ſtriis donatus, undatim depictus. *Liſt. Tab.* 369. *f.* 209. Tota concha eſt undata.

4. Muſculus parvus, ſubluteus, anguſtus, leviter ſtriatus. *Liſt. Tab.* 365. *f.* 205.

5. Muſculus parvus, latus, tenuiter ſtriatus, ex fuſco purpuraſcens. *Liſt. Tab.* 366. *f.* 206.

GENUS VI.

PINNA

§. 416. Sunt Diconchæ magnæ, ad Triangulum acutangulum figura ſua accedentes; longæ; vertice acuto; baſi rotundata, acuta & aſpera, tenui, inter utramque teſtam aperta.

§. 417. *Synon.* Bia Mantsjado. Kima omin, *Belg.* Polſter-Schulp; Ham-Doublet; Steek-Doublet; quia dimidiæ hærent in fundo; Græcis πίνα; de quibus *Plinius* & *Cicero de nat. Deor. Lib.* II. forte a πίνω, ſordes. *Latini* Pinnam vocant, a ſimilitudine pinnarum murariarum; *Gall.* Naire. *Ol. Magn.* Nacherone. *Tarent.* Paricella. *Aconitani:* Aſtura. *Hermol.* Concha Ægyptia, Lana Pinna, ſeu Pinna lana.

§. 418. SPECIES:

1. Longa; 1½ pedes; in vertice 4. pollices lata; cujus alterum latus curvum & alterum ſinuoſe convexum; byſſo ex vertice prominente; baſis flexuoſe arcuata hiat; margines ejusdem cultro acutiores; color nigricat; in fundo teſta ſalſilagine obducta; reliqua munda; leviter ſquamata; Apex eſt albus; intus pars latior nigra, inferior argentea. *Rumph. Tab.* XLVI. *lit.* I.

2. Pellucida alba, junior ¼ pedem longa, in longum ſtriata, ſquamea; ſenſim rufeſcens; baſis rectilinea; fragilis teſta inſtar

inſtar vitri. *Rumph. ib. lit.* K. An pinna tenuis, ſtriata, muricata, *Liſt. Tab.* 370. *f.* 210.? In his pinnis latet Pinnophylax; Pinnaraditer; parvula eſt voluta, ova ibidem excludens. *Rumph. p.* 153. *n.* I. Figura exſtat in Tab. Noſtra XI. n. 71.

3. Lata. *Plinii* Perna. Pinna fœmina; teſta craſſior, pernæ Weſtphalicæ ſimilis; pedem lata; 16. pollices longa, in latere hiante ſinuoſa, coloris ſubnigri; paucis pinnulis longis circa baſin. *Rumph. Tab.* XLVI. *lit.* L.

4. Alba minor, ſæpe flaveſcens, tenuis, ſemidiaphana, non perfecte triangularis; lateribus ſinuoſis; leviter ſtriata, palmam longa; pendula ex ſaxis. *Rumph. Tab.* XLVI. *lit.* N.

5. Dentata ſive aculeata, *Aldrov.* ſquamarum dentatarum ſeriebus in parte latiore concentrice diſpoſitis. Baſis recta eſt & lacera. Figura valvarum quaſi acutum triangulum ſphæricum efformat. Intus ſub nitore flavo & pellucido argenteus color; foris teſta quaſi tophacea. Degit in hac Cancellus, teſte *Æliano* & *Plinio*, ſed magis invitus, quam invitatus hoſpes. *Bon. n.* 24. *Jonſton. Tab.* XVI.

6. Aculeata *Rumphii Tab.* XLVI. *lit.* M. perpendicularibus ſeriebus acicularum denſis, figuræ eſt Trianguli acuti, baſis inæqualis. Color nigricat, vel terræ ſimilis eſt. An, Pinna tenuis, ſtriata, muricata. *Liſt. Tab.* 370. *f.* 210? The ſmale muricated Pinna, *Sloane p.* 254.

7. Pinna magna, *Bonann. p.* 210. *n.* 23. palmos tres longa, foris terrea, lutoſa, ſcabra, intus rubida, nitens, acumen margariticum; ad baſin fere plana; in apice quaſi pyramis quadrilatera.

8. Cuſpes, ſive Pinna magna, *Rondelet.* acuta, iſoſceles; baſi rotunda, media ſpina perpendiculari eminente, teſta ſcabra. *Jonſt. Tab.* XVI.

9. Perna minor, *Jonſt. ib.* virgata, ſive plicata, lævis.

10. Elliptica, parva *Rondel.* figuræ ovalis in roſtrum productæ, altero latere gibboſæ; teſta ab extra villoſa. *Jonſt. Tab.* XVI.

11. Lunaris, ſub titulo; pinnæ aliæ. *Jonſt. ib.*; elliptice elongata.

12. Squamata per ſeries raras perpendiculares ſuper dorſo planiore, figuram ficus compreſſæ imitante; *Jonſt.* Perna major, *ibid.*

13. Spatula, quam ejus anterior pars refert. Pinna III. *Jonſt.*

Tab. XVI. ſuper dorſo rugoſo perpendiculares habet lineas, cum ſeriebus alternantes.

14. Triangularis, lævis. *Jonſt. ibid.* ſub titulo: Pinna cum tubere adnato.
15. Striata triangularis. *Liſt. Tab.* 371. *f.* 212.
16. Triangularis circinata. *Liſt. Tab.* 370. *f.* 211.
17. Pinna ingens acute elliptica; undis transverſalibus tota aſpera. *Tab.* 374. *f.* 215.
18. Pinna magna, tota ſquamata ex Carolina. *Liſt. T.* 372. *f.* 213.
19. Pinna magna, imbricata, ſive tubuloſe muricata, figuræ acute ellipticæ, *Liſt. Tab.* 373. *f.* 214.

GENUS VII.

CONCHA EBORACENSIS.

§. 419. Eſt Diconcha brevis, utrinque patens, modice craſſa; ab altera parte ſubrotunda; in altera ſphærice angularis; ex cardine dentem longiuſculum exſerens; ſtriis criſpatis; an ex Peloridibus Antiquorum? *Liſt. de Cochleis p.* 192.

GENUS VIII.

GLICIMERIS.

§. 420. Sub hoc nomine, ſumpta a ſpecie primaria denominatione, complectimur Diconchas magnas craſſas & ſubrotundas, altera parte perpetuum hiatum formantes.

§. 421. SPECIES:

1. Corticoſa, ponderoſa; figlini coloris; maculis pullis deturpata foris, 1½ pedes longa, æqualiter a vertice exporrecta. *Bonann. n.* 59. Iconem vide in Tab. Noſtra XI. n. 72.
2. Chama Glicimeris, *Aldrov.* ex mari Hiſpanico. *Liſt. Tab.* 414. *f.* 258. Chama medit. maxima, percraſſa, *Petiverii.*
3. Chama fuſca; lata; planior, Anglica. *Liſt. Tab.* 415. *f.* 259.
4. Chama lata, ſinuoſa; cardine productiore lateſcente. *Liſt. Tab.* 418. *f.* 262., major Norvagica.
5. Chama fuſca, ſtriis tenuioribus donata. *Liſt. T.* 423. *f.* 271.

6. Alia

6. Alia rotundior, ſtriata, atque ex purpura radiata. *Liſt. Tab.* 424. *f.* 272.
7. Alia, diffuſior; intus violacea, ſtriata; ex purpura radiata. *Liſt. Tab.* 425. *f.* 273. *Sloane p.* 265.

GENUS IX.

MACTRA.

§. 422. MACTRA audit Diconcha patula; craſſe ſtriata; vertice valde obtuſo; latere altero effuſo, ut tota concha fere pedem hominis inferiorem referat; in baſi inter margines apertura eſt. Valde cohærent ſimplici membrana. Pecten ſaxatilis *Rumphii*. Bia batu. Back-Troch.

§. 423. SPECIES;
1. *Rumphiana;* coloris obſcuri, longior; *p.* 143. *n.* X. *Tab.* XLIV. *lit.* L.
2. *Bonanni*, alba; interdum nigreſcens. *p.* 108. *n.* 74. Figuram oſtendit Tab. Noſtra XI. n. 73.

PARTIS SECUNDÆ.

SECTIO III.

DICONCHA INÆQUALIS.

§. 424. DICONCHÆ INÆQUALES nobis audiunt, quarum altera Concha alteram limbo ſuo exſuperat.

§. 425. *Symon.* Conchæ anomiæ; ab ἀ privativo & νόμιος legalis ſeu regularis; ut ἀνόμιος ſit idem, quod irregularis.

GENUS I.

TEREBRATULA.

§. 426. TEREBRATULAS, *Luidiano* titulo, vocamus DICONCHAS anomalas, roſtro perterebrato, vid. *Nomencl. Litholog. Promotum* hoc titulo.

§. 427. SPECIES:
1. Simplex; & rugoſa *Fab. Columnæ de Purp. Cap.* XII. §. 3.

pag. 32. figuræ oblongæ; margine æquali. Icon exſtat in Tab. Noſtra XI. n. 74.

2. Plicata:
   a. Per duplicem ſinum longitudinalem depreſſa, parum oblonga, candida tenuis, oblique additamentis rugoſa, ſed non ob id aſpera. *Fab. Col. ib.*
   b. Neptuniana major, *Columnæ Cap.* XIII. tres pollices longa, duos lata, margine undoſa.
   c. *Imperati* Concha margine undoſa, in ſpiras contorta, M literam repræſentante; dorſum habet elatum, non cavum; altera parte triplici canali diſtinguitur. *Fab. Col. Cap.* XIV.

GENUS II.

CONCHA ΤΡΙΛΟΒΟΣ.

§. 428. Diconchas anomalas, vertice integro, licet dependente aliquando, ambitu velut in tres lobos ſeu gibbos continuos elato; ex *Fab. Columnæ* autoritate dicimus CONCHAS TRILOBAS. vid. *Nomencl. Lithol. promot.* lit. ANOMIÆ CONCHÆ.

§. 429. SPECIES:
1. Striata prima, rarior, *Columnæ;* Concha craſſa, medio lobo eminente, lenis ſtriis, totidemque ſtrigibus in ſingulis lobis, quibus margines denticulatæ ſunt, inſecta; præterquam parte interjecta inter lobos, quæ recta linea marginem definit. Altera parte, qua valvæ in caput prominent, medium habet locum depreſſiorem & oblongiorem reliquis a latere brevioribus & elatis, eodemque modo ſtriatis: qua parte tota concha expanſis alis aviculam incurvam repræſentare videtur; *Fab. Col. de Purpura Cap.* XV. §. 1. *pag.* 35. Figuram vide in Tab. Noſtra XI. n. 75.
2. Striata ſecunda. *Ejusd. ibid.*
3. Striata tertia. *Ejusd. ibid.*

GENUS III.

CONCHA ADUNCA.

§. 430. Eſt DICONCHA, cujus valva altera rugoſa inſtar roſtri ſubteretis & adunci incurvata, altera vero, inſtar operculi, a capaciore recipitur.

§. 431.

§. 431. SPECIES:

1. Albida. *Listeri Tab.* 357. Icon exstat in Tab. Nostra XII. n. 76, 77.
2. Sublivida. *Mus. Klein.*
3. Musculus parvus subfuscus, capillaceis striis. *List. Tab.* 356. *f.* 194. Figuram vide in Tab. Nostra XII. n. 78, 79.
4. Musculus exiguus, fuscus, valde cavus, angustior. *List. Tab.* 359. *f.* 197.

GENUS IV.

BURSULA.

§. 432. Hoc nomen damus Diconchis inæqualibus subrotundis sive oblongis; rostro integro, super dorso conchæ alterius eminente: *breviter:* Terebratulæformes rostro non perforato.

§. 433. SPECIES:

1. Corallina, a colore convexitatis; concavitas est alta & lævis; *Bonann. n.* 53. Figuram exhibet Tab. Nostra XII. n. 80.

GENUS V.

GLOBUS.

§. 434. A sphærica propemodum figura hæ testæ GLOBULI dicuntur.

§. 435. SPECIES:

1. Pellis Cameli aspera, coloris albi; vertice super concham alteram incurvato; coloris subalbidi, maculis aureis sine ordine signata. *Bonann. n.* 375.
2. Circinatus. *List. Tab.* 215. *f.* 50. Jamaic.
3. Undatus. *List. Tab.* 215. *f.* 51. Iconem vide in Tab. Nostra XII. n. 81.
4. Serratus. *List. Tab.* 216. *f.* 52.
5. Circinatus & undatus. *List. Tab.* 217. *f.* 53.

GENUS VI.

STOLA.

§. 436. Ita dicitur per similitudinem Diconcha, cujus altera valva duplici fimbria verticem alterius obvelat; medio canaliculo intercedente.

§. 437. SPECIES:

1. Spondyli *Liſteriani*, figuræ inconſtantis. *Tab.* 211. *f.* 45, 46. *Tab.* 213. *f.* 48. Figuræ exſtant in Tab. Noſtra XII. n. 82, 83, 84, 85, 86.

GENUS VII.

CONCHA ANSATA.

§. 438. Diconcha ex mediis Conchis ſeu valvis proceſſus ſtylares incurvos ad inſtar pedunculorum erigens & alterum ad latera concharum ſimilem intorquens.

Synon. Concha vertice muricatim intorto.

§. 439. SPECIES:

1. Concha exotica *Fab. Col. de Purp. Cap.* XIX.; cujus meliorem Iconismum dat. *Liſt. Tab.* 214. *f.* 49. Quem vide in Tab. Noſtra XII. n. 87, 88.

PARS TERTIA.

POLYCONCHÆ.

§. 440. Quæ pluribus quam duabus valvulis gaudent, non particulis teſtæ acceſſoriis qualibuscunque, generali nomine POLYCONCHAS appellamus.

GENUS I.

CONCHA ANATIFERA.

§. 441. Denominatio ex Fabula de Anatibus, hinc oriundis, orta. vid. *C. Bauh. P. p.* 513. *de Duret p.* 287. *Sloane It. Jam.* I. 32. II. 346. & *Introd.* II. VIII. aliosque autores.

§. 442. Eſt Polyconcha in quinque vel ſex valvulas reſolvenda, & ex lignis putrefactis plerumque pendula.

§. 443. *Synon.* Tellina pedata, *Bonanni p.* 199. Telline pedate *Imper. Ital. p.* 683. Concha pedata. *Imper. lat. p.* 901.

§. 444. SPECIES:

1. Albæ & cinereæ, *Bonann. p.* 95. *n.* 2.

2. Va-

2. Variegatæ, & ovales; *Mus. Klein.* Figuræ videantur in Tab. Nostra XII. n. 89, 90.
3. Subrotunda *Bartholini. List. Tab.* 439. *f.* 280.
4. Margine muricato, maris medit. *List. Tab.* 439. *f.* 281, 282. Figuram exhibet Tab. Nostra XII. n. 91, 92.
5. Eadem cum Tellina pedata. *Bonanni n.* 2.? *Sloane p.* 266. margine lævi, ex India. *List. Tab.* 440. *f.* 283. Icon exstat in Tab. Nostra XII. n. 93.
6. Concha κεντεόστρακος; cancellifera, anatifera *Barrelieri Tab.* 1296.
7. Concha μαλακόστρακος; cancellifera, anatifera altera *Lobel. Barrelieri ibid.*

PARS QUARTA.

NIDULI TESTACEI.

§. 445. Hoc titulo comprehendimus testacea animalium domicilia, in forma niduli sessilis utcunque rotunda, vel solitaria, vel plerumque catervatim variis corporibus marinis superstructa.

CLASSIS I.

BALANUS.

§. 446. Balani dicuntur aggregatæ illæ animalculorum domunculæ, ex plurimis laciniis testaceis, continuis, in figuram glandis quercinæ utcunque structæ, quarum basis adnascitur, vertex solus patet.

§. 447. *Synon.* Gindi Laut; Gindi Batu; *Angl.* Centersheels. *Belg.* Eckelen/ Pokken. Sin Tssip. *Rumph. p.* 122. Meereicheln; Kühschellen-förmige.

GENUS I.

MONOLOPOS.

§. 448. Balanus Monolopos est, qui ex unica lamella testacea glandiformi constare videtur.

§. 449.

§. 449. SPEC. I. Angipyle, ab ἀγγὶς, anguſtus, & πύλη; Balanus in quo os verticale anguſtatur.

1. Nolæ, ſeu Balani minores; a figura ita dictæ; Balani Gigantis *Aldrov. p.* 520. (a D. Auton. Gigas Poſſeſſore) *Jonſton. Tab.* XV. *n.* 15. *Bonanni. n.* 15.
2. Balanus majuſculus, ventricoſior, capitis apertura anguſtiore. *Liſt. Tab.* 443. *f.* 286.
3. Balanus parvus, ſtriatus. *Liſt. Tab.* 444. *f.* 287. & *de Cochl. p.* 196. Anatomen vid. apud *Leeuwenh.* & in *Liſteri Conchyl. Bivalv. Exercit.* III. *p.* 96. *ſeq.* Figuram vide in Tab. Noſtra XII. n. 94, 95.

SPEC. II. Platipyle: Balanus ore verticali diducto.

1. Barbadenſis, ſtriatus; Balanus major, latus, *Liſt. Tab.* 442. *f.* 284. Icon exſtat in Tab. Noſtra XII. n. 96.
2. Jamaicenſis. Balanus major anguſtus, purpuraſcens, capitis apertura valde patente. *Liſt. Tab.* 443. *f.* 283. Figuram exhibet Tab. Noſtra XII. n. 97.
3. Polliceps *Aldrov. p.* 274.; quod ſimilitudinem pollicum in pedibus habent, quod nomen tamen improbat. *Id. p.* 522. *Bon. n.* 14. *Jonſton. Tab.* XV. *n.* 16. vid. *Rondel. p.* 28.
4. Rubens, *Aldrov. p.* 523. *Jonſt. ib. n.* 14.

GENUS II.

POLYLOPOS.

§. 450. Balanus POLYLOPOS audit, qui ex pluribus tunicis teſtaceis conſtructus videtur. Tulpen/ Pokken/ *Belg.*

§. 451. SPECIES:

1. Tulipa *Rumphii Tab.* XLI. *lit.* A. ibi etiam animalculum extra Balanum, & intra Balanum, contractum.
2. Balænaris. Balænæ oceani ſeptentrionalis adhærens. *Liſt. Tab.* 445. *f.* 288. *Epit. Tranſ. Angl. Vol.* V. *p.* 381. *Tab.* XVII. *n.* 2. *Bocconi. Rech. & Obſerv. p.* 287. & 293. Figuram vide in Tab. Noſtra XII. n. 98.

CLAS-

CLASSIS II.

ASTROLEPAS.

§. 452. Eſt Nidulus teſtaceus, convexo-planus, verticaliter ſub figura ſtellæ patens.

§. 453. SPECIES:

1. Pediculus teſtudinarius. Kukutagruga; Schildpadt-Luys. *Rumph. p.* 122. *Tab.* XL. *lit.* K. Icon exſtat in Tab. Noſtra XII. n. 99.

CLASSIS III.

CAPITULUM.

§. 454. Eſt Teſta, quaſi folioſa, inſtar braſſicæ capitatæ, ſcopulis innaſcens.

§. 455. SPECIES:

1. Mitella; Mytterje; *Rumph. p.* 158. *Tab.* XLVII. *lit.* M. Figuram vide in Tab. Noſtra XII. n. 100.

PARS QUINTA.

ECHINUS MARINUS.

§. 456. Vide peculiarem Tractatum, cui titulus: NATURALIS DISPOSITIO ECHINODERMATUM.

PARS SEXTA.

TUBULUS MARINUS.

§. 457. Vide peculiarem Tractatum: DESCRIPTIONES TUBULORUM MARINORUM.

INDICULUS.

Tabularum LISTERI (Hiſt. Conchyl.) in Paragraphis ſecundæ hujus Operis Partis, quæ ad CONCHAS pertinet, reperiundarum; prætermiſſis figuris dubiis, ſeveriori examini relinquendis.

Siniſtra *columna Numeros Tabularum Liſteri*; Dextra *Paragraphos noſtræ Methodi indicat.*

CONCHÆ.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
141. *f.* 39.	292.
146.	374.
147. *f.* 3.	371.
148.	305.
149.	371.
150.	
151.	
152.	397.
153.	382.
154.	
155.	
156.	
159.	365.
160.	354.
163.	340.
165. 166. 167. 168. 169. 170 171. 172.	341.
173.	346.
174. 175.	341.
176. 177.	343.
178. 179. 180. 181.	341.
182.	
183.	
184. 185. 186. 187. 188. 189. 190.	341.
193. 194.	323.
197. 198.	325.
199.	321.
200. 201.	316.
202.	321.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
204. 205.	321.
206.	356.
207. 208.	356.
210.	382.
211.	437.
213.	437.
215.	435.
216. 217.	435.
219.	309.
220.	306.
221. 222.	319.
223.	319.
224. *f.* 59.	358.
225. 226.	321.
227.	319.
228.	321.
229.	367.
231 232.	367.
233. 234.	367.
235. 236.	367.
237.	367.
238.	321. & 367.
239. *f.* 73.	363.
f. 81.	364.
240. 241.	367.
242.	367.
243.	363.
245.	363.
247.	385.
248.	385.
249.	386.
250.	387.
251.	385.
252.	387.
253.	365.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
254. 255.	385.
256. 257.	385.
258.	385.
259.	387.
260.	365.
261. 262.	374.
263.	387.
264.	385.
265.	392.
266.	387.
267.	392.
268. 269.	387.
270. 271.	387.
272. 273.	387.
274.	387.
275.	364.
277.	374.
278. 279.	374.
280. *f.* 117.	374.
282.	385.
284.	324.
285. 286.	374.
287.	374.
289.	374.
290. 291.	374.
292.	374.
295.	374.
296. 297.	336.
298. 299.	336.
300.	401.
301.	396.
302.	399.
303.	393.
304.	392.
305.	385.

INDICULUS.

Tabularum *Liſteri* ad CONCHAS.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
306. - - -	392.
307. - - -	389.
308. - - -	385.
310. - - -	386.
311. - - -	376.
312. - - -	386.
313. - - -	386.
315. - - -	367.
316. 317. - -	367.
318. 319. - -	361.
320. - - -	361.
321. 322. - -	367.
323. - - -	363.
324. - - -	
325. 326. - -	363.
327. - - -	363.
328. 329. - -	367.
330. - - -	363.
331. 332. - -	367.
333. 334. - -	367.
336. - - -	378.
337. - - -	399.
338. - - -	397.
339. - - -	397.
340. - - -	386.
341. - - -	385.
342. 343. - -	367.
344. - - -	367.
346. - - -	376.
347. - - -	367.
348. - - -	386.
349. 350. - -	383.
351. 352. - -	382.
353. 354. - -	382.
355. - - -	382.
356. *f.* 193. - -	330.
194. - -	431.
195. - -	330.
357. - - -	431.
358. - - -	401.
359. *f.* 197. - -	431.
198. - -	330.
360. - - -	330.
361. - - -	334.
362. - - -	330.
363. 364. - -	330.
365. 366. - -	315.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
367. 368. - -	415.
369. - - -	415.
370. 371. - -	418.
372. 373. - -	418.
374. - - -	418.
375. - - -	397.
376. *f.* 217. - -	385.
219. - -	397.
377. - - -	368.
378. 379. - -	393.
380. - - -	393.
381. - - -	392.
382. - - -	401.
383. - - -	395.
385. - - -	385.
386. 387. - -	392.
388. - - -	392.
389. - - -	395.
390. - - -	385.
391. - - -	392.
392. 393. - -	395.
394. 395. - -	392.
396. - - -	374.
397. - - -	392.
399. 400. - -	393.
401. - - -	385.
402. - - -	393.
403. - - -	392.
404. - - -	384.
405. - - -	401.
406. 407. - -	401.
408. - - -	401.
409. 410. - -	407.
411. 412. - -	407.
413. - - -	407.
414. 415. - -	421.
416. - - -	413.
417. - - -	413.
418. - - -	421.
420. - - -	409.
421. - - -	413.
422. - - -	409.
423. 424. - -	421.
425. - - -	421.
426. - - -	413.
427. - - -	411.
428. 429. - -	413.

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
431. 432. - -	411.
433. 434. - -	411.
435. 436. - -	411.
439. - - -	444.
440. - - -	440.
442. - - -	449.
443. - - -	449.
444. - - -	449.
445. - - -	551.

Intercedit apud autorem Appendix ad Librum III. de CONCHITIS, iisve lapidibus, qui quandam ſimilitudinem cum Conchis marinis habeant.

Jam ſequuntur:

Tabb. Liſteri.	Par. Meth.
527. - - -	284.
528. *f.* 3. - -	284.
4. 5. 6. 7.	283.
529. - - -	283.
530. - - -	286.
531. - - -	286.
532. - - -	288.
533. 534. - -	288.
536. - - -	283.
537. *f.* 16-19. -	283.
20. - -	284.
538. *f.* altera.	288.
altera.	283.
539. - - -	283.
540. - - -	288.
541. - - -	283.
542. - - -	292.
543. *f.* 27. - -	292.
28. - -	284.
544. *f.* 29. - -	296.
30. - -	294.
31. - -	298.
32. - -	296.
545. *f.* 34. - -	294.
36. - -	294.
37. - -	292.
546. *f.* 38. - -	292.
39. - -	286.

NOMENCLATOR:

Quid valeant *Vocabula* non adeo trita & *Termini* in Methodo Oſtracologica paſſim obvii, per Paragraphos Partis I. & II. citati, quorum in notis plerique explicantur.

A.

Amaricinus color., quid? §. 137.
Ampullaceus. §. 177.
Anfractus v. *Spira.*
Anomia unde. §. 425.
Anthracinus color, quid? §. 59.
Apluſtra §. 387.
Arenatus conus. §. 187.
Areola. §. 235.
Aſtragaloides, quid? §. 74.
Auricula, auritus. §. 7.

B.

Bronchus. §. 327.
Bulla v. *verrucoſus* §. 7.
Burrhus color §. 237.

C.

Callum, quid? §. 90.
Caltheus color. §. 134. 237.
Canalis, canaliculus. §. 44.
Canarium. §. 146.
Cancellatus. §. 92.
Carina nautili, quid? §. 6.
Chametrachea unde? §. 381.
Clithratus. §. 92.
Clavicula v. *Columella. Scapus.*
Cochloides, quid? §. 74.
Columella. §. 31.
Coluri. §. 246.
Concharum differentia. §. 276.
Conchyliatus color, quid? §. 137.
Coracinus color. §. 137.
Cornicula radioſa. §. 23.
Corrugatus v. *rugoſus.*
Coſtæ, quid? §. 39.
Cucumis ut differat a Dactylis. §. 205.

D.

Dactylus vid. *Cucumis.*
Dentes, quid? §. 73.
Dipſaccus unde? §. 93.
Domiporta v. *Os cochlidum.*
Dorſum. §. 6.

E.

Echinophora ſeu echinata. §. 245.
Echinoſus, quid? §. 74.
Enarthroſis. §. 370.

F.

Faſciæ, quid? §. 9.
Feneſtratus. §. 66.
Fibularis. §. 17.
Fimbria. §. 18. 231. v. *Labium.*
Flav-oſculum. §. 47.
Flexuoſus §. 42. v. *Hiulcus. Undatus.*
Fulvus color. §. 187.
Furvus color. §. 187.

G.

Ginglymus, quid? §. 319.
Glottoides. §. 309.
Gothica. §. 39.
Guttæ. §. 65.
Gyri v. *Spira.*

He-

H.

Helices v. *Spira.*
Helix acuta, quid? §. 74.
Heluaceus color, quid? §. 167.
Helvolus v. *Heluaceus.*
Helvus color. §. 232.
Hiulcus. §. 7.

I.

Imbrices. §. 39.
Isopleuron. §. 191.
Issopalessu, quid? §. 59.

L.

Labium. §. 13.
Læve. §. 17.
Lagena quo differat ab urceo. §. 140.
Lentiginosus. §. 190.
Leucophæus color. §. 23.
Limbus. §. 12.
Loricatus. §. 76.
Lunaris. §. 192.
Lussapinjos, unde? §. 73.

M.

Mæandrinus color, quid? §. 187.
Margo. §. 10.
Mazza unde? §. 176.
Metastomus §. 39.
Monodon §. 31.
Monotis, quid? §. 341.
Mons pessulanus quid. §. 65.
Mucro. §. 42.
Murices. §. 22.
Mustelinus color. §. 101.

N.

Nebulatus, §. 126.
Nodosus. §. 138.
Nubeculosus v. *Nebulatus.*

O.

Oculatus. §. 127.
Oleacinus color, quid? §. 138.
Olearia. §. 112.
Os cochlidum vel Domiporta, quid? §. 5.
– integrum. §. 10.
Ostrinus color. §. 98.

P.

Pastinaca, quid? §. 73.
Pennatus. §. 39.
Petasunculus. §. 401.
Pentazonos. §. 70.
Phrygium opus. §. 107.
Plicæ. §. 26.
Plumosus. v. *Pennatus.*
Poeforontana. §. 39.
Pterigoides. §. 304.
Pullus color. §. 17.
Pulvinatus. §. 86.
Puniceus color. §. 21.
Pustulæ §. 7. v. *verrucosus.*
Pyriformis. §. 187.

R.

Ravidus color. §. 187.
Ravus color. §. 237.
Rugosus. §. 96.

S.

Salpinx unde. §. 129.
Sandychinus color, quid? §. 330.
Scapus. §. 103. v. *Columella.*
Semilunatus v. *Lunaris.*
Serpentaria. §. 39.
Sinuosus. v. *Virga.*
Spira. §. 48.
Spondylus. §. 321.
Striges. Strigiles. §. 73.
Subucula. §. 226.
Subvulterinus. color. §. 393.
Sulcatus. Sulcus. §. 7.

T.

Terreus color, quid? §. 23.
Teſſellatus. §. 34.
Thalamus. §. 5.
Phalaſſicus color. §. 330.
Toroſus, quid? §. 74.
Torus. §. 74.
Tragus. §. 156.
Tranſillæ teſtarum. §. 181.
Tribulus. §. 46.
Trochiloſus, quid? §. 74.
Tubulus v. *Canalis.*
Turbo, quid nobis? §. 135.
Tympanoſus, quid? §. 113.

U. V.

Variolæ. v. *Puſtulæ. Verrucoſus.*
Verrucoſus. §. 7.
Vertex. §. 90.
Virga. §. 65.
Vitta. §. 54. 137.
Umbilicus teſtarum. §. 6.
Umbo. §. 321.
Undatus. §. 39. 42.
Undoſus. Undulatus v. *Undatus & Fluctus.*
Volſella teſtarum. §. 413.
Urceus. vid. *Lagena.*

X.

Xyhelix, quid? §. 74.

Z.

Zezypha. §. 78.
Zonæ. §. 8. v. *Faſciæ.*

INDEX RERUM

præ cæteris memorabilium.

A.

Actionobolus. §. 375. 376.
Acus sartoria. §. 73.
Admirales. §. 187. 188.
—— vicarii. *ib.*
Æthiops. §. 175.
Æthiopissa. v. *Mamma.*
Ajax. §. 134.
Alata. 249.
—— lata. 260. 261.
Albula. §. 59.
Amarula. 92.
Amusium. 342. *spec.* 344. v. *Pseudamussium.*
Anas. 81. 82.
Angystoma. 28. *sp.* 29. 30.
Anomalocardia. 366. *sp.* 367. 368.
Anserinus pes. 83. 84.
Aporrhais. 213. 214.
———— an Cassis cornuta? 239.
———— — Aldrov. 255.
Arca Noæ. 415.
Areola. 235.
Argo-buccinum. 127. 128.
Argus (porcellana) 229.
Arundo palustris. 100.
Aselli. 230.
Asio. v. *Noctua.*
Astro lepas. 452. 453.
Avicula. 304. *spec.* 306.
Auricula. 156. 157.
Auris. 49. *spec.* 51. 52.
—— Lunæ. 39.
—— Marina. 49.
—— Midæ. 95. 96.

B.

Balanus. §. 446.
—— Bellonii. 415.
Balanus Bellonii. *spec.* 449.
—— Polyceps. 449.
—— Polylopos. 450. 451.
Bdellion. §. 273.
Belliculus. 231.
Bezoar ferum. 239.
Blatta byzantina. 274.
Borongan. 73.
Brandaris. 264.
Bruinetta. 187.
Bucardia. 364.
—— Dalmatica. 364.
Buccinum. 122.
Buccini characteres. 123.
Buccinum barbadense. 70.
—— bilingue canadense. 152.
—— foliosum. 130.
—— lacerum. 131. 132.
—— lapideum. 134.
—— muricatum. 133. 134.
—— persicum. 219.
—— scalare. 149.
—— Tritonis. 124. *spec.* 126.
—— variegatum. 134.
—— undatum. 132.
Bullæ. 221. 222.
Bursa mauritana. 167.

C.

Calyptræ. 290. *spec.* 292.
Camadia de luna. 364.
Canarium (Canaris) 139. & 146.
Canrena lima. 39.
Cappa sancta. 340.
Capitulum. 454. 455.
Capucini. 187.
Caput bonæ spei. §. 230.
—— Serpentum. 232.
Carcer. 261.
Cardissa. 361.

Car-

INDEX RERUM.

Carduus. 130.
Carneola. 229.
Caſſis. 234. *ſpec.* 235–239.
—— bicornis. 244. 245.
—— cornuta. 239.
Caſuarii ovum. v. *Ovum.*
Catinus lactis. 53.
Cauris. 229.
Cedo nulli. 187.
Cercopithecus. 145.
Cereola. 187.
Chama. 379.
—— anglicana. 387.
—— clathrata. 386.
—— decumana. 382.
—— lævis. 387.
—— literata. 385.
—— littoralis. 382.
—— lutaria. 387.
—— nigra. 413.
—— optica. 385–387.
—— ſtriata. 386.
—— triquetra. 385.
—— virgata. 387.
Chamæ-pholas. 413.
Chamelea. 384. *ſpec.* 385–387.
Chametrachea. 380. *ſpec.* 382. 383.
Cidaris. 56. *ſpec.* 57.
Cippus viarum. 74.
Cithara. 246. *ſpec.* 248.
Clava. 74.
Cochlea. §. 102.
—— cælata. 106. *ſpec.* 108.
—— lunaris. 103. *ſpec.* 105.
—— petholata. 109. *ſpec.* 111.
—— Pharaonis. vid. *Pharaonis Cochlea.*
—— umbilicata. 6. 9.
Cochlearia. 293. 294.
Cochlis; differentia a *Cochlea.* §. 1.
—— compoſita. 168.
—— elliptica. 48.
—— fornicata. 32.
—— plana. 4.
Cochlis roſtrata. 169.
—— ſimplex. 3.
—— a *turbine* differt. 2.
Cochlo-lepas. 297. 298.
Columba. 139.
Concha, quid? 275.
—— adunca. 430. 431.
—— anatifera. 441. 442.
—— anomia. 425.
—— anſata. 438. 439.
—— corallina. 363. 431.
—— eboracenſis. 419.
—— gaditana. 363.
—— globoſa. 365.
—— labiata. 367.
—— lævis *Rondel.* 413.
—— longa *Rondel.*
uniforis. 412. 413.
biforis. 408. 409.
—— natatilis. 215. 216.
—— nautiloides altera *Fab. Col.* 218.
—— perſica. 219.
—— polileptoginglyma. 367.
—— rhomboides. 367.
—— trilobos. 428. 429. vid. *Diconcha.*
—— venereæ. 228. & 263.
Conchylium *Aldrov.* 142.
—— *Rondel.* 209. 210.
Cono-cochlis. 62.
Conus. 185. *ſpec.* 187. 188.
Cophino-ſalpinx. 129. 130.
Corallium. 196.
Corculum pellucidum. 464.
Cornu Hammonis. §. 10.
—— —— legitimum. 11.
—— —— ſpurium. 12.
—— —— *Planci.* 12.
Coccyx. 74.
Cricomphalos. 373. 374.
Cricoſtoma. 33. *ſpec.* 34–37.
Crumena gallorum. 141. & 236.
Cruſtula oleaginea. 134.
Ctenoides. 347. 348.

Cucumis. 205. 206.
Cyclas. 335. 336.
Cymbium. 217. 218.

D.

Dactylus. 203. 204.
—— Pholadum. 411.
Diconcha æqualis. 299–301.
—— aurita. 337.
—— connivens. 302.
—— cordiformis. 359.
—— figurata. 303.
—— inæqualis. 424.
—— interrupta. 369.
—— ſinu profundo. 379.
—— —— prominulo. 390.
—— ſulcata. 370. 371.
—— umbilicata. 372.
Digitellus. 196.
Dipſaccus. 93. 94.
Ditrochus. 193. 194.
Doliolum *Liſteri*. 137.
Dontoſtoma. 41. *ſpec.* 42. 43.
Dracæna. 232.

E.

Echinophora *Aldrov.* 167.
—— eſculenta, *Bonanni.* 138.
Ephippium. 321.
Epidromus. 151. 152.

F.

Faſcis. §. 73.
Ficus. 207. 208.
Folium conglomeratum. 100. 101.
Fornax. 116.
—— argentea. 117.
—— candens. ibid.
Fragum. 361. 363.
—— abſciſſum. 367.
Franciſcani. 204.
Fuſus. 174. 175.

G.

Gaideropoda. 327.
Galea. 166. 167.
Gallinula. 164. 165.
Garagoi. 162. 163. 261.
Gladius. 172. 173.
Glaucodorſum. 231.
Globuli. 230.
Globus. 434. 435.
Glycimeris, *genus*. 420. 422.
—— 385. 387.
Gutta cærulea. 204.
Gutturnium. 144. 145.

H.

Hamus. 67. 68.
Harpago. 252. 253.
Hauſtellum. 180. 181.
Hector. 134.
Hemicardia. 360. 361.
Heptadactylus. 254. 255.
Heteroſtrophus. 89.
Honka Indorum. 134.

I.

Infundibulum. 73.
Iſabella. 229.
Iſocardia. 362. *ſpec.* 363–365.
Iſognomon. 310. 311.

K.

Kameelatje. 204.
Kühſchellen. 447.

L.

Labio. 65.
Lagena. 140. 141.
Lentigo. 258. 259.
Leo. 187.
Leonis labrum. 66.

Lepas. §. 281.
—— maxima. 288.
Lima. 73.
Lingua tygerina. 385.
Lucifer. 192.
Luhuana. 187.
Luna. 24.

M.

Mactra. 422. 423.
Mamma. 58. *ſpec.* 59.
—— æthiopiſſa. 59.
—— albula. *ib.*
—— cingaris. *ib.*
—— globoſa. *ib.*
—— maculata. *ib.*
—— variolata. *ib.*
—— verrucoſa. *ib.*
—— vetula. *ib.*
—— virginea. *ib.*
Mangiorum ſtrombus. 87.
Mater perlarum. 317. *ſpec.* 319.
—— —— ſpuria. 325.
Mazza. 167. 177.
Meta butyri. 187.
—— —— boeroenſis. *ib.*
Micæ. 204.
Millepes. 256. 257.
Mitra Epiſcopi. 92.
—— papalis. 92.
—— polonica. 231.
—— hungarica. 295. 296.
Monoconcha. 278.
—— anſata. 289.
Monodactylus. 250. 251.
Murex. 262.
—— coſtoſus. 265. 266.
—— frondoſus. 263. 264.
Muſculus. 328.
—— acutus. 329. 330.
—— latus. 331. 332.
—— mammarius. 333. 334.
—— polyleptoginglymus. 414. 415.
Muſica gallorum. 198.
Muſica ruſticorum.
Muſicum thema. 197. 198.
Mytulo-pectunculus. 357. 358.

N.

Naſſa. 97. 98.
Nauplius, *Athenæi.* 7.
Nautes, *Suidæ.* 7.
Nautilus. 5. *ſpec.* 6. 7.
Nerita. 16. *ſpec.* 17. 18.
Neritoides. *Fab. Col.* 137.
Neritoſtoma. 158. 159.
Niduli teſtacei. 445.
Noctua. 79. 80.
Nubecula. 201. 202.
Nuſſatellana. 187.
Nux piloſa Tarentinorum. 363.
— *Jonii.* 374.

O.

Olearia. 112. 113.
Oliva. 223. 224.
Omphaloclathrum. 377. 378.
Onyx. 273. 274.
Opercula cochlidum. 267. *ſeqq.*
—— callorum. 270. 271.
Orthoceras. 73.
Oryzæ granum. 74.
Oſtracion, *Plinii.* 273.
Oſtreum. 314.
—— arboreum. 327.
—— cebebaſtanum. 321.
—— craticum. 325.
—— echinatum. 327.
—— electrinum. 321.
—— imbricatum. 322. 323.
—— læve. 320. 321.
—— lignorum. 316.
—— longum. 315. 316.
—— muricatum. 326. 327.
—— plicatum. 324. 325.
—— radicum. 316.
—— virginianum. *ibid.*

Ovum Caſuarii. 229.
——— polypi, *græcorum*. §. 7.
——— *Rumphii*. 233.
Oxy-ſtrombus. 85. *ſpec*. 86. 87.

P.

Palladium. 341.
Pallium variegatum. *ib*.
Parallelopipedum. 312. 313.
Pardus. 187.
Patella. 280.
——— integra. 282. *ſpec*. 283-286.
——— fera. 50.
——— lacera. 287. 288.
——— major *Bellon*. 50.
——— ——— *Rumph*. 285.
——— lævis. 294.
Pecten. 338. *ſpec*. 340. 341.
——— corallinus. 341.
——— polyzonus. *ib*.
——— tenuis. *ib*.
——— virgineus. 367.
——— vulgaris. 341.
Pectunculus. 363. 367.
Pediculus. 230.
Pentadactylus. 44. *ſpec*. 45.
——— *Bellon*. 253.
Perizonias. 175.
Perlæ. 230.
Perna. 418.
Pes equinus. 383.
Petaſunculus. 401.
Pharaonis cochlea *Bon*. 66.
Pholas. 410. 411.
——— arenæ. 411.
——— corallorum. *ib*.
——— lignorum. *ib*.
——— ſaxorum. *ib*.
Pila. 225. 226.
Pinna. 416. *ſpec*. 418.
Pinnophylax. 418.
Platiſtoma. 38. *ſpec*. 39. 40.
Podagra. 255.
Polyconchæ. 440
Polylobos. vid. *Balanus*.
Polylopus. vid. *Balanus*.
Polypi ovum. vid. *Ovum*.
Pomatia. 167.
Porcellana. 227. *ſpec*. 229-233.
——— montoſa. 230.
——— nuſſatellana. 230.
——— ſalita. 230-232.
——— teſtudinaria. 229.
——— thoracica. 230. 232.
Pſeudamuſium. 345. 346.
Pſeudo-ſtrombus. 91. 92.
Pſeudo-trochus. 69. 70.
Pugiles. 251.
Purpura. 175.
——— a dextra ad ſiniſtram torta. 177.
——— aculeata (ſconciglio) 183.
——— Jonſtoni. 181.
——— marmorea. 192.
——— neapolitana. *ib*.
——— tarentina. 245.
Pyloris. 403. 404.
Pyrum ſiccum. 266.
——— pictum. 367.

Q.

Quadrans. 388. 389.

R.

Radix Bryoniæ. 211. 212.
Radula. 349. 350.
Ranula. 145.
Rapa. 178. 179.
Rhombus *Liſteri*. 348.

S.

Saccus. 120. 121.
Salpinx, *Fab. Col*. 74.
Sarſaniello. 306.
Scala. 148. *ſpec*. 150.
Scapha. 60. 61.
Scorpius. 264.

Semi-Caſſis. 240. *ſpec.* 241–243.
Semicornu. 13. 14.
Seminautilus. 8. 9.
Sepultura. 204.
Serpentulus. 19. *ſpec.* 20. 21.
Simpulum. 142. 143.
Sipho. 153. *ſpec.* 154. 155.
Siphunculus. 73.
Sol. 22.
Solis eclipſis. 23.
Solen bivalvis. 405. *ſpec.* 407.
Spectrorum voluta. 187.
Spondylus. 355. 356.
—— variegatus. 382.
Stella. 26.
Stola. 436. 437.
Strombus. 71. *ſpec.* 73. 74.
Struthio camelus. 92.

T.

Tabula Geographica. §. 202.
Talpa. 229.
Teleſcopium. 73.
Tellina. 390.
—— circinata. 391. *ſpec.* 392. 393.
—— granulata. 398. 399.
—— lævis. 400. 401.
—— literata. 393.
—— muricata. 402.
—— Neapolitana. 393.
—— Pedata. 443.
—— ſtriata. 396. 397.
—— violacea. 393.
—— virgata. 394. 395.
—— virginiana. 392.
—— xulanenſis. 393. 401.
Terebellum. 99. *ſpec.* 101.
Terebratula. 426. 427.
Teſtudo. 231.
Thema muſicum. 197. 198.
Tigris. 114. 115. 232.
Toroceras. 73.
Tribulus. 46. 47.
—— roſtratus. 182. 183.
Triquetra. 353. 354.
Trochulus planus. 17.
Trocho-Cochlea. 118. 119.
Trocho-Conus. 189. *ſpec.* 190–192.
Trochus. 63. *ſpec.* 65. 66.
—— roſtratus. 170. 171.
Tuba pſionurgica. 88. *ſpec.* 89. 90.
Tudes polonica. 307. *ſpec.* 309.
Tulipa *Rumphii.* 451.
—— Gallorum. 202.
Turbo. 135.
—— lunaris. 160. 161.
Turricula. 195. 196.
Turris babylonica. 175.
Tympanotonos. 75. 76.

U. V.

Variola. 229.
Venter felis. 230.
Vertagus. 77. 78.
Veſpertilio. 199. 200.
Vetula *Tulpii.* 159.
Vexillum aurantium. 165.
Vitellum. 39.
Vitta. 54. *ſpec.* 55.
Umbilicus marinus. 267. *ſpec.* 269.
Unguis, ſolen, 406.
—— odoratus. 272. *ſpec.* 274.
Vola. 351. 352.
Volſella. 413.
Voluta longa. 184.
—— maculoſa. 187.
—— muſicalis. *ib.*
—— ovata. 220.
—— pennata. 187.
—— ſpectrorum. *ib.*
—— tygerina. 188.
Urceus. 136. *ſpec.* 137–139.
Urſulæ. 230.
Vulvaria. 389.

Z.

Zimbo. §. 204.

INDEX RERUM POLYGLOTTUS

Secundum Methodi Oſtracologicæ Paragraphos concinnatus.

A.

A. B. C. Boekje. - - §. 187
Aardbei-doublet (roode en witte) 361
- - - - - witte of geele - 363
Achaate Bakje. - - - - - - 222
- - - Hoorn (gebande) - - 143
- - - Kliphoorn (ſchoon gewolkte) - - - - - - - - 230
- - - - - - - wit geplekte. 231
- - - Kroonbak. - - - - 201
- - - Stamper. - - - - 187
- - - Toot. - - - - - ibid.
- - - - - - geſtreepte. - - ibid.
Adfaro Tibi *Arabice*. - - - - 273
Admiraal. - - - - - - - 187
- - - Opper - - - - - 188
- - - Orange - - - - - 187
- - - Wit - - - - - - - ibid.
- - - Weſt-indiſche of van Onna. - - - - - - - - ibid.
Aerd-Moſſels. - - - - - 411
Ajuin-ſchil. - - - - - - 167
- - - - - gebande. - - - ibid.
Alibo. - - - - - - - 382
Alpkruik. - - - - - 38. 105
- - - - - gekorrelde. - - - 39
- - - - - zwartgevorende. - - ibid.
Amaralia. - - - - - - 92
Ambelau. - - - - - - 273
American-Admiral. - - - 187
Amuretjes. - - - - - 247
Arabiſche Letterhoorn. - - 230
Aracans Garen. - - - - - 187
Argus. - - - - - - - 299
- - - dubbelde - - - ibid.
Argus (gebande) - - - - 128
- - - - kleine - - - - 229
Ark (Noachs) - - - - - 415
- - - - - - - baſtaard - - 367
- - - - - - - kromme - - 312
Aſſuſeng Batu. - - - - 411
- - - Bebec. - - - - ibid.
- - - Paſſir. - - - - ibid.

B.

Baardkrapper. - - - - 413
Baardmannetje. - - - - 37
Baartzange. - - - - - 413
Babyloniſche Toren. - - - 175
Back-Troch. - - - - - 422
Bagynedzellen. - - - - 64
Bakken. - - - - - - 186
- - - Achaate - - - 222
- - - gekroonde - - 219
Bal-Schnecke. - - - - 167
Banda Burshell. - - - - 192
Bandhoorn. - - - - - 87
Bandpen. - - - - - - 196
Banquet Hammetje. - - 401
Baſtart Bapſt-Krohn. - - 73
Beckel-hauben. - - - - 234
Beddeken. - - - - - 235
Beddetelk (dubbelde getakte of gehoornde) - - - - 243
- - - - geknobbelde - - 138
- - - - getakte baſtaards - ibid.
- - - - gladde - - - ibid.
Beertjes. - - - - - 230
Belhoorn. - - - - - 167

Welhoorn (Fransche) - - 137
- - - - gehobbelde - - 242
Welsiak. - - - - 14
Wernsteen-Oestertje. - - 321
Wezaantje. - - - - 165
- - - - kleine - - - ibid.
Wezoar-hoorn. - - - 241
- - - dwarg gestreepte - 237
- - - gemeene - - - 235
- - - geribde of gevorende 237
- - - gestreepte - - - 235
- - - groote geblaäte - - 237
- - - wilde - - - 239
Bia Anadara. - - - 367
- - Baguala. - - - 387
- - Bantal. - - - 187
- - Basaghi. - - - 247
- - Batu. - - - 397. 422
- - Bawang. - - - 235
- - Bidji gnemon. - - 196
- - Bilalo. - - - 228
- - Bocassan. - - - 397. 401
- - Buduri. - - - - 199
- - Butu. - - - - 406
- - Cabesette. - - - 239
- - - - - Kitzjil. - - 235
- - Cadock. - - - 387
- - Catsjo. - - - 413
- - Cattam. - - - 254
- - Corourong. - - - 383
- - Coyn. - - - - 6
- - Cucuran. - - - 363
- - Cucussan. - - - 64
- - Culi Bawang. - - - 167
- - Dading. - - - 229
- - Duri Lemon. - - - 183
- - Garu. - - - 382
- - Hari. - - - 361
- - Kolkoe. - - - 406
- - Krang. - - - 72
- - Kris. - - - - 308
- - Letter. - - - 387. 393
- - Lida. - - - 402
- - Liling. - - - 187
Bia Malum. - - - 394
- - Mantsjado. - - - 417
- - Matta Doa. - - - 385
- - - - Hari. - - - 395
- - Morsego. - - - 199
- - Papeda. - - - 6
- - Papua. - - - 264
- - Papuwa. - - - 192
- - Passir. - - - 397
- - Pethola. - - - 110
- - Sabander. - - - 341
- - Sabla. - - - 281
- - Sacatsjo. - - - 50
- - Sarassa. - - - 247
- - - - Kitsjil. - - 39
- - Saron. - - - 406
- - Sempe. - - - 219
- - Sibor. - - - 181
- - Sileos. - - - 367
- - Sissia. - - - 183. 341
- - Taylala. - - - 258
- - Tenember. - - - 387
- - Terbang. - - - 341
- - Totombo. - - - 235
- - Trompetta. - - - 195
- - Tsintsjing. - - - 186. 188
- - Tsjoeppo. - - - 327
- - Unam. - - - 264
Billetjes. - - - 367
Binkrang. - - - 72
Birn-feigen-artig. - - 187
Bisschops Mytet. - - 92
Blaasjes. - - - 221
Bladhoorntje. - - - 138
Blas-posaunen-horner. - - 125
Blastol, Blastor. - - - 401
Blatta Byzantina. - - - 274
Blaauwbuyken. - - - 204
Blaauwurug. - - - 231
Boeren Muspk. v. Muspk.
Bonte mantel. - - - 339
- - - kleine of gewoonte - 341
- - - Westindische of bastaard ibid.
Boor (Terebellum) - - - 100

Boor

Boor (geſtippelde) - - 101
- - geblaande - - - ibid.
- - witte - - - ibid.
Bootshaak. - - - - - 252
- - - - Mannetjen. - - 253
- - - - Wyfjen. - - ibid.
Bornſtein-Augſter. - - - 321
Borongan. - - - 73
Boterweg. - - - 187
- - - - aſchgraauw Boerog. ibid.
Bouteille. - - - 140
Bozios. - - - - 196
Brandaris. - - - - 264
- - - - dubbelde - - ibid.
Brandhoornje. - - - 264
- - - - dubbelde - - ibid.
Brandblaſje. - - - 232
Breedlip. - - - - 261
Brigigoins. - - - 363
Bruinetroet. - - - 187
Buisje. - - - - 241
Bulje. - - - - 165

C.

Caap. - - - - 230
- - - valſche - - - 229
Cacura mera. - - - 363
Caffa Veneta. - - - 341
Cameelhoorn (gemarmerde) - 187
Camelotje. - - - - 39
Canarp (breede) - - - 165
- - - gebande - - - 138
- - - gebloemde - - ibid.
- - - gebulte - - - ibid.
- - - Loehoreneeſche - - 187
Canna lichio. - - - 406
Cappa Sanctæ. - - - 340
Caſuaris Ey. - - - 229
Cauris. - - - - ibid.
- - - blaauwe - - - 230
- - - gemeene geele - - 232
- - - ſchlechte-blaue - - 230
Centersheels. - - - - 447
Ceramſche baſtaard Marbrium. 73
Chama. - - - - - 384
Χαιρον. - - - - 228
Chyſant. - - - - 247
- - - bonte - - - - 248
- - - graauwe - - ibid.
- - - kleine - - - ibid.
- - - roozenroode - - ibid.
- - - witte - - - ibid.
Concha Molæna. - - 387
Compas-ſchulp. - - 343
Coquilje. - - - - 6
Couteaux. - - - - 406
Couteliers. - - - ibid.
Cozze. - - - - 397
Culit Bawang. - - - 167
Cylinders. - - - 208
Cyperſche Katje. - - 187

D.

Dadel (Achaate) - - 204
- - - Brazilſche - - ibid.
- - - gemeene gemarmerde ibid.
- - - lange dunne zeldzaame ibid.
- - - Porphyrſteene - - ibid.
- - - witte - - - ibid.
- - - zwarte - - ibid.
Dail Cuillier. - - - 419
Datteci. - - - - 305
Dattlen. - - - 203
Delzel van 't Reuzen-oor. - 269
Diarong. - - - - 73
Diklip. - - - - 65
Diſſelhoorntje. - - - 139
Doekehuif. - - - - 7
Dolfyntje. - - - - 87
Dooskens-Slek (groote) - - 235
- - - - - kleine - - ibid.
Doublet (gehoorde) - - 376
- - - geſchobde - - ibid.

Doublet (Soot) - - 406
- - - Ham - - - 417
- - - Kam - - - 376
- - - Kruis - - - 308
- - - Lip - - - 385
- - - Maan - - - 343
- - - Nagel - - 363. 382
- - - Perspectif - - 383
- - - Rasp - - - 349
- - - Roos - - - 401
- - - Rots - - - 327
- - - Schalpen - - 299
- - - Segreine. - - 399
- - - Speel - - 387
- - - Steek - - 417
- - - Strik - - 385. 393
- - - Venus - - 363. 389
Dossen (geribde) - - - 39
- - - gespikkelde - - ibid.
- - - leggende / gedrukte / platte ibid.
- - - zwarte geribde - - ibid.
Draakenhoofdje. - - 232
Drap d'Argent. - - 210
Duifje. - - - - 165
- - - kleine - - - ibid.
Duikelsklaauw. - - - 252
Duizendbeen. - - - 256

E.

Eikelen. - - - 447
Eendebek. - - - 413
Eendemossel. - - - 411
Eikenhouts-toast. - - 187
- - - - - - met banden - ibid.
Eseltjes. - - - 230
Ey. - - - - 233
- - Casuaris - - - 229
- - Kivits - - - 167. 222

F.

Fairwing. - - - 247
Feige (Spansche) - - - 207
Fischer-weiber-hauben. - - 291
Fransche Hoorn. - - - 192

G.

Gapers. - - - - 380. 384
- - - - eenwigdraarende - 413
- - - - gladde - - 387
Garagoi. - - - 162. 261
Garneelen. - - - 229
Gebreide hoorn - - - 239
Geelmond (kleine) - - 47
Gevleugelde hoorn - - 249
Gindi Batu. - - - 447
- - Laut - - - - ibid.
Glimmertje (groote) - - 204
- - - - kleine - - ibid.
Gold-mund. - - - 117
Gootdoublet. - - - 406
Goudlakense. - - - 187
Goudmond. - - - 117
Graauwe Mammiken. - 187. 204
Grau Munchen. - - - 187
Groene Kaas. - - ibid.
Guineesche Soot. - - ibid.

H.

Ham - - - - 363
- - - doublet. - - - 417
Hammetje (banquet) - - 401
Hamer (Poolsche) - - 308
Hanekam (getalte) - - 325
- - - - kleine - - ibid.
Harpen. - - - 247

INDEX RERUM POLYGLOTTUS.

Harpen (edele) - - 248
Hartehoozntje. - - 183
Hartshoozn. - - - 188
- - - - - met banden. - ibid.
Haspel. - - - 312
Haube (Fischer-weiber) - - 291
- - Hollandsche - - - 7
Hicle. - - - 273
Hoch-rukken. - - - 230
Hoenderveder. - - - 187
Holster Schulp. - - 417
Holtz Schraube. - - - 74
Hondsoog. - - - 319
Hoogruggen. - - - 230
Hoogstaart. - - - 145
Hoozndak Stampers. - - 197
Hua Ily. - - - 413
Huilly. - - - ibid.
Hubussata. - - - 239
Huri Hulilu. - - - 228

I.

Jacobs Schulpen. - - 339
- - - - - - gemeene - 341
Jamboesen. - - - 230
Japansche Matje. - - 393
- - - - Speeldoublet - 387
Ihul. - - - 411
Indian Patridge Shell. - - 167
Jokje. - - - 233
- - bastaard - - 230
Isabelle. - - - 229
Illo paleffu. - - - 59

K.

Kaas (groene) - - 187
Kakkerlak. - - - 230
Kakol. - - - 167
Kamdoublet. - - - 376
Kamelotje. - - - - 204
Kammetje (Neeten) - - 183
Kamschulp. - - - - 341
Kanarp. v. *Canary*.
Kappya. - - - 399
Karethoozn. - - - 229
Kaskletten. - - - 234
- - - - dooznachtige - 262
- - - - geribde - - 236
- - - - getakte - 262. 264
- - - - geblamde - - 236
- - - - graauwe - - 235
Kasket Schell (red) - - 239
Katje (Cyperfche) - - 187
- - gegranuleerde - - ibid.
- - gepleite - - ibid.
Katshoppen. - - - 411
Katte-tonge - - - 399
Keerzje. - - - 187
Kemphaantje. - - 251
Keulpfozze. - - - 145
Kikalapia. - - - 6
Kika Waroutia. - - - 7
Kima. - - - 382
- - Omin. - - 417
- - Tahuri. - - 125
Kikhozsch. - - 145. 258
Kinkhoozn. - - - 125
- - - - geknobbelde - 134
- - - - rood geknobbelde - ibid.
Kivits-Ey. - - 167. 222
Kliphoozns. - - - 228
- - - Achaate schoongewolkte 230
- - - bergachtige - - ibid.
- - - Cartageensche - - ibid.
- - - groote gemeene - ibid.
- - - Mosambiekfche - 232
Klipkleevers. - - - 278
Klipkouffen. - - - 228. 382
- - - - vleeschverwige - 229
Knobbelhoozn. - - - 105
- - - - - bonte - - ibid.
- - - - - gebande - - 175
- - - - - groene - - 105

Knobbelpen. - - - 80
Knol. - - - - 178
Knolbel - - - ibid.
Knolhoozn. - - - ibid.
Knopjes (gladde) - - 230
- - - hozrelige - - ibid.
Knotvinger. - - - 255
Koejenoog. - - - 167
Kofferhoozntje (gzoote) - - 235
- - - - - - kleine - - ibid.
Koningshoozn. - - - 219
Koningsmantel. - - - 341
Koraaldoublet. - - - ibid.
Kozhoen. - - - 187
Kornzange. - - - 413
Krabben. - - - 249
- - - gebuchelde - - 255
- - - geele (wpfje) - - ibid.
- - - gepiekte of gebulte - ibid.
- - - vpf-vinger - - 252
- - - Zonnestraal - - 256
Krang Boekoe. - - - 239
- - Modang. - - - 6
- - Seroney. - - - 125
- - Siffi. - - - 406
Kranglanke. - - - 186
Krangfuffu. - - - 59
Kris (Indiaanfche) - - 308
Kroonbak (Achaate) - - 201
Kroonhoozn. - - 188. 219
Kroontepelbak. - - - 219
- - - - - gebandeerde - ibid.
Kruisdoublet. - - - 308
Krulhoozn. - - - 264
Kuhfchellen-formige. - - 447
Kuipers hooz (ruige of gegzanuleerde) - - - - 187
Kukutagruga. - - - 453

L.

Laccanuga. - - - 273
Lagnia Matta. - - - ibid.
Laholun, Lahorum. - - 92
Lambroas. - - - 281
Lampet. - - - ibid.
Lampje. - - - ibid.
Languetti. - - - 406
Laphoozns. - - - 249
- - - geknobbelde - - 251
- - - getakte of gekroonde 261
- - - gzoote - - ibid.
- - - Lapfche gepiekte - 165
- - - Weftindifche - ibid.
Lapido. - - - 281
Laurierblad. - - - 325
Laynoa. - - - 264
Lazarus-klap. - - - 327
- - - - - bloedroode - ibid.
- - - - - gzaauwe met roode vlammen - ibid.
- - - - - Orange - ibid.
Leeuwtoot (klimmende) - 187
Lepas. - - - 281
Lepi. - - - 273
Lequeos. - - - 125
Letterhoozn. - - - 187
- - - - Arabifche - - 230
Letterfchulp. - - - 393
- - - - ronde - - 385
Likhoozntjes. - - - 228
Limoendoozn. - - - 183
Lipdoublet. - - - 385
Luikieuw. - - - 125
Lobbetje. - - - 37
Loehoeneefche hoozn. - - 187
Lopas. - - - 281
Luis. - - - 230
- - Schildpadt - - 453
Luit. - - - 207
Lulat. - - - 411

M.

Maandoublet. - - 343
Maanhoozn. - - - 38

Maanhoorn met zwarte en witte blekken - - 39
- - - - oprechte - - ibid.
- - - - zwarte geribde - ibid.
- - - - zwartgevorende of kleine met het mannetje. 59
Maans-oogen. - - 104. 268
- - - - - groote - - 105
Maëka. - - - - 382
Maloli-oor. - - - - 51
Maloesche hoorn. - - 137
Maniwo. - - - - 382
Marbled Achat Stamper. - - 187
Marlpziem (Ceramsche bastaard) 73
- - - - pvoore - - ibid.
Marmerhoorn. - - 188
Matje (Japansche) - - 393
Matroozen Mutzen. - - 291
Matta Bulan. - - - 268
- - Bulanbesaar. - - 105
Mattalemboe. - - - ibid.
Meereicheln. - - - 447
Meerkatte. - - - 145
Meerkopsse. - - - 64
Meernuß. - - - 363
Meer-ohr. - - - 50
Melknapje. - - - 53
Wenniste Toot. - - 187
Merendreck. - - - 11
Meshamer. - - - 308
Midas-oor. - - - 96
Milch-napf. - - - 53
Miter-shell (rivier) - - 92
Moerbey (groote getakte) - 47
- - - - kleine getakte - ibid.
Mol. - - - 229
Mooz. - - - 175
Morabo. - - - 382
Mozgenstar. - - - 192
Mother of Pearl. - - 50
Muggescheetje. - - 187
Munkpzers. - - - 264
Munniken (graauwe) - 187. 204
Musphhoorn. - - 187. 198
Musphhoorn (Boeren.) - 187
- - - - - - wilde - 198. 199
Mpter (Bisschops) - - 92
Mptertje. - - - 455

N.

Naalden. - - - 72
- - - - fyne - - 73
- - - - gegranuleerde - ibid.
- - - - graauwachtige - ibid.
- - - - rosse met witte dwppels of zoutkorls - 74
- - - - zwartgebliekte - 73
Naarsken. - - - 238
Nacherone. - - - 417
Nacht-schulp. - - - 394
Nadeln. - - - 72
Nageldoubletten. - - 382
- - - - - Cartageensche 363
Nagelschulpen. - - 382
Naire. - - - 417
Nassauwer. - - - 110
Navel (middellandsche) - 269
Navelhoorntje. - - 364
Navelsten. - - - 17
Navelschulp. - - - 365
Neetenkammetje. - - 183
Noachs Ark. - - - 415
- - - - - bastaard - - 367
- - - - - kromme - - 312
Nootedop. - - - 294
Νηρεϊδες. - - - 218. 247
- - - *Fab. Col.* - - 137

O.

Ob Busighi. - - - 247
Oeil du Bouc. - - - 281
Oelar Pethola (est serpens ita voc.) 109

Oenam-hoozn. - - 264
Oester (Bernsteen) - - 321
- - - diksschaalige of groote geplooide - - - - 325
- - - gedraaide - - 312
- - - kleine geplooide - 325
- - - Serp - - ibid.
Ohl-Schneck. - - 112
Olphoozn (diklippige) - 242
Olykoek (enkelde) - - 134
- - - dubbelde of gebulte - ibid.
- - - ongemeene - - ibid.
Olyven-band-toot (groote) - 187
Omgewonde hoozn. - - 175
Ongle. - - - 219
Ontweers-hoozn. - - 43
Oren (hairige) - - 238
Oorhoozns. - - - ibid.
Oorliezen. - - - ibid.
Oorschulp (witte(- - 53
Oranje Pen. - - - 92
- - - Vlag. - - - 165
Orgelppy. - - - 406
Orlamjes. - - - 291
Ossen Hert. - - - 364
- - Kop. - - - 239
Ostraceon *Plinii*. - - 273
Oude wyven. - - 187
- - - - - met tanden. - 43
- - - - - schulp (gerimpelde) 389
Oven (gloeijende) - - 117
- - groote zilvere - - ibid.

P.

Paardeboertje. - - 383
Paareltjes. - - - 230
Paarlemoerhoozn. - - 6
Paarlemoerschulp. - - 318
- - - - - - kleine ronde 51
- - - - - - lange - ibid.
Paleynoa. - - - 264
Pantalena. - - - 281
Papedo-hoozn. - - 6
Papeitje. - - - - 92
Papoesche Kol. - - 68
Paricella. - - - 417
Patridge Schell. - - 107
Patrysze. - - - ibid.
Pauskroon. - - - 92
- - - bruine - - ibid.
- - - rivier - - ibid.
- - - Westindische - 78
- - - - - - - bastaard 73
Peer (gedroogde) - - 266
- - roode gebrande - - ibid.
Peerhoozn. - - - 207
Πελαγλὶς. - - - 281
Pennen. - - - - 72
- - gebaartelde. - - 73
- - omgewonde - - ibid.
- - Oranje - - 92
- - wit geplekte - - 74
Perlen-mutter. - - 6. 318.
Perl-Schneck. - - - 6
Perspectief-doublet. - - 383
- - - hoozn. - - 17
- - - Slek. - - ibid.
Perspectiefje. - - - 387
Pesce Canella. - - 406
Petool-hoozn. - - 110
Piering (zilvere) - - 319
Pimpeltje (Bandasche) - 47
- - - bruine - - ibid.
- - - getakte - - 192.
- - - topdmondige - 137
Πίνα. - - - - 417
Pinnenwachter. - - - 418
Plekhoozn (geborende) - 152
Podagra-kreeft. - - - 255
- - - - - Wpfsten. - ibid.
Poelorontje. - - - 39
Poffertje (geribt) - - 374
Polsten. - - 229. 447. 450
Poolsche Hamer. - - 308
Παμφάλιαι. - - - 281

Posaunen-horner. - - 125
Posthoorn. - - - 12. 14
Posthoorntje. - - - 11
Prince begraaffenis. - - 204
- - Stamper. - - ibid.
Punto Francoise. - - 386
Puntu Madame. - - 202
Purperslek (bastaard) - 175
Pyramide. - - 64. 175

Q.

Quaaker. - - - 387
Quadrantje. - - - 389
Quakker. - - - 387

R.

Ragoyster. - - - 382
Raspdoublet. - - - 349
Remies. - - - 385
Reuze-oor. - - 95. 105
Ringhoorntje. - - 138. 188
Ringhorner. - - - 125
Rivierdoorntje. - - - 137
Rivier Miter Shell. - - 92
Rivier Pause-kroon. - - ibid.
Robbetonge. - - - 399
Roema Gorita. - - - 7
Rollen. - - - 203
Rolletje (Satyne) - - 204
Roosdoublet. - - - 401
Rotsdoublet. - - - 327
Royar Stair Ease. - - 149
Rudolphus. - - - 219
- - - geknobbelde - 59
Rysthorrels. - - - 230
Rystenbryhoorn. - - 130

S.

Sail Schell (Thick) - - 6
Salt Coury. - - - 230
Saltz Corallen. - - - ibid.
Samaar. - - - 152
Sassalon. - - - 264
Sattel (Engelscher oder Pollnscher) 321
Scallop *Listeri.* - - - 340
Scataponzolo. - - - 327
Schaal-Muschel. - - - 281
Scheer-horner. - - - 11
Schelet. - - - 273
Scheppertje. - - - 180
Scherfje. - - - 383
- - - wilde - - ibid.
Schermers. - - - 251
Schildpad-hoorn. - - 229
- - - toot. - - 187
- - - staart (dubbelde getakte of gehoornde - 243
- - - - - gladde - 138
Schoer-horn. - - - 11
Schoteltje. - - - 281
Schraub-Schnecken. - - 72. 74
Schrauben (spitze) - - 74
Schulp (compas) - - 343
- - - doublet - - - 299
- - - eenschaalige - - 278
- - - gerimpelde oude Wyfs 389
- - - Holster - - 417
- - - Jacobs - - 339. 341
- - - kam - - - 341
- - - Letter - - 385. 393
- - - met twee oogen. - 385
- - - Nacht - - 394
- - - Nagel - - 382
- - - Navel - - 365
- - - Paarlemoer - - 318
- - - Venus - - 388
- - - Vliegende - 341. 343
- - - Zadel - - 321
Schusselgen. - - - 281

Schuſſel-muſchel (wilde) - - 50
- - - napff. - - 281
Scorpioen. - - - 255
Scorpioentje. - - 264
Segzeine doublet. - - 399
Serp Oeſter. - - - 325
Sin Iſſip. - - - 447
Sipat Saloacco. - - 233
Sipo Bilalo. - - - 288
Sipetkilſil. - - - 73
Siſſo Capang. - - 167
- - Petir. - - - ibid.
- - Salombo. - - ibid.
Slangekop (blaauwe) - 232
- - - - gzoote - ibid.
- - - - kleine - ibid.
Slangetje. - - - 14
Slekhoozn. - - - 38
Snippekop. - - - 181
- - - - gedoozode - ibid.
- - - - getakte - ibid.
Snuitpen. - - - 78
- - - - gedoozode - 80
Sonneſtralen. - - 395
- - - - van Baguala of purpere. - - 409
Spanſche Feige. - - 207
Speckled Barbadoes. - 382
Specldoublet (Japanſche) 387
Speldewerk-Hoozn. - 187
- - - - kuſſen. - - ibid.
Spil. - - - 175
- - getande - - 173
- - ſtompe - - 175
Spinnekop. - - - 183
- - - - dubbelde - ibid.
Spitz-Schraube. - - 74
- - Muſcheln. - - 329
Spookje. - - - 187
Spzoetjes. - - - 258
Starre-pen. - - 173
Staten-vlaggen. - - 196
Steekdoublet. - - 417
Steen-Moſſel. - - 411
Steen-Scheede. - - ibid.
Sterretje. - - - 232
Stok-Oeſter. - - 316
Stompje. - - - 191
Stozmhoeden. - - 234
- - - - - gebzeide - 239
- - - - - gehoozode - ibid.
- - - - - geribde Weſtindiſche ib.
- - - - - roode - ibid.
Straub-Schnecken. - - 72
Strikdoublet. - - 393
- - - - - baſtaard - 385
Sturm-hauben. - - 234

T.

Tabaksppp. - - 175
Tafelbozdje. - - - 319
Takhoozn (bonte) - - 192
Talan-hoozn. - - 201
Tatallan-Sipe. - - 254
Taymanuſſa. - - - 11
Telinga andya. - - 319
- - - Maloli. - - 50
Tellina Gari. - - - 401
Tepelbak. - - - 218
Terbang. - - - 342
Thick Sail Schell. - - 6
Tiram Accar. - - 316
- - Beſoar. - - ibid.
- - Lebbor. - - 321
Toeda Baya. - - - 385
Tollen. - - - 64
- - gezaamleerde - - 65
- - gevlakte - - ibid.
- - langlevende - - 68
Tombor. - - - 64
Tooten. - - - 186
Topſachtige Schraub-Schnecken. - 64
Torentje (gebandeerde) - 196
- - - - geplooide - - ibid.
- - - - geribde of met bzaadjes ibid.

Tour

Tour de Bra. - - - 401
- - - - groote - - 409
Toveraar / Toverslak. - 43
Tritons-hoorn. - - 126
Trommel-schraube. - - 75
Trommelschroeven. - - ibid.
- - - - - enkelde - 74
- - - - - ruige - 78
Trompet. - - - 126
- - - Aroesche - - 171
- - - gekartelde kleene - 130
- - - Orange - - 126
Tsjasku. - - - 125
Tuitje (gegranuleerde of gekartelde) - - - 80
- - - geknobbelde - - ibid.
- - - witte - - - 78
Tulpen. - - - 450
Tyger. - - - 188
- - - geele - - 187
- - - witte - - ibid.
- - - pen (dikke) - - 73
- - - - dunne - - ibid.
- - - tonge. - - - 385

U.

Unam Castura. - - 273
Uvam Carbou. - - ibid.

V.

Venus doublet (geribde) - 363
- - - - - getande - 389
- - - hertje. - - 361
- - - - dubbelde - ibid.
- - - Schacht-doublet. - 310
- - - Schulp met hair - 389
- - - Nabelen. - - 268
- - - Navel (gekorrelde of gepaarelde - 269
- - - - - zwarte - ibid.
Verkensbek. - - - 266
Vingertje. - - - 196
Vischhuiven. - - - 291
Vleermuis. - - - 199
- - - getakte - - 200
- - - langwerpige - ibid.
Vleesch-hoorn. - - 229
Vliegende Schulp. - 341. 343
Vliege-scheetje. - - - 187
Vlooije-scheetje. - - ibid.
Voethoorn. - - - 266
Vogeltje (gevlerkte) - - 305
Vyf-vinger krabbe. - - 252
Vyg (Spaansche) - - 207

W.

Wadaat. - - - 229
Wafelyzer. - - - 385
Weg-weiser (ein einfacher) - 74
Wellen. - - - 203
Wellen. - - - 186
Wenteltrap. - - - 149
- - - - bastaard - - 150
- - - - oprechte - - ibid.
Wervelhoorn. - - 17
Wevers spoeltje. - - 233
- - - - - bastaard - 230
Wina. - - - 219
Winckelhaacken. - - 310
Windel-Treppe. - - 149
Witoogje. - - - 232
Wolkhoorn. - - - 188
Wolkje. - - - 201
Wonko. - - - 167
Wydmonder. - - - 219
- - - - geknobbelde - 59
Wytasch. - - - 341
Wyzers. - - - 251

Y.

Y.

Ysdoublet. - - - 349

Z.

Zadel Schulp. - - - 321
- - - Engelsche of Poolsche ibid.
Zeemost. - - - 363
Zee-oor. - - - 51
Zeepotje. - - - 72
Zeeton. - - - 70
Zeilnaald. - - - 93
Zieherhorn. - - - 11
Zilvere Piering. - - 319
Zilverlakense. - - 187
Zilvermond (geplekte of bonte) 117
- - - - groene - - ibid.
Zimbo. - - - 204
Zonne-hoorn. - - - 23
Zonne-stralen. v. *Sonnestralen.*
Zonnestraal-krab. - - 256
Zoomtje (gestreepte) - - 242
- - - gladde - - 241
Zotskap. - - - 292
- - - schulp (dubbelde) - 364
Zoutkorreltje. - - - 320
Zwartmondje. - - - 39
Zwitsers-broek. - - 192
- - - - - getakte. - ibid.

CLAVIS FIGURARUM

COCHLIDUM. P. I. Sect. II

Figura.	*Genera.*	
Tab. V. Fig. 98.	Bulla.	Gen. I. Cl. III.
99. a. b.	Oliva.	II.
100.	Pila.	III.
Tab. VI. Fig. 101.	Porcellana.	IV.
102.	Caſſis.	V.
103.	Semicaſſis.	VI.
104.	Caſſis Bicornis.	VII.
105.	Cithara.	VIII.
106.	Mono-dactylus.	Gen. I. Cl. IV.
107.	Lentigo.	V.
108.	Alata Lata.	VI.
109.	Murex-Frondoſos.	Gen. I. Cl. V.
110.	—— Coſtoſus.	II.
111.	Umbilicus.	Gen. I. P. I. Appendix.

CONCHARUM. P. II. Sect. I.

Figura.	*Genera.*	
Tab. VIII. Fig. 1. 2. 3.	Patella Integra	Gen. I. Cl. I.
4. 5.	—— Lacera.	II.
6. 7. 8.	Calyptra.	Gen. I. Cl. II.
9.	Cochlearia.	II.
10.	Mitra Hungarica.	III.
11. 12.	Cochlo-Lepas.	IV.
13.	Avicula.	Gen. I. Cl. I. P. II. Sect. II. Cap. I.
14.	Tudes Polonica.	II.
15.	Rognomon.	III.
16.	Parallepipedum.	IV.
17.	Oſtreum Longum.	Gen. I. Cl. II.
18.	Mater Perlarum.	II.
19. 20.	Oſtreum Læve.	III.
21.	—— Imbricatum.	IV.
22.	—— Plicatum.	V.
23.	—— Muricatum.	VI.
Tab. IX. Fig. 24. 25.	Muſculus Acutus.	Gen. I. Cl. III.
26.	—— Latus.	II.
27.	—— Mammarius.	III.
28.	Cyclas.	Cl. IV.
29.	Pecten.	Gen. I. Cl. V.
30.	Amuſium.	II.
31.	Pſeud-Amuſium.	III.
32. 33.	Ctenoides.	IV.
34.	Radula.	V.
35.	Vola.	VI.
36.	Triquetra.	VII.
37.	Spondylus.	VIII.
38.	Mytulo Pectunculus.	IX.
Tab. X. Fig. 39.	Hemicardia.	Gen. I. Cl. VI.
40. 41. 42.	Iſocardia.	II.

CLAVIS FIGURARUM

CONCHARUM. P.II. Sect. II. Cap. II.

Figura.	Genera.		
Tab. X. Fig. 43. 44. 45. 46.	Anomalocardia.		III.
47.	Diconcha Sulcata.		Cl. I. P. II. Sect. II. Cap. II.
48. 49. 50.	—— Umbilicata.	Gen. I.	Cl. II.
51.	Actinobolus.		II.
52.	Omphalo-Clathrum.		III.
53.	Chamætrachæa.	Gen. I.	Cl. III.
54.	Chamelæa.		II.
55.	Quadrans.		III.
56. Tab. XI. Fig. 57. 58. 59.	Tellina Circinata.	Gen. I.	Cl. IV.
60.	—— Virgata.		II.
61.	—— Striata.		III.
62.	—— Granulata.		IV.
63.	—— Lævis.		V.
64.	—— Muricata.		VI.
65.	Solen Bivalvis.	Gen. I.	Cl. V.
66.	Concha longa Biformis.		II.
67.	Pholas.		III.
68. a. b.	Concha longa Uniforis.		IV.
69. 70.	Musculus Polylepto Ginglymus.		V.
71.	Pinna.		VI.
72.	Glicimeris.		VIII.
73.	Mactra.		IX.
74.	Terebratula.	Gen. I.	P. II. Sect. III.
75.	Concha TRIAOBOΣ.		II.
Tab. XII. Fig. 76. 77. 78. 79.	—— Adunca.		III.
80.	Bursula.		IV.
81.	Globus.		V.
82. 83. 84. 85. 86.	Stola.		VI.
87. 88.	Concha Ansata.		VII.
89. 90. 91. 92. 93.	—— Anatifera.	Gen. I.	P. III.
94. 95. 96. 97.	Monolopos.	Gen. I.	Cl. I. P. IV.
98.	Polylopos.		II.
99.	Astrolepas.		Cl. II.
100.	Capitulum.		Cl. III.

JACOBI

CLAVIS FIGURARUM IN TABULIS XII.

UT CONFERRI POSSINT CUM GENERIBUS OSTRACODERMATUM.

COCHLIDUM. P. I. Sect. I.

Figura	*Genera*		
Tab. I. Fig. 1. 2. 3. 5.	Nautilus.	Gen. I.	Cl. I.
4.	Semi-Nautilus.	II.	
6. 7. 8. 9.	Cornu Hammonis.	III.	
10. 11.	Semi-Cornu.	IV.	
12. 13. 14. 15. 16.	Nerita.	Gen. I.	Cl. II.
17. 18.	Serpentulus.	II.	
19.	Sol.	III.	
20.	Luna.	IV.	
21.	Stella.	V.	
22. 23. 24.	Angyſtoma.	VI.	
25. 26. 27.	Oricoſtoma.	Gen. I.	Cl. III.
28.	Platyſtoma.	II.	
29. a. b.	Dontoſtoma.	III.	
30.	Pentadactylus.	IV.	
Tab. VII. Fig. 112.	Tribulus.	V.	
113.	Auris.	Gen. I.	Cl. IV.
114.	Catinus Lactis.	II.	
Tab. II. Fig. 31. 32.	Vitta.	III.	
33. 34.	Cidaris.	IV.	
Tab. VII. Fig. 115.	Scapha.	VI.	
Tab. II. Fig. 35. a. b. 36.	Trochus.	Gen. I.	Cl. V.
37.	Hamus.	II.	
Tab. VII. Fig. 116.	Pſeudo-Trochus.	III.	
117.	Strombus.	IV.	
Tab. II. Fig. 38. 39. 40.	Tympanotonos.	V.	
Tab. VII. Fig. 118.	Vertagus.	VI.	
119.	Noctua.	VII.	
120.	Anas.	VIII.	
Tab. II. Fig. 41. 42.	Pes Anſerinus.	IX.	
43.	Oxy-Strombus.	X.	
44. 45.	Tuba Phonurgica.	XI.	
Tab. VII. Fig. 121.	Pſeudo-Strombus.	XII.	
Tab. II. Fig. 46. 47.	Dipſaccus.	XIII.	
Tab. VII. Fig. 122.	Auris Midæ.	XIV.	
123.	Maſſa.	XV.	

COCHLIDUM. P. I. Sect. I.

Figuræ.	Genera.	
Tab. II. Fig. 48. 49.	Terebellum.	XVI.
Tab. VII. Fig. 124.	Cochlea Lunaris.	Gen. I. Cl. VI.
Tab. II. Fig. 50.	—— Cælata.	II.
51.	—— Petholata.	III.
Tab. VII. Fig. 125.	Olearia.	IV.
Tab. II. Fig. 52.	Tigris.	V.
Tab. VII. Fig. 126.	Fornax.	VI.
Tab. II. Fig. 53. 54.	Trocho-Cochlea.	VII.
55.	Saccus.	VIII.
Tab. VII. Fig. 127.	Buccinum Tritonis.	Gen. I. Cl. VII.
128.	Argo-Buccinum.	II.
Tab. II. Fig. 56.	Cophino-Salpinx.	III.
57. 58.	Buccinum Lacerum.	IV.
Tab. III. Fig. 59.	—— Muricatum.	V.
60.	Urceus.	Gen. I. Cl. VIII.
61.	Lagena.	II.
62. 63.	Simpulum.	III.
64.	Gutturnium.	IV.
65.	Canistrum.	V.
66.	Scala.	VI.
67.	Epidromus.	VII.
68.	Sipho.	VIII.
69.	Auricula.	IX.
70.	Neritostoma.	X.
71. a. b.	Turbo Lunaris.	XI.
72.	Garagoi.	XII.
Tab. IV. Fig. 73.	Gallinula.	XIII.
74. 75.	Galea.	XIV.
76.	Trochus Rostratus.	Gen. I. Cl. I. P. I. Sect. II.
77.	Gladius.	II.
78.	Fusus.	III.
79. a. b.	Mazza.	IV.
80.	Rapa.	V.
81.	Haustellum.	VI.
82.	Tribulus Rostratus.	VII.
83. 84.	Conus.	Gen. I. Cl. II.
85.	Trocho-Conus.	II.
Tab. V. Fig. 86.	Ditrochus.	III.
87.	Turricula.	IV.
88.	Thema Musicum.	V.
89.	Vespertilio.	VI.
90.	Nubecula.	VII.
91. a. b.	Dactylus.	VIII.
92.	Cucumis.	IX.
93.	Ficus.	X.
94.	Conchylium Rondeletii.	XI.
95.	Aporrhais.	XII.
96.	Concha Natatilis.	XIII.
97.	Cymbium.	XV.

JACOBI THEODORI KLEIN

LUCUBRATIUNCULA

DE

FORMATIONE, CREMENTO

ET

COLORIBUS

TESTARUM,

QUÆ SUNT

COCHLIDUM

ET

CONCHARUM.

Oenam-hoorn. - - 264
Oester (Bernsteen) - - 321
- - - dikschaalige of groote geplooide - - - - 325
- - - gedraaide - - 312
- - - kleine geplooide - 325
- - - Serp - - ibid.
Ohl-Schneck. - - 112
Olyphoorn (diklippige) - 242
Olykoek (enkelde) - - 134
- - - dubbelde of gebulte - ibid.
- - - ongemeene - - ibid.
Olyven-band-toot (groote) - 187
Omgewonde hoorn. - - 175
Ongle. - - - 219
Ouweers-hoorn. - - 43
Oren (hairige) - - 238
Oorhoorns. - - - ibid.
Oorliezen. - - - ibid.
Oorschulp (witte(- - 53
Oranje Pen. - - - 92
- - - Vlag. - - - 165
Oxgelppp. - - - 406
Oxlamjes. - - - 291
Ossen Pert. - - - 364
- - Kop. - - - 239
Ostraceon *Plinii*. - - 273
Oude wyven. - - 187
- - - - met tanden. - 43
- - - - schulp (gerimpelde) 389
Oven (gloeijende) - - 117
- - groote zilvere - - ibid.

P.

Paardevoetje. - - 383
Paareltjes. - - - 230
Paarlemoerhoorn. - - 6
Paarlemoerschulp. - - 318
- - - - - kleine ronde 51
- - - - - lange - ibid.
Paleynoa. - - - 264
Pantalena. - - - 281
Papedo-hoorn. - - 6
Papeitje. - - - 92
Papoesche Tol. - - 68
Paricella. - - - 417
Patridge Schell. - - 107
Patryze. - - - ibid.
Pauskroon. - - - 92
- - - - bruine - - ibid.
- - - - rivier - - ibid.
- - - - Westindische - 78
- - - - - - - bastaard 73
Peer (gedroogde) - - 266
- - roode gebrande - - ibid.
Peerhoorn. - - - 207
Πελαγλὶς. - - - 281
Pennen. - - - 72
- - gebartelde. - - 73
- - omgewonde - - ibid.
- - Oranje - - 92
- - wit geplekte - - 74
Perlen-mutter. - - 6. 318
Perl-Schneck. - - - 6
Perspectief-doublet. - - 383
- - - hoorn. - - 17
- - - Slek. - - ibid.
Perspectiefje. - - - 387
Pesce Canella. - - 406
Petool-hoorn. - - 110
Piering (zilvere) - - 319
Pimpeltje (Bandasche) - 47
- - - bruine - - ibid.
- - - getakte - - 192
- - - wydmondige - 137
Πινα. - - - 417
Pinnenwachter. - - - 418
Plekhoorn (geborende) - 152
Podagra-kreeft. - - 255
- - - - Wyfken. - ibid.
Poelorontje. - - - 39
Poffertje (geribt) - - 374
Pokken. - - 229. 447. 450
Poolsche Hamer. - - 308
Παμφάλιαι. - - - 281

Posaunen-horner. - - 125
Posthoorn. - - - 12. 14
Posthoorntje. - - - 11
Prince begraaffenis. - - 204
- - Stamper. - - ibid.
Punto Francoise. - - 386
Puntu Madame. - - 202
Purperslek (bastaard) - 175
Pyramide. - - 64. 175

Q.

Quaaker. - - - 387
Quadrantje. - - - 389
Quakker. - - - 387

R.

Ragoyster. - - - 382
Rasydoublet. - - - 349
Remies. - - - 385
Reuze-oor. - - 95. 105
Ringhoorntje. - - 138. 188
Ringhorner. - - - 125
Rivierdoorntje. - - - 137
Rivier Mitter Shell. - - 92
Rivier Pause-Kroon. - - ibid.
Robbetonge. - - - 399
Roema Gorita. - - - 7
Rollen. - - - 203
Rolletje (Satyne) - - 204
Roosdoublet. - - - 401
Rotsdoublet. - - - 327
Royar Stair Ease. - - 149
Rudolphus. - - - 219
- - - geknobbelde - 59
Rysklorels. - - - 230
Rystenbryhoorn. - - 130

S.

Sail Schell (Thick) - - 6
Salt Coury. - - - 230
Saltz Corallen. - - - ibid.
Samaar. - - - 152
Sassalon. - - - 264
Sattel (Engelscher oder Pollnscher) 321
Scallop *Listeri*. - - - 340
Scataponzolo. - - - 327
Schaal-Muschel. - - - 281
Scheer-horner. - - - 11
Schelet. - - - 273
Scheppertje. - - - 180
Scherfje. - - - 383
- - - wilde - - ibid.
Schermers. - - - 251
Schildpad-hoorn. - - 229
- - - toot. - - 187
- - - staart (dubbelde getakte of gehoornde - 243
- - - - - gladde - 138
Schoer-horn. - - - 11
Schoteltje. - - - 281
Schraub-Schnecken. - - 72. 74
Schrauben (spitze) - - 74
Schulp (compas) - - 343
- - - doublet - - - 299
- - - ernschaalige - - 278
- - - gerimpelde oude Wyfs 389
- - - Holster - - 417
- - - Jacobs - - 339. 341
- - - kam - - - 341
- - - Letter - - 385. 393
- - - met twee oogen. - 385
- - - Nacht - - 394
- - - Nagel - - 382
- - - Navel - - 365
- - - Paarlemoer - - 318
- - - Venus - - 388
- - - Vliegende - 341. 343
- - - Zadel - - 321
Schusselgen. - - - 281

Schuffel-muſchel (wilde) - - 50
- - - napff. - - 281
Scorpioen. - - - 255
Scorpioentje. - - 264
Segzeine doublet. - - 399
Serp Oeſter. - - - 325
Sin Tſſip. - - - 447
Sipat Saloacco. - - 233
Sipo Bilalo. - - - 288
Sipetkilſil. - - - 73
Siſſo Capang. - - - 167
- - Petir. - - - ibid.
- - Salombo. - - - ibid.
Slangekop (blaauwe) - 232
- - - groote - - ibid.
- - - kleine - - ibid.
Slangetje. - - - 14
Slekhoorn. - - - 38
Snippekop. - - - 181
- - - gedoornde - - ibid.
- - - getakte - - ibid.
Snuitpen. - - - 78
- - - gedoornde - - 80
Sonneſtralen. - - 395
- - - - van Baguala of purpere. - - 409
Spanſche Feige. - - - 207
Speckled Barbadoes. - - 382
Speeldoublet (Japanſche) - 387
Speldewerk-Hoorn. - - 187
- - - Kuſſen. - - ibid.
Spil. - - - 175
- - getande - - - 173
- - ſtompe - - - 175
Spinnekop. - - - 183
- - - dubbelde - - ibid.
Spitz-Schraube. - - - 74
- - Muſcheln. - - - 329
Spookje. - - - 187
Sproetjes. - - - 258
Starre-pen. - - - 173
Staten-vlaggen. - - 196
Steekdoublet. - - - 417
Steen-Moſſel. - - 411
Steen-Scheede. - - ibid.
Sterretje. - - - 232
Stok-Oeſter. - - 316
Stompje. - - - 191
Stormhoeden. - - 234
- - - - - gebreide - 239
- - - - - gehoornde - ibid.
- - - - - geribde Weſtindiſche ib.
- - - - - roode - - ibid.
Straub-Schnecken. - - 72
Strikdoublet. - - 393
- - - - - baſtaard - 385
Sturm-hauben. - - 234

T.

Tabaksspp. - - 175
Tafelhoorje. - - - 319
Takhoorn (bonte) - - 192
Talan-hoorn. - - 201
Tatallan-Sipe. - - 254
Taymanuſſa. - - - 11
Telinga andya. - - 319
- - - Maloli. - - 50
Tellina Gari. - - - 401
Tepelbak. - - - 218
Terbang. - - - 342
Thick Sail Schell. - - 6
Tiram Accar. - - 316
- - Beſoar. - - ibid.
- - Lebbor. - - 321
Toeda Baya. - - - 385
Tollen. - - - 64
- - gegrannleerde - - 65
- - gevlakte - - ibid.
- - langlevende - - 68
Tombor. - - - 64
Tooten. - - - 186
Topſachtige Schraub-Schnecken. - 64
Torentje (gebandeerde) - 196
- - - geplooide - - ibid.
- - - geribde of met draadjes ibid.

Tour

Tour de Bza. - - - 401
- - - - - groote - - 409
Toveraar / Toverſlak. - 43
Tritons-hoorn. - - 126
Trommel-ſchraube. - - 75
Trommelſchroeven. - - ibid.
- - - - - - enkelde - 74
- - - - - - ruige - 78
Trompet. - - - 126
- - - Aroeſche - - 171
- - - gekartelde kleene - 130
- - - Orange - - 126
Tsjasku. - - - 125
Tuitje (gegranuleerde of gekartelde) - - - 80
- - - geknobbelde - - ibid.
- - - witte - - - 78
Tulpen. - - - 450
Tyger. - - - 188
- - - geele - - 187
- - - witte - - ibid.
- - - pen (dikke) - - 73
- - - - dunne - - ibid.
- - - tonge. - - - 385

U.

Unam Caſtura. - - 273
Uvam Carbou. - - ibid.

V.

Venus doublet (geribde) - 363
- - - - - getande - 389
- - - hertje. - - 361
- - - - dubbelde - ibid.
- - - Schacht-doublet. - 310
- - - Schulp met hair - 389
- - - Nabelen. - - 268
- - - Navel (gehoorelde of gepaarelde - 269
- - - - zwarte - ibid.
Verkensbek. - - - 266
Vingertje. - - - 196
Viſchhuiden. - - - 291
Vleermuis. - - - 199
- - - getakte - - 200
- - - langwerpige - ibid.
Vleeſch-hoorn. - - 229
Vliegende Schulp. - 341. 343
Vliege-ſcheetje. - - - 187
Vlooije-ſcheetje. - - ibid.
Voethoorn. - - - 266
Vogeltje (gevlerkte) - - 305
Vpf-vinger krabbe. - - 252
Vyg (Spaanſche) - - 207

W.

Wadaat. - - - 229
Wafelyzer. - - - 385
Weg-weiſer (ein einfacher) - 74
Wellen. - - - 203
Wellen. - - - 186
Wenteltrap. - - - 149
- - - - baſtaard - - 150
- - - - oprechte - - ibid.
Werbelhoorn. - - 17
Wevers ſpoeltje. - - 233
- - - - - baſtaard - 230
Wina. - - - 219
Winckelhaacken. - - 310
Windel-Treppe. - - 149
Witoogje. - - - 232
Wolkhoorn. - - - 188
Wolkje. - - - 201
Wonko. - - - 167
Wpdmonder. - - - 219
- - - - geknobbelde - 59
Wptaſch. - - - 341
Wyzers. - - - 251

Rumphius *denegat; nec quod* Rondeletius *insuper testæ nautili minoris peregrinum plane animal, ex genere sepiarum, substituit. Imo vero* Nautilus crassus (*f*), *sine interitu sui, testam deserere nullo modo potest; & quam facile fallantur, qui omnis generis crustacea, loricas suas prout* astacos, *vel qui colubros, amphisbænas, omnesque angues incisuris circularibus, exuvias cum reliquis anguibus quotannis deponere credunt, piscatoribus & aliis ex plebe hominibus nimium fidem dantes? Quamdiu cum viris sapientibus vel observando, vel modice ratiocinando de rebus physicis, inprimis ad Historiam naturalem promovendam facientibus, mihi intercessit negotium, ab omni judicii anticipatione liber, ad id intentus pro viribus fui, ut nec falsis rebus, aut non satis cognitis assentirer, nec alios levibus argumentis flecterem ad veritatem, procul à me dissitam. O, quantum Natura varia est! componit, coagmentat, distinguit, separat, iterum jungit, addit, demit, ludit quoque, ut fallere videatur; sed nil minus; fallimur nos, fallimusque; manet simplicissima, manet veridica natura, modo mente comprehendamus recte egregia facinora, & intellectu divinitatem, quam præ se fert, sapientissimam; licet prima rerum elementa nos fugiant, & intellectum in adjunctis circumscribant. Ubi de rebus, ubi de causis rerum evolvendis agitur, animus ab hypothesibus vacuus esse debet, ne causas rerum ante & operose nimis determinemus, quam res in sensus ceciderint, rerumque, non sensibus sed ratione assequendam, naturam cognitam habeamus: verecunde itaque philosophandum, ut viam aliis ad præclara cœpta non obstruamus. Et tamen in sole aliquando caligamus, erramusque via, quam semel supposuimus rectam. Has regulas mihi omninò quidem inposui, erroribus me tamen vacuum*

(*f*) Vid. *Lucubr.* §. XLIII.

cuam non ſentiens. Nec eſt, quod quisquam exſpectet, ut quæ de geneſi teſtarum dici poſſent, ſingula minutatim explicem; quia eſſet opus immenſum, cui lucubratiuncula præſens valde impar; hanc ex pluribus, quas pro commercio noſtro in hac materia cum laudato Amico vel per duas quadras anni 1743. *communicaveram, literis concinnavi; perpauca addidi, plurima illuſtravi; nec aliter fieri potuit, quin a ſyſtemate Celeberrimi* REAUMURII *de formatione teſtarum aberrans theſin meam, quam cum aliis viris doctis commanem habeo, defenderem: multi hanc ſcribendi materiam occuparunt, nemo uberrime tractavit, quam nec ego exhauſiſſe præſumam, nec plus in alieno negotio videre velim, quam in meo; multa enim & diligentiſſimis pereunt. Interim tamen bonas horas in non ultima cauſa inſumere, religionis eſſe duxi; nec extra oleas videar divagari, quod, poſt Biblia ſacra, nullus mihi carior, libro naturæ; intra anguſtiores tamen limites me continere decrevi; reliqua, pro rei dignitate, peritioribus committens, cum multa eximia reſtant, nondum enucleata. Scripſi e Muſeo, menſe Novembr.* 1745.

SUM-

SUMMARIA:

Animalia teſtacea cum integris teſtis ex ovo prodire - falſitatis arguitur - ſed obſervationibus comprobatur: - *Leeuwenboekii* - (Quibus modis teſtacea ova ſua deponant) - oſtreorum ova - mytulorum - *Liſteri* obſervatio in oſtreis - buccino fluviatili - *Williſii* - *Marſilli* de cochleis - *Rumphii* - *Swammerdammi* - Hiſtoria Acad. Reg. Scient. aliter ſentit - cum Celeb. *Reaumurio* - Dni. *Reaum.* experimentum - (Limaces non ſunt cochleæ.) - Quomodo teſtacea tranſpirent præ aliis animalibus ſecundum Dni. *Reaum.* - De fabrica teſtarum *Steno* - *Leeuwenboekius* - (Teſtæ corio tectæ) - Illorum ſententia comprobatur - cornua ammonis valde exigua - Teſta animalis pars conſtitutiva - Corpus cochleæ in duas partes diviſum conſideratur - De teſtarum ſtructura ab *Heyde* - *Steno* - *Liſterus* - Margaritarum tunicæ & teſtularum lamellæ collatæ - Autorum ſententiæ de ſtructura teſtarum comprobatæ - Hactenus dictorum ſumma - Per juxta poſitionem - teſta - in difformem molem excreſceret - Objectio - reſoluta - Quid facto animalis teſtæ accedat - Saliva quid? - Definitiones: Cochlidum, Cochleæ, Stromborum, Buccinorum - (Spiræ ex ovo minores præ ſpiris teſtæ adultæ) - Cochlidis compoſitæ - (Spiræ nec plures in adultis, quam in teſtis ex ovo) - Collare cochleæ - quid ſit? - Gibbus cochleæ - Dni. *Reaum.* ad collare ſolam tranſpirationem materiæ collocat - Hujus ſententiæ examen - exemplis illuſtratum - natura cochlidis colorem heterogeneum non admittit - Quid per naturam cochlidis intelligatur - Teſta os cochleæ - Teſtudinis os - Colores in teſtam introduci poſſunt - Objectio de vi motrice - reſoluta - qualis materia tranſpiret - De foliis arborum - ſubſtantia teſtularum cum ſucco vitali collata - Collare cochleæ porro conſideratum - extra - & intra ovum - Qua ratione colores in teſtam introduci poſſint - Saliva diverſa a muco cochleæ vulneratæ - Succus vitalis - quæ proxima ſit cauſa & incrementi & colorum teſtæ? - Rumphii obſervatio circa cochleas ſudantes - Teſtæ velamina cum perioſteo comparantur - Collaris puncta vel radii in cochlea urticarum non obſervata - Difficultas lineas ducendi - Incrementorum teſtarum modus a *Rumphio* propoſitus - primus ſecundus - tertius - (murices teſtarum), - Sufficerent modi ſecundus & tertius - monita circa modos - De eminentiis ſuper teſtis - ab eminentiis collaris oriundis - quæ hypotheſis fallit - Incrementa teſtarum ab cum arboris vegetatione conferenda - Quo ſenſu teſtacea dici poſſint architecti teſtarum ſuarum - Speciatim quædam pertractanda - Teſta pertuſa reſarcienda prout oſſa fracta - primaria officina vegetationis - Dni. *Mery* dubia contra Syſtema Dni. *Reaum.* - Omnium conchyliorum geneſis uniformis - Cochlea in ovo tot habet ſpiras quot adulta - facultas in anteriore - in poſteriore corporis parte - (*Hic tabella noſtra*) - Buccinum conſiderandum - Definitio Cymbii - Mammæ - Pectines - Dni. *Mery* teſtulas obſervavit - Reſponſio Dni. *Reaum.* - Perioſteum quodcunque urgetur - Teſtulæ differunt inter ſe - de his *Leeuwenboek.* - (vegetatio in diconchis clarior) - *Rumphius* de cochlea lunari - de caſſide lævi cinerea - recte Dni. *Mery* teſtas vegetare ſuſtinet - Teſta mytuli porro conſiderata - lamellæ non a juxta poſitione - Tendines valvis cognati - Uniones in conchis - quid? - cum oculis cancri collati - an deleantur extuberantes laminæ? - quod juxta poſitionem deſtruit - De unguibus animalium & ſquamis piſcium - Ex frictione damnum mytulis - tamen creſcunt minores - Pinna conſiderata - Primaria vegetationis officina - Dubium Dni. *Mery* de muſculis mytulorum - quot habeant, eorumque ſitus - fibras minutiſſimas in minores ſubdividi - per muſculos alimentum in teſtas - Experimentum Dni. *Reaum.* conſiderandum - Spirarum contenta - aër externus fortius agit per vulnus in corpus cochleæ - Cura vulneris examini ſubjecta - Facinora caſſidis tuberoſæ circa labium vetus - aliter in Caſſide lævi cinerea - Quæ facta non tollunt intus ſuſceptionem - exempla a tribulis - muricibus - ſcorpio - oſtreo muricato - claviculis Echinometrarum & pluribus - Dni. *Reaum.* hypotheſis - ejus argumentum de muſculo ad primam ſpiram cochleæ - quid ſit? - partem poſteriorem cochleæ abſolvit ſaccus lacteus ſpiralis - Cochlidum quarundam anatome - muſculus vel funiculus a puncto ſpiræ primæ dependet - Parietes teſtæ poſteriores quomodo comparati - per quos officina virtutes vegetationis abſolvit - Sacculus lacteus impatientiſſimus - punctum ſpirale cum funiculo umbilicali collatum - De nautilo craſſo & cornu ammonis - Thalamus nautili - De operculis quarundam cochlidum - quæ perdurant cum animali - & vegetationem comprobant.

LUCUBRATIUNCULA DE TESTARUM FORMATIONE, CREMENTO ET COLORIBUS COCHLIDUM ET CONCHARUM.

§. I.

De *formatione*, *ſtructura* & *cremento* Teſtarum acturi pro fundamento ponimus; animalia teſtacea cum ipſis & per omnes dimenſiones integris teſtis ex ovo in lucem liberumque prodire aërem; ipſamque teſtarum ſtructuram ita eſſe comparatam, ut una cum animali, tanquam ejus partes conſtitutivæ (*a*) vegetare poſſint. Hanc propoſitionem præſenti lucubratiuncula dilucidare animus eſt: quid *facto animale accedat teſtis*, ſuo loco dicturi. Animalia teſtacea cum integris teſtis ex ovo prodire.

(*a*) *Unde* dura cutis, os lapideum, *audit*; *communiter vocari ſolet cochleæ domuncula.*

§. II.

Hæc ſuppoſita ſatis quidem *commoda* eſſe non negamus, ſed rogo Falſitatis ne arguitur.

ne cum HISTORIA *Regiæ Scientiarum Academiæ* (*a*) ea propter dixeris omnino falsa (*nullement vrayes*). Verum quidem esse perhibetur, quod animal prodeat ex ovo, sed falsum, quod una cum *testa* sua in conspectum veniat, utpote *quæ peculiare & separatum opus animalis* vocatur; cum tamen incomparabilis REAUMURIUS in priori libello memoriali de anno 1709. *p.* 379. juxta hypothesin, quam olim fovit, disertis verbis profiteatur: „ Les Limacons ne sor-„ tent point de leurs Oeufs sans être deja revetûs de cette coquille „ (sed notanter) qui a alors *un tour de spire*, & *un plus.*" Consulamus in antecessum sensus circa animantia testacea intra ova sua, physicorumque facile principum observationes. Ex cœtu omnium, qui in HISTORIA culpati sunt,

Sed observationibus comprobatur

(*a*) *Sur la formation des coquilles*, 1709.

§. III.

Primus, quem in scenam producimus, LEEUWENHOEKIUS (*a*) est, qui *ostrea* aperuit, & ex imo incredibilem exiguorum copiam exemit: scire autem interest, quod quædam bivalvia (sive *conchæ*) intra testas suas, nonnullæ *cochlides* (sive univalvia), ut buccina, intra uterum pullos excludant perfectos (*b*) *aliorumque* ova super testis aliorum, non quidem deposita, sed casu adglutinata reperiantur; quædam vero marina, fluviatilia & lacustria, nymphis similibusve plantis imo lignis in stagnis vel fluviis, plerumque cum gelatina, fœturæ ranarum simili, ova sua committant; rursus cochleæ terrestres ova in acervi cumulum juxta teneras plantarum inprimis bulbosarum radices in terram edant; omniumque conchyliorum alia vocitentur animalia androgyna, ut cochleæ, musculi marini; vel diversi sint sexus, prout ostrea, pectunculi & musculi fluviatiles. Sic pro determinandis rerum primordiis in regnis vel animali vel vegetabili sufficit, ad usque ova imprægnata vel ad fœtum sive maturum in ovo, sive ipso facto excluſum, dari regressum.

LEEUWENHOEKII.

Quibus modis testacea ova sua deponant.

(*a*) *Microsc. observ. P.* III.
(*b*) *Vid.* Listeri *Hist. Conchyl. Tab.* 881.

§. IV.

Exiguorum, quæ LEEUWENHOEKIUS venatus est, *ostreorum*

120,

120. æquabant longitudinem pollicis lati; ſic 1,728,000. æquarunt globulum, cujus axis pollicem latum æquat; omnia viventia vidit, & agitatione variorum minutiſſimorumque organorum, barbæ ſcilicet, vel branchiarum (*a*), (quas aliquando extra teſtam proferebant) jam tum in aqua excitarunt motum, ut aliquo modo celeriter in aqua progredi potuerint. In ſingulis autem dignoſcere potuit *junctluram teſtarum*, & attendens ad ipſam exiguorum oſtreorum formationem, dicere neceſſe habuit, ea *omni ex parte cum adultis forma* convenire, ut *non ovum ovo ſimilius* eſſe poſſit. Pariter multa *mytulorum* obſervavit *ova*, viditque ea usque adeo *aucta* eſſe, ut in quibusdam *utramque teſtam* conſpiceret. *Multi* ex mytulis *nondum natis*, quos ex ovis exemerat, *mutarunt colorem teſtarum* ſuarum ex albicante in colorem ſubflavum; *nondum natorum teſtæ* tam *fragiles* erant, ut cum liquor ex iis exhalatus eſſet, ita contraherentur, ut eorum figura accurate dignoſci non potuerit. Quod autem perſpicaciſſimus *autor* teſtas in mytulis jam formatis a partibus corporis animalis nondum formati dijudicaverit, vel ex eo patet, quod etiam ova, in quibus mytuli nondum formati, aperuerit; inque iis certa vaſa, vel nervos, nec non in infœcundis ovis membranas vacuas cognoverit. Circa *ova* vero, quæ jam *intra teſtas matris depoſita* invenit, ſatiari non potuit, contemplando concinnum ordinem, quo ova multis in locis teſtis injecta fuerant (*b*). Teſtimonium noſtrum ex autoplia his obſervationibus ſuperaddere, ſupervacaneum eſſe judicamus. Oſtreorum ova. Mytulorum.

(*a*) *Oſtreis labia ab ore pendentia omnium bivalviuм longe validiora ſunt, utpote & craſſiſſima & rigidiuſcula; cum itaque iis pes aliquis ad ſe movendum omnino deſit, ut ſe tamen vertant, his potiſſimum labiis, tanquam remis quibusdam pennisque uti, veriſimile eſt*, Liſter. in Ind. Tabb. p. 6. ad Tab. XV.

(*b*) *Conf.* Liſt. Exercit. Anat. III. Tab. 4. f. 10. *ubi octa ova ordinatim collocata, ibidemque* figura 9. *muſculi nondum exclusi, & ſub microſcopio viſi.*

§. V.

Alter obſervatorum in ordine ſit LISTERUS, qui (*a*) recenter edita Listeri obſervatio in oſtreis.

(*a*) *Tract. de Cochl. p.* 179.

edita *ova* oſtreorum intra 24. horas teſtis contegi ſcribit; & (*b*) ova cochlearum fluviatilium quadam genitura limpida, inſtar ranarum ſpermatis, implicari; hac enim matureſcunt, donec ad formam ſingulæ ſpeciei propriam & perfectam pervenerint; prout etiam de ovis buccini fluviatilis pellucidi (*c*) agit, cujus ſperma menſe majo diligenter obſervavit, quod craſſum fuit & inſtar cryſtalli pellucidum; in cujus medio (*adhuc enim non reſolutum fuit.*) inerant plurimæ *exiguæ cochleæ*, ad magnitudinem NB. *ſeminis papaveris, ipſa* tamen *teſtæ figura maxime notabiles & facile cognoſcibiles; nulli* vero recenter in lucem editi *prorepſerunt*, etiam *cornubus exſertis*, ac ſi ſponte naſcerentur. Idem (*d*) teſtatur, quod *oſtreorum ova* matureſcendo poſt emiſſionem ex ovario *purpureſcant*, ſi microſcopio admoveantur; unde *ſequitur, quod non ſolum teſtas, ſed quoque colores* ſuos teſtacea animantia *ex ovis* ferant; his ipſa oſtrea translucere intuearis, ut ea plane *in mediis ovis conſpiciantur;* ova autem foras ejecta ſingula ad lenticulæ magnitudinem increſcere, antequam ſolvantur.

Buccino fluviatili.

Willisii.

Willisius (de quo *Liſterus*, quod ipſe ſolus in anatomia oſtreorum naturali profuerit) (*e*) teſtas *oſtreis ab ovo connatas* eſſe dicit, & primo molles, prout mole vero accreſcunt, perſenſim indurari.

(*b*) *Tract. de Cochl. p.* 107.
(*c*) *Ibid. p.* 140.
(*d*) *Idem Exerc. Anat.* III.
(*e*) *De anima brutorum cap.* 3.

§. VI.

Marsillii de cochleis.

Antonius Felix Abbas Marsillius anno 1683. *cochleas* etiam *hortenſes* obſervavit (*a*) & quidem *ſecundum omnes generationis gradus*, acie cultelli multa ovorum aperiens. In quibusdam nondum manifeſtas animalis partes, in aliis *cochleolas nondum* quidem *protruſas*, *teſta tamen* ſua *coöpertas* vidit; alia fracta erant ovula, & cochleolæ ultra

(*a*) *Relazione del ritrovamento dell' uova di chiocciole, in Bologna* 1683.; *cujus altera editio Latina Aug. Vind.* 1684. *Confer Malpigh. P.* II. *p.* 95. *Edit. Lugd. Bat. item Journal des Savans, Tome* XII. *p.* 102.

altra dimidiam ſui partem jam emergebant. Similia cochlearum, ex earum genere, quæ vites infeſtare ſolent, LEEUWENHOEKIUS 1697. nactus ova examini ſubjecit, & magna cum admiratione *integras cochleolas ex ovis prodire vidit* (*b*). Addamus RUMPHIUM *Muſ. Amboin. p.* 83. de ovis caſſidis cinereæ: **Deze eijeren zyn hoyt/** NB. **getakt/** (i. e. muricata, nam teſta caſſidis obtuſe muricata eſt) **en bzos/ gelyk** Alga coralloides, **omtrent een duim lang/ digt in-malkander/ in de midden gehropt/ boven op met een ſtompe ſpits/ week/ ſlymig/ en** NB. **licht bzuin** (vergit enim color caſſidis ex cinereo in fuſcum) **omtrent zoo dik/ als Zeilgaaren; ouder gewozden zynde/ vind men de gedaante van kleine Slekken daar in/ waar uit de voornoemde Raskketten groeyen** (vegetant). Cui teſtæ hujus caſſidis cognitæ ſunt, vel ex deſcriptione mox intelliget, ova illa eſſe hujus generis, licet animali nondum in ovo formato. Confer teſtam chamæ aſperæ, ſive Bia-Garu *Rumphii* & deſcriptionem; ut ova plura taceam. RUMPH. PHIL.

(*b*) *Microſ. Obſerv. Epiſt. C.* Marſilli *facinorum tamen nullam mentiorem fecit.*

§. VII.

Sufficiant ſatis illuſtria Teſtimonia ſimultaneæ animalis & teſtæ ſuæ in ipſo ovo generationis, ut longius abſit, eadem *falſitatis apertæ* arguere: quin potius cum SWAMMERDAMO (*a*) faciamus: „ *Teſtam perperam vocari* cochleæ *domum*, ſi hanc dictionem propria ſignificatione accipimus, ſiquidem *vera* ſit ipſius *cochleæ cutis*, „ qua ſine æque parum vivere poteſt cochlea, ac homo, cui deglupta „ eſt cutis, aut aſtacus ſua nudatus teſta, vel teſtudo pelle ſua detracta; quapropter cruſta hæc pro vero oſſe cochleæ habenda (*b*), „ in quo ejus muſculi defixi ſunt, haud aliter, ac muſculi animalium „ quadrupedium oſſibus adfixi, atque uniti ſunt; quod ipſum & in „ mytulis liquido eſt videre.“ Quodſi vero, ad inſtar dermatis, Teſta SWAMMERDAMI.

(*a*) Bibl. Nat. p. 99. quem pluribus vid. *de fabrica Teſtæ; de Sanguine; de differentia Muci a Sanguine; de Sacculo, quem vocat calcarium; & quæ reliqua.*

(*b*) *Conf.* Prælud. de cruſtratis §. 1. n. 9. & Jacob. Grandium Epiſt. de verit. Diluvii p. 66. *Teſtacea plantarum more creſcere.*

Testa sit corporis cochleæ pars constitutiva, non considerandа venit tanquam sejunctum a corpore animalis vel *separatum opus* : merveille à part.

§. VIII.

Historia Acad. Reg. Scient. aliter sentit,

Interim tamen HISTORIA Academiæ Regiæ levitatis arguit celebres rerum physicarum & naturalium cultores, aliosque viros curiosè doctos; absolute negans, testam in ipso generari ovo; verba, sic sonant: Jusqu'ici les curieux ont été assés touchés des coquilles, de leur prodigieuse varieté, & de la regularité exacte de leur structure, de la beauté & de la vivacité singuliere de leurs couleurs, de la justesse de leurs compartements, à peine imitable au Pinceau; mais *les Physiciens* nè leur ont pas rendu, pour ainsi dire, assés de justice, & ont trop negligé, de les considerer en Physiciens, & d'étudier leur formation. Apparemment ils ont crû, que comme les coquilles, ainsi que les écailles des Ecrevisses, sont des Os exterieurs pour tous les animaux qu'elles couvrent, il falloit le regarder comme parties de leurs corps, & comprendre cette merveille dans celle de la formation generale des Animaux, incomprehensible à tout l'Esprit humain. Ils ont donc supposé, que l'Animal & sa coquille nâissent du même Oeuf, & se developoient ensemble, & ils se sont contentés d'admirer, que la Nature eût fait des demeures si bien travaillées & souvent si pretieuses pour de si vils Animaux. Mais cette supposition n'est que commode, & quoi qu'assés vraisemblable, elle est *nullement vraye*. L'Animal nâit de son Oeuf, mais non pas la Coquille, qui est une merveille à part.

Cum Celeb. REAUMURIO.

Celeberrimus REAUMURIUS nuspiam taxando redarguit de rebus physicis viros meritissimos; loquitur de semidoctis vel indocte curiosis; „ La plûpart de ceux, que les beautés de la „ Nature touchent, ont mis leurs soins à en assembler le plus, *qu'il* „ *leur a été possible*, chaque nouvelle coquille fournissant de nouveaux „ attraits à leur curiosité; leurs cabinets ne contiennent qu'une par- „ tie de celles qui parent l'univers, & en ont toujours de reste pour „ exciter l'admiration de ceux, qui savent admirer, mais il semble, „ qu'on se soit borné à contempler ce bel ouvrage. — Verisimile enim nobis videtur, virum celeberrimum in supra fatos autores non incidisse, ex verbis quæ sequuntur: „ personne, *au moins que je sça-* „ *chè*; n'a expliqué, *de quelle maniere il est produit*; de sorte que

n'aiant

„ *n'aiant pas trouvé à m'en inſtruire chez les Auteurs*, j'ai conſulté „ la Nature elle même par diverſes experiences." (*a*)

(*a*) *Memoire* 1709. *p.* 365.

§. IX.

Placuit viro perilluſtri, inverſum naturæ ordinem ſequi, & ante augmenta vel incrementa teſtarum, quam harum formationem docere (*a*) experimento, quo juxta varia & terreſtria & aquatilia conchylia uſus eſt. Pertudit (nimirum) teſtas (*b*), & interpoſita inter foramen atque corpus pellicula, fruſtum ablatum infra eam continuo reſtitui didicit; ſimiliter cum exteriorem teſtæ partem avelleret, ut reliqua corpori *limacis* tegendo non amplius ſufficeret, atque *cuticulam* complicatam *extus & intus* teſtæ agglutinaret, avulſam partem nihilominus reſtitui annotavit, indubitato teſtimonio, quod cochlea continuo tranſpiret materiam lapideſcentem, quæ non abeat in liberum aërem, ſed vulneratam teſtam reſtituat, quod aliter fieri non poſſit, quam per juxta poſitionem. Non obliviſcemur *infra penitius introſpicere in hoc experimentum* (§. XXXVIII. XXXIX.), quod naturalem ordinem ſequi malumus, & doctrinam de formatione teſtæ primo loco nobis familiarem reddere.

Dñi. Reaumurii experimentum.

(*a*) *Quoiqu'il parût d'abord naturel d'expliquer de quelle maniere les coquilles des Animaux ſont formées avant de parler de leur accroiſſement, je ſuivrai ici un ordre contraire* Mem. p. 365.

(*b*) *Ita verba ſonant in* Actis Erud. Lipſienſ. 1712. p. 147. *Verum verſio:* des Limacons de jardin (*cochlearum terreſtrium, vel hortenſium*) *in* Limaces, *nobis non arridet; quod* limaces & cochleæ *toto cœlo ab invicem differunt: ſunt enim limaces, nomine proprio, animantia anteriore quidem corporis parte cochleis ſimilia, ſed nuda, nunquam teſtam induentia, nedum formantia; Germanice:* Nackte-Keller-Erde-Mauer-Schnecken.

Limaces non ſunt cochleæ.

§. X.

Expedita res eſt, quod & animata & inanimata corpora (ut vegetabilia) imo certo reſpectu lapides in liberum aërem tranſpirent; faciles

faciles quoque ſumus, dari ſpeciem Atmoſphæræ circumcirca corpora continuo tranſpirantia, quam tamen Dnus REAUMURIUS adeo non urget, & HISTORIA eum ſaltim in finem in medium proferre videtur, ut appareat, qua ratione Teſtacea præ reliquis animalibus tranſpirent. Horum materia evaneſcit in libero aëre, illorum condenſari dicitur materia exudans; quod enim vi teſtaceæ eſt donata, petrifieri poteſt in libero aëre, ita, ut formæ corporis accommodata thalamum figuratum vel domunculam efformet ſic ſolidam, ut ab injuriis liberum animal in teſta requieſcat veluti in cellula portatili, quæ præter materiam exudantem, ex qua conflata eſt, cum animali nihil amplius commune habet. Differentia igitur inter Conchylia & reliqua animata ponitur in eo, quod ſubſtantia, quæ tranſpirat, diverſa eſt; cochlearum ſcilicet, præ aliis animalibus, lenta, viſcida, & lapideſcens (*a*), non avolans in aërem; materia vero reliquorum corporum in liberum aërem abeat. Sic eſt; nam alias arboris materia tranſpirans, ſi non avolaret, lignea eſſet, vel potius corticis naturæ, quod extrema pars arboris in libero aëre cortex eſt, & per juxta poſitionem creſceret arbor, non per intus ſuſceptionem, minimum qua corticem, quo veſtitur; ſed unde eſt, quod fungorum ſubſtantia materiæ expulſæ, ſatis quidem denſæ viſcidæque, evaneſcat? quod *Limaces* æque ac cochleæ in viis ſalivam & glutinoſam materiam poſt ſe relinquentes, ex denſa viſcidaque ſubſtantia domunculas ſibi non conſtruant? ſed forte non eſt lapidificantis naturæ, etiamſi ſit lenta, viſcida & perlacea.

Quomodo TESTACEA tranſpirent præ aliis animalibus, ſecundum Dnum REAUMUR.

(*a*) *Cette difference vient de la differente ſubſtance, qui tranſpire; celle, qui ſort des Limaçons eſt visqueuſe & pierreuſe*, Hiſt. p. 18.

§. XI.

Mittimus pro hac vice vegetationem oſſium, quæ carne corporis tecta augmenta ſua capiunt, ab initio cartilagineæ ſubſtantiæ. Quæſtio modo eſt de origine & incremento *cochleæ Teſtæ*, ſive de partibus, quæ ſucceſſive teſtæ *in aëre libero* accedunt per juxta poſitionem, & quidem virtute cujusdam atmoſphæræ, quæ originem trahit ab exhalatione corporis, & conſtanti ratione circumcirca animal ſubſiſtit *lenta*, *viſcida* & *lapidificans*. Jam STENO (*a*) in mentem ſibi revocaverat, *ambiens fluidum aëris* exteriori ſuperficiei teſtulæ inſerviens; quod vero illico removit. Sunt ejus verba hæc: „ De

„ maxi-

„ maxime vero externa teſtula dubitari poteſt, an ambiens fluidum aëris exteriorem ejus ſuperficiem tetigerit, an vero *aliqua membranula* tecta fuerit? equidem hoc *poſterius tantum verum* eſſe credo, quod omnium aliarum teſtularum fibras, quo tempore concreverint, ab ambiente fluido factas non fuiſſe conſtet: quod in NB. *hirſutis*, chamis dictis, aliquod tanquam *corium* extrinſecus ſuperinjicitur; ſed quæritur de re ſenſili, & dici poteſt, fibras primæ teſtulæ tantum induratas fuiſſe, dum adhuc NB. *in ovo latuit.*" De fabrica teſtarum STENO. Et in prodromo ſcribit: Diu *intra ovum* jam tum induruiſſe primæ teſtulæ fila. Ut autem nobis conſtet, quid ſibi velint *teſtulæ* & *fibræ & fila*, autor (*b*) præmiſerat „ Teſtas (oſtrei) ex toto poſſe re„ ſolvi in *exiguas teſtas*, illas autem *teſtulas* in *fibras*. Iſtas *fibras* „ duorum eſſe generum à ſe invicem *differentes* & *colore* & *ſubſtantia* & *loco*. In exiguis *teſtulis* ſuperficiem infimam & ſuperiorem „ nihil aliud eſſe, niſi *extremas partes fibrarum*; at teſtularum limbos, ſive ambitus ſuperficies conſtare ex *lateribus fibrarum* earundem *teſtularum.*" Quam STENONIS obſervationem LEEUWENHOEKIUS (*c*) confirmat, fibrasque *Stenonis* vocat *fiſtulas*, verbis „ Hæc putamina, prout perſpicere potui, conſtarent ex fiſtulis admodum *per ſe mixtis*; quod quodlibet horum putaminum ad magnitudinem juſtam perveniret ex protruſione ſive propulſione parvorum ſubfuſcorum *putaminum*, ex *globulis compoſitorum*, atque extrinſecus magna multitudine in *plana conchæ* jacentium, unde „ *accretio & ipſarum* quoque fit *fiſtularum origo* (*d*)." LEEUWENHOEKIUS. Supra *Steno* ſententiam ſuam comprobaverat teſtis *chamarum* (imo *buccinorum*, *muricum*, *muſculorum* & *innumerorum* aliorum conchyliorum) ſuperinducto corio hirſutis ſcabrisque. Hæc animantia æque tranſpirant ac alia generis teſtacei; cum autem tranſpirans materia viſcida & petrificans dicitur, in liberum aërem non abiens, ſed atmoſphæræ ad inſtar corpori vicina ſubſiſtens, mirum eſt, quod extrema teſtæ ſuperficies coriacea, ſub quo corio demum craſſiſſima teſta gignitur, libero aëri non expoſita; ſic in cœnis noti myturli (muſculi) externe membranas (**het bovenſte vliesjen**/ *Rumphii*) habent, quæ induvia pro recreatione mentis & oculi, vel cultro, vel lima, vel aceto (Teſtæ corio tectæ.)

(*a*) *Tract. de ſolidis in ſolidis.*
(*b*) *De fabrica teſtarum.*
(*c*) *Obſerv. Micr. P.* 1.
(*d*) *Plura infra, ubi curatius* ſtructuram *teſtarum intuituri.*

te tolluntur. Dixeris itaque materiam ejusmodi testaceorum transpirantem aut *coriaceæ*, aut & *coriaceæ* & *lapideæ* naturæ; ex altera corium, quasi periosteum membranosum, ex altera testam sub ipso corio generari; sed tunc exulabit juxta positio, & testæ vegetarent uti ossa (*e*).

(*e*) Du Hamel, *mem. sur le developp. & la crue des anim.* 1742. *p.* 350. *genesin ossium cum vegetatione arboris analogice explicavit:* „ *Pour établir une analogie admira-* „ *ble entre le vegetal & l'animal* — *fundamentum ponens in eo:* „ *que les os sont enveloppés par une membrane, qu'on nomme le* periosle, le corps ligneux *des arbres l'est par l'écorce.*

§. XII.

Illorum sententia comprobatur.

Omnium conchyliorum Genesin in ovo unam esse eandemque, nemo negabit (*a*); jam vero supra fidem dedimus laudatis autoribus, qui fœtus ostreorum, musculorum & cochlearum non nudos i. e. non imperfectos, sed testa integra, perfecta, tenera quidem, uti par est, intra ovorum putamina observarunt, & ex ovis solverunt; imo nemini nem proprii frustrabuntur oculi, cochleas hortenses cum dermate testaceo, secundum omnes dimensiones integro & perfecto, ex ovis suis prodire. Videatur *Tabula a Marsillio tradita;* ubi num. 1. ovum merum, 2. apertum, sed sine ullo principio animalis, atque solum albumen emittens. 3. Animal jam perfectum & testa coöpertum, partui vicinum. 4. & 5. Cochleolæ ex ovo jam fracto emergentes. 6. Ovum fractum, ex quo omnino jam prorupit animalculum, testa vacua, aliquantum contracta & corrugata. Quin & a nostris experimentis tantisper recedentes, insuper provocamus ad testulas minutissimas emortuorum conchyliorum littoris Ariminensis (*b*). Uberrimam eorum sege-

(*a*) *Ne suffiroit il pas à un physicien d'avoir expliqué, comment une plante croit, de quelle maniere se fait la nutrition dans un animal, pour en conclure, ou plutôt afin que tout le monde Philosophe conclût avec lui, que c'est ainsi, que toutes les plantes croissent, que la nutrition se fait de la même maniere dans tous les animaux.* Dn. Reaum. Mem. 1709. *p.* 367.

(*b*) *Conf. insuper* Janum Plancum de conchis minus notis.

ſegetem habemus, ex liberalitate humaniſſimi *Planci*; collegimus (præter reliquos buccinorum, cochlearum & concharum fœtus vix ac ne vix quidem excluſos) multitudinem cornuum Ammonis; horum unitates 525, ſingulæ trium vel quatuor gyrorum, pondus æquarunt $\frac{5}{11}$ gran. Nemo autem, re experta, crederet, vel ejusmodi cornicula ammonis ſine teſtis in conſpectum ventura. Cum autem certo certius animal cum teſta ſua jam ſit in ovo, vix ac ne vix quidem materiam tranſpirantem ex corpore animalis in ovo, & quidem lapidificantem, concipere licet, quod liber aër ad tranſpirationem requiritur, quem ad cochleam in ovo non admittimus, & vel homuncioni, vel pullo gallinæ in ovis denegamus. Cornua Ammonis valde exigua.

§. XIII.

Ex præmiſſis colligimus, quod animalculum cum propria ſua & perfecta teſta ex ovo excludatur, teſtaque animalis ſit pars conſtitutiva in ovo formata, ideoque non ſeparatum eſt opus nec animalis nec liberi aëris; ſic cochlea ſine teſta ſua conſiderata non eſt cochlea, & limaces teſta præditi, deſinunt eſſe limaces; prout animal quodcunque cutaceum vel coriaceum deglupta cute deſinit eſſe animal integrum. Antequam ulterius procedamus, monemus, quod in cochlidibus turbinatis *caput animalis Domiportam* reſpiciat, quæ in ampliſſima i. e. extima ſpira patet, ſicque extrema corporis pars in prima i. e. *minima ſpira* terminatur; unde eſt, quod in turbinatis corpus animalis *naturam ſpiralem* quamcunque *formam* habet, cujus figuram circumvolutio teſtæ deſcribit. In cochlidibus volutis, prout & in conchis, corpora ſunt vel convexa aut conglomerata, vel quaſi complanata & convexa apparent. Vide Tabulas LISTERI, HARDERI & SWAMMERDAMI citatas infra §. XLII. Teſta animalis pars conſtitutiva. Corpus cochleæ in duas partes diviſum conſideratur. Vid. §. XVIII.

§. XIV.

Quod ad internam ſtructuram teſtarum attinet, incidenter §. XI. obſervationes STENONIS & LEEUWENHOEKII, quæ huc trahendæ, tradidimus; cum his conferendæ ſunt obſervationes ANTON. AB HEYDE & LISTERI. *Ille* (AB HEYDE) teſtas e filis obliquis conſtare ait, & quod increſcant, quatenus inferiori earum ſuperficiei lamellæ ex humore ab animali exudante agglutinantur, ſiquidem teſtæ ex lamellis compoſitæ conſpiciuntur. Hæc ſententia ſyſte- De teſtarum ſtructura. AB HEYDE.

mati Dni *Reaumurii* patrocinari videtur; verum mox apparet *Antonium ab Heyde* in explicatione lapſum eſſe, ſi mentem autoris interpretari velis de inferiori *ipſius teſtæ* non *teſtularum* ſuperficie; quod fieri non poteſt, ut teſta increſcat, ubi ipſius inferiori ſuperficiei vel parieti lamellæ agglutinentur: quin potius talis agglutinatio ipſi animali foret fatalis, quod tandem cogeretur teſtam, tanquam carcerem per parietes coadunatos ſucceſſive nimis anguſtum, deſerere, h. e. mortem ſubire. Increſcente enim corpore & domuncula parietes ſuos contrahente ſuffocabitur hoſpes. Recte tamen obſervavit *ab Heyde:* teſtas ex lamellis compoſitas eſſe, hasque e fibris obliquis conſtare; has autem *fibras* STENO ulterius deſcribit, quod qua materiam cum humore animalis conveniant & dupliciter *formari* poſſint, vel *in ipſis poris* (teſtæ ſcilicet) vel, ut verba autoris retineamus, dum ſuperficies animalis aucti major fit ſuperficie jam concretæ teſtulæ, ſic ab eadem recedens partim *in fibras humorem glutinoſum* trahit, qui inter *ambas ſuperficies continetur* (ut fieri ſolet viſcoſis humoribus), partim incrementum ei dat, novum humorem excernendo, maxime ſi illud perpendatur, *nullam* aliam *materiam penetrare* poſſe *inter* dictas *illas ſuperficies.* Diſtinguit autor inter *fibras* & *duplicem materiam*, cujus altera durior, altera mollior, ambæ vero viſcoſæ & fibroſæ ſunt; unde eſt, quod *illarum fibrarum accurata inveſtigatio* plurimum conferat *ad Oſteologiam explicandam*, & quaslibet teſtulas (exceptis ſolis exterioribus) productas eſſe inter *exteriorem teſtam* & ipſum animalis corpus, & per conſequens figuras ſuas non a ſe ipſis, ſed a loco habere: unde etiam evenit, motum animalis & materiæ copiam non raro aliquam in oſtreis figuræ varietatem efficere ſolere. Prout autem oſſa non per juxta-poſitionem augentur, ſed per intus-ſuſceptionem vegetant, quod medullam & canales tubuloſos pro intus-ſuſceptione & vegetatione habent; ſic teſtæ habent ſuas teſtulas ex fibris fiſtuloſis (§. XI.) compoſitas, pro intus-ſuſceptione humoris communicativi cum fiſtulis, unde ad oſſium inſtar vegetare dicuntur, ita ut partes animalis conſtitutivæ ſint; eſtque externa ſuperficies teſtæ vel corio vel membrana plus minus craſſis & tenuibus tecta, perioſteo, ſub quo vegetant oſſa, analogicis. LISTERUS (*a*) pariter teſtulas ſtatuit fibrasque fiſtuloſas, teſtulas conſtituentes; pauliſper circa materiam diſſentiens, ex qua teſtulæ fibræque oriantur; ponitque ſuccum vitalem *in fibras* tanquam *in totidem vaſa excretoria* expulſum, ibidemque ob

STENO.

LISTERUS.

(*a*) *Exercit. Anat.* III. *p.* 121.

ob moram, cum jam extra curriculum istius sueci circulati sit, paullatim induratum; *probationem* exinde desumens, quod *succus vitalis*, facta animalis sectione, *leviter coctus in grumum coaleat & colorem opalinum induat, materia* vero, *ex qua testa condensatur & indurescit, succus vitalis* sit *lapidifico succo permistus;* quod autem ad *fibras* ipsas *testulasque* ex iis compaginatas attinet, quod *illæ in ipso animalis cujusque ortu formatæ* sint, & quoad *numerum* & quoad *formam.* Huc quadrat, quod STENO *de margaritis* scribit: Inter margaritarum tunicas sive laminas ipsasque testulas conchyliorum margaritiferorum ea tantum differentia est: Testularum in his fibras quasi in eodem plano sitas esse, margaritarum vero lamellarum fibras in sphærica superficie disponi; ita fibræ centrum margaritæ cujusque ex una extremitate respiciunt. Pariter *Listerus* a margaritis ad testas concludit, verbis: Conjicio materiam lapideam &c. Jam vero margaritæ non extra animal, sed in corpore animalis gignuntur & efformantur, ubi nulla transpiratio nec aër liber ullo modo concurrunt, ut lapidefactæ dici queant uniones.

Margaritarum tunicæ & testularum lamellæ collatæ.

§. XV.

Præter tot observationes & testimonia Physicorum, *me judice*, quilibet vel nudo oculo observare potest, testas conchyliorum ex variis fibris fistulosis testularum constare, una cum innumeris meatibus diversisque cellulis, in quibusdam testis sese mutuo intersecantibus. Lima poliantur ex. gr. buccina, cochlides alatæ, cassides, vel jungantur coti aquariæ, vel dividantur serra, & mox apparebunt celluloſi, fibrosi ac tubulosi canales, sanè innumeri, miraculosis gyrationibus sibi invicem cohærentes; & hæc omnia in interna testæ substantia ultro, in interna & externa testæ superficie non nisi juxta calcinatas ad littora testas dignoscenda, analogum quid cum ossibus animantium exhibent. Considerandа etiam veniat testa balani, *vel vulgaris*, *vel balænarum*, cribrosa, pro determinanda interna testarum structura perhabilis ad vegetationem, claraque voce obloquens juxta-positioni partium suarum.

Autorum sententiæ de structura testarum comprobatæ.

§. XVI.

Ex hactenus dictis colligimus 1. quod animal cum integra testa sua ex ovo prodeat. 2. Quod testa internam structuram in ovo semel formatam ad dies vitæ integram sibi servet, non nisi qua volumen suum

Hactenus dictorum summa.

§. XIX.

Contra quotidianam enim est experientiam, quod cochlea sua testa nondum vestita prodeat in lucem (§. I.) testaque neutiquam sit animalis pars constitutiva, ex ovo cum animali incrementa sua capiens, sed separatum cochleæ editæ opus. Est utique quid, quod *testæ accedat facto animalis* (§. I. XVI): sed hoc in errorem te ducere non patiaris; cochlea quippe, *cornua ammonis, serpentuli, similesque* cochlides *amplificant* & producunt, non testam integram, sed, quantum satis, *limbum spiræ extimæ*, i. e. thalamum partis corporis anterioris, pro ratione, qua animal cum testa sua integra vegetat, prout nos porticus nostras pro ratione domus vel incolarum amplificare solemus, relicta domo integra; opus omnino singulare, quod facto animalis fit, sed non mediante materia, quæ ex corpore animalis transpirat, verum *mediante saliva ex ore eructata*. Hæc *saliva* SCHEUCHZERO audit *sanies glutinosa*, Græcis μύξα κοχλιῶν, mucus cochlearum, PLINIO, *spuma* & *succus*, de qua LISTERUS: „ quæ, uti in cochlea observari licet, si *non continuo eructatur, dum* „ *loco se movet in alium, animal* propria *saliva testificante implici-* „ *tum loco adfigeretur*; " Unde est, quod ab ATHENÆO (*a*) cochlea similisque cochlis terrestris (nam aliter sese res habet circa testacea aquatica & pelagia) ὑγροκέλυθα, *humidis viis animal*, appelletur (*b*).

Quid facto animalis testæ accedat.

Saliva quid?

(*a*) Lib. II. c. 22.

(*b*) Fab. Col. de Purpura C. 2 §. 3. *copiosam extuberantem satis atque veluti* cartilagineam spumam vitream *fundere scribit, non secus ac aqua diluta sapone multo & concussa, atque paleæ vel alterius rei exigua fistula intincta & inflata paulatim evenit; conf.* Aldrov. de Testac. p. 107.

§. XX.

Per *cochlides* autem intelligimus: quosvis canales testaceos circa principium clausum in gyros gradatim vastiores constanti ratione circumactos, vulgo *univalvia*. Sic *cochlea* nobis audit: *cochlis simplex*, conis obtusis & inclinatis quodammodo similis, spiris pluribus, iisdemque excentricis, contorta. *Strombi* sunt cochlides spirales, in conum valde acutum & longum contortæ. *Buccina* autem sunt strombi

Definitiones Cochlidum. Cochleæ. Strombi. Buccinorum.

bi in ventrem ultimæ ſpiræ globoſum & vaſtum dilatati, ore ſubrotundo, breviter canaliculato, & ſic porrò; omnes ex ipſo ovo in luce diſtinguendæ & cognoſcibiles. Infinite itaque (ut ita cum vulgo loquar) minores ſunt ſpiræ, ex. gr. cochleæ ex ovo, præ ſpiris cochleæ trium vel quatuor annorum, ſive illius diameter ſcrupulum, ſive hujus diameter uncias adæquet; conſequenter duæ priores ſpiræ cochleæ juvenis minores ſunt prioribus ſpiris duabus cochleæ adultæ, nec tamen ætas teſtæ provectior abſorpſit teſtam ex ovo, neque metamorphoſi quadam transmutavit, ni crederes animal minorem teſtam deponere, prout aſtaci deponant loricas ſuas, ſibique ex materia tranſpirante quotannis novam conſtruere. In *cochlide compoſita* ſyſtema Dni *Reaumurii* longe difficilius admittitur: eſt autem cochlis compoſita, in qua duplex teſtæ circumvolutio, ita ut ex duabus cochlidibus videatur compoſita; ex. gr. *Fuſus longus* conſtat parte poſteriore ex ſtrombo, anteriore vero ſive ventre vel thalamo ex voluta; in hac cochlide 2. vel 3. linearum, qua partem poſteriorem, nec plures, nec pauciores ſunt ſpiræ vel ſectiones, quam in ſimili cochlide longitudinis pedalis, nec laborat animal unquam nudo corpore ab ipſo ovo; ergo una cum animalis partibus mollibus vegetavit cochlis in ovo, ex quo teſta perfecta tandem prorupit. Veritas cadet in oculos, inſpecta Tabula noſtra in §. XXXII. explicata, qua opuſculo huic ſubjuncta delineatas exhibemus, ope microſcopii, ab ipſis incunabulis cochlides recenter editas.

(Spiræ ex ovo minores præ ſpiris teſtæ adultæ.)

Cochlidis compoſitæ.

(Spiræ nec plures in adultis, quam in teſtis ex ovo.)

§. XXI.

Progredimur ad cochleæ, quod vocatur COLLARE (*a*); hoc ex mente Dni *Reaumurii* primarium inſtrumentum ad teſtæ opus concinnandum appellatur; unde ex materia tranſpirante vel nova fit ſpira, vel ex attritu *maculæ*, ſi forte nigra imbutum eſt, curva ſive ſpiralis ducitur linea nigra. Eſt autem COLLARE cochleæ, & quarundam aliarum cochlidum, imo nonnullarum concharum valvis inæqualibus, *Orbita coriacea* corpus animalis in duas partes dividens, ſicque in medio corpore conſpicua, teſtæ circum circa internum parietem adeo arcte juncta, ut continua ipſi videatur, & ſine interitu animalis a teſta diſſolvi nequeat; corpore anteriore animalis intra teſtam con-

COLLARE cochleæ quid ſit?

(*a*) *Quod in oſtrocologia appellatur* limbus, labrum *ſive* velabrum *cochleæ*.

contracto, ſolum viſui expoſita; orificium inteſtini recti quodammodo referens, ad cujus latus alterutrum eſt exitus ſat patulus excrementorum; coloris plus minus albi, cineritii, fuliginoſi, citrini, vel flavicantis. Quando cochlea, mediante planta (pes vocata, Bette-Fuß) lentiſſimo quidem reptatu loco ſe movet in alium, corporis anterioris partes, ſcilicet *caput cum cornubus* (vulgo) *collum oppoſitum plantæ* continuæ, & pone plantam, *non quidem collare*, ſeu circulus dictus cartilagineus, ſed gibbus quidam diſtinctus & parvus conſpicui ſunt: de parvi hujus gibbi partibus internis conſule WILLISIUM, STENONEM, AB HEYDE, LISTERUM, aliosque phyſiologos. Retineamus nomen COLLARE, *Gallis:* Collier; *Germanis:* Halß-Kragen/ eoque lubentius, quod LISTERUS (*a*) *collare in Domiportis cartilaginoſum* appellat, *ejus* ſimul indigitans *uſus* alios: de copioſo ſcilicet rugarum muco, de liquida ejus materia, inprimis operculo teſtæ efformando inſervientibus; de quibus plura ſuis locis. Ad idem COLLARE fortior & vel ſola tranſpiratio materiæ teſtæ formandæ inſervientis collocatur.

Gibbus cochleæ.

Dn. REAUMURIUS ad collare ſolam tranſpirationem materiæ collocat.

(*a*) *Exercit. anat. in qua de cochleis.*

§. XXII.

Non negamus, quod animalia ex una corporis parte præ reliquis fortius aliquando tranſpirent, ex. gr. juxta *collare* cochleæ; ſed materia, quæ exudat, neque ſolius eſt collaris, ſed integri corporis eſſe debet, neque rugarum vel papillarum mucus eſt ipſa materia, quæ pro conſervanda vita animalis tranſpirat; ſic exhalatio vel tranſpiratio & frictio vel attritus unum idemque non ſunt; plus eſt in frictione, quam in tranſpiratione. Si partes rugoſæ & papillæ collaris comprimuntur, uberrimam materiam, ſalivæ oris cochleæ ſimillimam, reddunt, quam non dixerim materiam, quæ exhalat vel tranſpirat; idem fit, ubi animal anteriores quidem corporis partes exſertas, ſed vel digito hominis inciviliter tactas, rurſus intra teſtam & quidem tam alte abſcondit, ut non niſi circulus ille cartilaginoſus, qui collare dicitur, orificio coli ſimile, in conſpectu maneat. Interim tamen magnam probabilitatem præ ſe ferre videtur, quod in medium profertur *de colore nigriſque maculis* COLLARIS; ſi ſcilicet collare ſit flavum vel citreum, aut ſi materia ex collari exudans ita ſit comparata, ut novam

Hujus ſententiæ examen.

ſpiram

ſpiram faciens hanc flavo ſimul colore imbuere queat, maculasque inſuper habeat collare, quæ tandem ex. gr. vel nigram lineam ſpiralem vel maculas in ſpiram actas pingant. De hujusmodi phænomenis infra mentem meam explicabo. Hoc loco libenter ſcirem: unde concurrant diverſi mixtique colores in pennata vel ſquamata pictura *Buccini Tritonis*, *Caſſidum Valvatarum*, *Trochorum*, innumerarumque aliarum Cochlidum & Concharum, inprimis *volutarum*, & inter has, quæ vocantur, *Admiralium?* Volutæ incomparabilis, quam ſemel vidi ſub nomine *Cedo nulli?* Cum tamen omnium *Collaria*, vel partes corporis loco Collaris habendæ, valde *ſimplicia* & *neglecti* ſunt *coloris*. Notiſſima eſt concha cænarum ſive *muſculus vulgaris;* animal vel albicantis vel flavicantis vel aurantii coloris; ſed unde eſt, quod parietes valvarum internæ ſordide margariticæ, extus vero, & quidem hyeme nigricantis, æſtate cyanei vel lubicærulei coloris? Quis penicillus pinxit *pectines chamasque?* Unde porro, quod pretioſi *Amuſii* ſupera valva ab altera parte polita & hepatici, ab altera coſtoſa & lactei coloris, inferior autem valva tota nivea? Si ſcirem, qui fiat, quod poma in corticulis multifarie picta, cum omnium pulpa vel albiſſima vel ſubalbida ſit, non heſitarem explicare picturas conchyliorum ſimulque plumarum, quibus gaudent papiliones erucarum. In eo cum celeberrimo *Reaumurio* convenimus, quod ſi natura animalis ita comparata, ut teſta, (quam partem animalis conſtitutivam diximus) ſit flava vel cærulea, vel aliter, vel multicolor, naturam ejusmodi cochlidis heterogeneum colorem nullatenus admittere, quin cochlis ſecundum naturam ſuam ſpecifice colorata ex ipſo prodiret ovo.

Exemplis illuſtratum.

Natura cochlidis colorem heterogeneum non admittit.

§. XXIII.

Corpus cochleæ in ovo formandum, tanquam ens compoſitum, ſine eſſentia concipi non poteſt, quæ conſiſtit in modo, quo ex natura, vel vi activa cochleæ, partes ipſi propriæ, non aliæ, jungantur; cum autem tempore excluſionis cochlea integra i. e. animal, quæ cochlea eſt, cum teſta integra prodit, ſequitur teſtam cochleæ propriam, tanquam partem conſtitutivam animalis, ejus naturæ vel vi activæ tribuendam eſſe, qua illa reliquis partibus animalis per eſſentiam corporis cochleæ juncta; ita ut recte dicatur teſta Os (in quo defixi ſunt muſculi) *cochleæ ſua natura proprium*, prout recte dicitur tegmen *teſtudinis* oſſeum, quocum animal ex ovo prodit & in quo defixi ſunt muſculi ejus, *Os* Teſtudini ſua natura proprium; conſequen-

Quid per naturam cochlidis intelligatur.

Teſta os cochleæ.

Teſtudinis os.

ſequenter teſta tanquam opus ſeparatum, vel tanquam proprie domuncula animalis, concipi non poteſt, quod contra eſſentiam & naturam cochleæ eſt. Si verum eſt hoc, nulla intercedit difficultas, qua ratione ex *commotis* in artificioſiſſimis & corpori cochleæ adæquatis vel ſubtiliſſimis vaſis, *compoſitis*, *filtratis*, *rurſus mixtis & attenuatis*, demumque per *fibras*, *tubulos*, *fiſtulasve*, *transmiſſis depoſitisque determinatis ſuccis* COLORES *in teſtam introduci poſſint*, quibus a natura tinguntur & pinguntur corpora colorabilia vel cutacea, vel piloſa, vel plumoſa, vel teſtæ vel proxime ad teſtas accedentia, ſcilicet. ſquamoſa: imo, ex liquido lacteo tandem generatur ſanguis purpureus.

Colores in teſtam introduduci poſſunt.

§. XXIV.

Objectio de vi motrice

Forte dixeris: Exhalationem etiam ſupponere vim motricem; igitur per vim motricem ſtabiliri tranſpirationem materiæ, quæ ſecundum ſyſtema Dni *Reaumurii* teſtificantis naturæ eſt, in libero aëre non evaneſcens, ſed præ aliis animalibus circum circa corpus, atmoſphæræ ad inſtar, perdurans, augmenta teſtæ conciliat, unde recte dicatur teſta opus cochleæ ſeparatum; colores vero, quandoque ſingulares, attritui partis corporis quæ *collare* dicitur tribuendos eſſe. Verum enim vero, prout in motu nihil reale exiſtit, niſi conatus, ſic gratis ſupponitur ejusmodi qualitatibus donata materia commota & exudans teſtificantis naturæ, inque libero aëre circum corpus perdurans; omnibus animantibus tranſpiratio communis eſt, profiqua & neceſſaria ad vitam; ſi impeditur, damnum mortemque involvit; itaque materia, quæ exſpirat, quid ſuperfluum inutile plane & nocivum eſt, neceſſario removendum, ut ſubſiſtant motus vitales; hinc res aliter ſeſe habere nequit in cochlea. Quidni autem & materia teſtudinis tranſpirans vel Armadhilli, aut Diaboli ſinenſis, corneæ eſſet ſubſtantiæ, &, prout materia cochleæ dicitur, in liberum aërem non avolans? Difficulter enim, quæ tranſpirat, materiam lentam, tenacem, tractuoſam & petrificantem mente concipere poſſum; facilius quidem leviculam pronamque ad exudationem, in corpore vel ſupervacaneam, vel, ſi non tranſpirat, omnino frivolam & nocivam. In arborum foliis primarius præparatur ſuccus nutritius, filtratur & ſtipiti ramisque communicatur, in quem finem folia habent utriculos coſtasque, ad inſtar venarum arteriarumque, vel potius vaſa nervis ſimilia fibroſa & fiſtuloſa; tandem decidunt folia, nullius amplius uſus; quamdiu autem perdurant, tranſpiratio ad vegetationem neceſſaria foliis denegari

reſoluta

qualis

materia

tranſpiret.

De foliis arborum.

gari nequit, uſque dum ſuccus nutritius nondum fuerit abſolutus; jam vero nemo materiam, quæ tranſpirat, cum materia ſucci nutritii pro una eademque materia habebit, quin potius illam, tanquam inutilem & nocivam, in aërem abiiſſe pronuntiaret. Revocemus nobis in memoriam, quod ſuperius de ſtructura teſtarum, & animalium teſtaceorum diverſis ſuccis, diximus; teſtas ſcilicet in teſtulas, hasque in fibras ſive vaſcula fiſtuloſa & tubuloſa reſolvi, earumque ſubſtantias affinitatem habere cum ſucco vitali animalis, quem, punctato animali, obſervare & à ſucco teſtificante ſalivæ vel ſponte eructatæ, vel vitali ſucco permiſtæ, diſtinguere licet, tunc potius intus-ſuſceptio, quam juxta poſitio teſtæ nobis ſubolebit, ut præparati accedamus ad modum, quem infra Rumphius (§. XXVIII.) proponet; quod jam extra dubium poſuiſſe confidimus, cochleam cum *integra teſta ex ovo* prodire. (§. XIX. XXIII.)

Subſtantia teſtularum cum ſucco vitali collata.

§. XXV.

Poſito autem, non conceſſo, COLLARE cochleæ, quod dicitur, teſtam pingere, ductusque ſpirales a punctis vel radiis *collaris* originem trahere, ſequeretur nihilominus tamen, teſtam abundare modo dictis vaſculis, unde ſit, quod ſuccus *collaris* puncti vel radii nigri, adhibita frictione juxta ſpiram noviter conſtructam (nam Dn. *Reaumurius* cochleam ex ovo cum integra teſta prodire recuſat) eandem ſpiram penetrare poſſit, ut ſpiralis linea indelebilis maneat: quodſi vero urgeamus animal cum integra teſta in ovo, nobiſcum non conveniemus, qua ratione *intra ovum*, *exſerto animalculi collo*, & *pumicante collari*, vel prima, quam collare non attingere poteſt, vel ſecunda ſpira aut conſtrui aut pingi poſſit: inſuper ſyſtema incomparabilis *Reaumurii* circa teſtas *circinatas*, *clathratas*, *feneſtratas*, *plicatas*, *muricatas*, veriſimilitudinem vix ac ne vix quidem admittit, cum e contra per ejusmodi teſtas interna omnium ſtructura, ex vaſis videlicet tubuloſis & ſuſceptibilibus, explicari queat, quibus mediantibus ſuccus nutritius pro figura, magnitudine, partium ſitu & loco totius in integram teſtam introducatur, fibris teſtularum vel in lineas rectas excurrentibus, vel transverſis, vel ſinuoſis, vel arcuatis, vel reticulatis: pari ratione & colorari teſtas apparet: mixtura vero colorum oritur, quoties ſucci plus minus attenuantur & filtrantur, cui temperaturæ & humores glutinoſi & teſtificantes officia ſua præſtant, cum alius ſit mucus ſalivæ, alius cochleæ vulneratæ, teſtantibus id *Scheuchzero*, *Li-*

Collare cochleæ porro conſideratum extra & intra ovum.

Qua ratione colores in teſtam introduci poſſint.

Saliva diverſa a

muco cochleæ vulneratæ. *ſterò, Leeuwenboeckio. Primus* (*a*) ſcribit: Mucum, ſalivæ ad inſtar, ore emittunt, alius quippe eſt a muco, qui ex vulnerata profluit cochlea, cæruleſcente, non ſtatim in cutem vel gluten abeunte.

Succus vitalis. *Liſterus* (*b*) ait: ſuccus vitalis oſtrei aquæ affuſus læviter cæruleſcit, perinde ac in cochlea; & *pag.* 37. ſanguis mytuli *in quibusdam locis rubrum & fluvum*, & quovis *auro pulcherrimum* colorem repræſentat, autore *Leeuwenboeckio*. Quod ad me attinet, haud van aducor opinione, poſteriorem corporis cochleæ partem, in qua interanea, utpote tenerrimam, vel etiam ejus extremam partem, ad ſpiram primam, maxime tenellam (quæ in nonnullis cochlidibus plus minus elongato abſolvitur funiculo, *de quo pluribus infra*) proximam eſſe cauſam incrementi & teſtæ & colorum.

Quæproxima ſit cauſa & incrementi & colorum teſtæ?

(*a*) *Phyſica ſacra p.* 911.
(*b*) *Exerc. Anat.* III. *p.* 78.

§. XXVI.

Quodcunque de interna teſtarum ſtructura in medium produximus, id ſufficienter illuſtravit RUMPHIUS (*a*) obſervatione circa *ſudantes* BUCCINI TRITONIS teſtas; verba ejus translata ſequentis ſunt tenoris: „ Habent mirabilem qualitatem, quæ tamen & aliis teſtis „ communis eſt, quod nimirum pluvioſa tempeſtate tam amplum ſu„ dorem edant, ut guttæ in teſtæ ſuperficie conſpiciantur; id obſer„ vavi & in illis teſtis, quas ultra 16. annos poſſideo. Hoc phæno„ menon toties apparet, quoties imminet pluvia, licet teſtæ cotidie „ exſiccentur; ut vero nitor earundem externus conſervetur, poſt „ biennium per aliquot horas in muria macerentur teſtæ; quem pro„ ceſſum appellamus: TESTIS POCULA PORRIGERE, **de Hoo„ rentjes te drinken geven.**" Hunc ſudorem egomet ipſe ſuper teſtis expolitis, i. e. vel membrana vel cute ſua privatis, multoties obſervavi, nunquam ſuper illis, quibus adhuc integra eſt illa membrana externa, vel corium ſatis craſſum nondum detractum, prout ex. gr. muſculorum, aut buccinorum, aut purpurarum, quibus natura ſua gaudent. Ejusmodi igitur velamina, uti jam diximus, tanquam perioſtea conſideranda veniunt, tolluntque dubium de poſſibilitate, teſtas, quatenus pro oſſibus cochlidum externe collocatis habendæ, ſimili

Rumphii obſervatio circa cochleas ſudantes.

Teſtæ velamina cum perioſteo comparantur.

(*a*) *Muſ. Amboin. p.* 94.

ſimili quadantenus modo vegetare & augmenta capere, prout oſſa cæterorum animantium: minimum prout indubitata oſſa Teſtudinum vegetant & augentur ſub clypeis corneis pro perioſteo omnino habendis.

§. XXVII.

Sed urgetur, quod puncta vel radii COLLARIS non meram hypotheſin pro fundamento habeant, verum in ipſos oculos cadant, ſemperque ſub extrema parte lineæ ſpiralis, quæ deſcribenda fuerat, obſerventur, ibidemque Officinam ſuam habeant; pars vero corporis poſterior prope collare, non niſi candidam & ſplendentem materiam edat, ac parieti internæ renidentem albedinem ſuperinducat, unde ſit, quod ſuperficies interna ab externa ſuperficie vel differat colore, vel cum hoc concolor ſit. In medio hæc omnia relinquimus: quodſi vero viſus me non fallat, in oculos mihi non cadunt, vel punctum ſaltim umbratile, vel macula quædam vel illius radii principium in cochlea vulgatiſſima dicolore urticarum, & nihilominus *ſpiras omnes* habet ex lateritio colore fuſcas, latiuſculas tenuesque, & flavicantes etiam teneriores, quæ alternant, non ſolum in externa ſed & in interna pariete conſpicuas, nulla materia vel candida vel argentea interne ſuperinductas, verum integra teſta coloribus transparentibus variegata & ſemidiaphana. Nec mente concipere poſſum, qua ratione punctum nigrum ſpirales lineas nigras, ut ne quidem cum materia teſtificante flavi coloris confundatur niger, per motum (ſi moveri poſſit collare ſpiraliter) vel attritum ad internum parietem, adeo ſcientifice deſcriberet; & qui factum, quod ſpiralis linea fuſca a primæ ſpiræ puncto partis poſterioris cochleæ breviſſima omnes circumvolutiones ad extimam uſque, quæ thalamus eſt, tranſcurrat. Infra uberior *de coloribus teſtarum* materia ad manus erit; in anteceſſum pauca de *incrementis teſtarum*, earumque *eminentiis* ex propoſitionibus perſpicaciſſimi, licet oculorum ſuorum acie demum orbati, RUMPHII conferenda ſunt, quæ propoſitiones attentionem merentur, eoque magis, quo reprehenſionem non promeruit Rumphius, acſi cum Teſtis conchyliorum pro vana gloria vel inani temporis tractatione luſerit, & de hiſtoria animalium teſtaceorum & de re herbaria meritiſſimus.

COLLARIS puncta vel radii in cochlea urticarum non obſervata.

Difficultas lineas ducendi.

§. XXVIII.

§. XXVIII.

Incrementorum testarum modus: Rumphio propositus. primus.

Triplicem nobis tradit modum, quo diversimode testæ conchyliorum incrementa sua capiant. PRIMUM ponit in eo, quoties facto animalis per appositionem novæ materiæ testa augetur (**door een toezet van nieuwe stoffe**) & quidem *ad fimbriam vel oram ultimæ spiræ;* qui modus muricibus, cochleis omnibusque turbinatis communis est. Signanter id observare licet in murice, utpote cujus extima spira semper tenuior & elimatior apparet præ spiris posterioribus. Hujus fabricæ materia tenax est lentor, quem per os animal eructat, quique animalis facto in raram abit testam, per quadram circiter limbi antiqui ad aperturam vel domiportam testæ, qui limbus demum costosus & dentatus redditur; & quidem amplificatio hæc limbi successive perficitur, (confer. §. XIX.) SECUNDUS modus observatur, non facto animalis singulari, sed per extensionem testæ in singula latera angulosve (**door uitrekking over 't gehecle lyf naer alle kanten**) non mutato orificio vel apertura, sed eadem integra servata, volumine vero totius testæ extenso; ita vegetant *Porcellanæ* & Cauri vel caudi, qui sunt ex porcellanis minoribus. TERTIUS modus est: per appositionem & extensionem simul (**door toezet en uitrekking te gelyk**) quo modo utuntur omnia bivalvia, musculi, ostrea & reliquæ conchæ; utpote quarum testæ circa limbum facto animalis augentur, ipsæ vero testæ vel potius testarum lamellæ crassiores evadunt, augmentum petentes ex tenuissimis nervulis (**dunne aderties**) partim in spondylo defixis; sed notandum, quod vetustæ testarum partes, secundum tres modos, inprimis nonnullarum cochlidum & concharum murices antiqui, minorem patiantur influentiam à corpore animalis præ recentioribus; quod experientia docet, eminentias, ut *murices*, aculeos clavosve, perfectæ si franguntur, *nunquam redintegrari*, pro documento, quod *prætensam materiam transpirantem & testificantem inter & dictas eminentias nullum intercedat negotium.* Me judice ex tribus modis, quos proponit *Rumphius*, sufficiunt *secundus & tertius*, ut testæ amplificentur; quippe murices, Turbinatæ omnes cochlidesve, pari ratione ac conchæ incrementa sua capiunt; in specie circa modum *primum monemus*, testam obtento à natura sibi determinato volumine, non amplius augeri, sed animal, in statu quo, vitæ periodum absolvere; quoad *secundum*, quoniam Porcellanæ orificium non quidem in latum, verum in longum ampliatur, amplificari

secundus.

tertius.

Murices testarum.

Sufficerent modi secundus & tertius.

Monita circa tres modos.

testam

teſtam non per juxta poſitionem ſed per vegetationem & intus ſuſceptionem; & quod *ad tertium* attinet, in ſubſequentibus de nervulis tendinibusve, vel *venulis* (quas vocat *Rumphius*) in ſpondylo concharum defixis, pluribus acturi.

§. XXIX.

De eminentiis ſuper teſtis ab eminentiis Collaris oriundis;

Diximus modo materiam tranſpirantem nullum negotium habere cum eminentiis teſtarum. Celeberrimus *Reaumurius* admonefaciens phyſiologos, quod modi, quibus cochleæ incrementa ſumunt, ad omnia animalia teſtis veſtita quadrare debeant, (§. XII. XXXI.) ſup ponit in COLLARI *certas eminentias*, quæ prout nigra puncta lineas ſpirales, ita & eminentias in ſupera parte teſtæ operentur. Hæc hypotheſis veriſimilitudine niteretur, dum modo antica corporis pars aſpreto ſimilis eſſet, & conquieſceret, non vero rependo, comedendo, congrediendo divaricaretur, & ſubexplicaretur: ſed poſito, eminentias ſuper teſta ex eminentiis ſuper collari, vel ſuper ipſo collo, aut ſuper integra corporis parte antica oriri, neceſſario ſequeretur, OSTREA MURICATA, SCORPIOS, HAUSTELLA ACULEATA, MURICESque CLAVATOS habere anticam corporis partem *muricatam*, *aculeatam*, *claviculatam*, quod veritate non nititur, imo impoſſibile audit. Idem Doctiſſimus *autor* intermittentia certis anni temporibus incrementa animalis & exinde reſultantia teſtæ interruptæ veſtigia per circulos arborum annuos ingenioſe explicat. Verum enim vero, ſupra plus una vice innotuit quidem, quod animal *extimam* teſtæ *ſpiram* (quæ ejus *thalamus* vel, ex. gr. in Nautilo, ſcaphula, **de boot**, ſive **het ruim des boots** dicitur & pariete intergerino abſolvitur) circa limbum per appoſitionem amplificet, quamdiu ætatem provectiorem & magnitudinem, cum omnia animalia tandem vivere deſinant, non attigerit; ſed augmenta arboris cum hac fabrica comparari nequeunt: novimus enim arborem non per juxta poſitionem, ſed mediante intus ſuſceptione vegetare; & circuli ejus concentrici, fibræ variaque vaſcula tubuloſa, imo folia, in quibus ſollicitius præparatur ſuccus nutritius, nos docent, qua ratione arbor ſua natura vegetet; ſic & teſta cochleæ ſua natura ſingulari gaudet mechanismo, quo mediante crementa capiat: hoc quidem ſenſu animalia teſtacea dici poſſunt architecti teſtarum, non quod opus ſeparatum ſucceſſive aggrediantur: quodque cum domuncula ex ovis erumpunt cochleæ, recte dicitur: *que les habitations ſe forment & s'accroiſſent avec*

Quæ hypotheſis fallit.

Incrementa teſtarum an cum arboris vegetatione conferenda.

Quo ſenſu teſtacea dici poſſint architecti teſtarum ſuarum.

avec leurs Architectes. Superſedemus exemplis a putaminibus avium ovorum, ab officulis ceraſorum, olivarum, prunorum, amygdalorum, perſicorum, ſimiliumque fructuum deſumendis, quibuscum facilius comparari queunt cochleæ una cum teſtis ſuis.

§. XXX.

Specia-tim quædam per-tractanda.

Hactenus de formatione teſtæ in ovo (§. XIX. XXIII.) de interna teſtarum ſtructura (§. XI. XIV. XX.) & de crementis picturaque (XXIII. XXV, XXVIII.) earundem ſummatim egimus. Modo ſpecialia quædam perluſtranda nobis ſeſe offerunt, pari lance componderantibus argumenta, quibus ſecundum HISTORIAM Regiæ Scientiarum Academiæ de anno 1719. vel præſtantiſſimus Anatomes Anteceſſor Dnus MERY in dubiis ſuis contra ſyſtema Dni *Reaumurii*, vel ipſe REAUMURIUS pro firmandis theſibus ſuis uſi ſunt. Omnia ſimili, qua nos decet, modeſtia perluſtrabimus, an forte ſingula ad perpendiculum veritatis exigere integrum nobis foret. Cum jam comprobaſſe confidimus, cochleam ex ovo cum teſta ſua in conſpectum venire, ſtructuramque teſtarum internam ita eſſe comparatam, ut comprehendere liceat, qua ratione teſtæ per intus ſuſceptionem augmenta ſua, inſpiſſatosque vel attenuatos colorum ſuccos admittere poſſint, eoque certius vegetare queant, quod viſibili plerumque gaudent perioſteo qualicunque, & limbo quidem domiportæ turbinatorum ac bivalvium quid, pro re nata, additur: verum quod hoc (uti in *cochlea*) neque per *intus ſuſceptionem neque ſimpliciter per juxta poſitionem*, *nedum per compactionem*, prout in lapidibus arenariis & fabuloſis (*a*) fiat, ſed ipſo facto ſingulari animalis, hujus vel illius ge-

(*a*) *Mediante quodam pulvere lutoſo & glareoſo vel ſimili lithocolla; cum non omnes lapides per juxta poſitionem ſint formati. Quippe marmora ſimilesque lapides, ſæpius corporibus heterogeneis, venisque indolis peregrinæ prægnantes, ſive* montes *ſaxeos, ſive* rupes, ſcopulos ſtratave *conſtituentes, ex magmate quodam, diverſis corporibus plerumque animalium mixto*, ſemel *quidem conſederunt; quæ ſententia non aberrat a ſyſtemate celeberrimi.* Reaumurii de formatione lapidum. *Alii autores lapides vegetare dixerunt. Dominus* Bourguet *novum plane & ſingulare introduxit ſyſtema in libello memoriali*: pour ſervir à l'hiſtoire naturelle des petrifications p. 12.

generis, teſtacei. Omnia nunc in clariore luce exponere, ſimulque comprobare allaborabimus, cochleæ teſtam ad quosdam angulos pertuſam utique reſarcinari poſſe, non quidem per juxta poſitionem, ſed prout oſſa fracta coadunantur; itaque cochleam non a juxta poſitione augmenta ſua capere. Forte etiam primariam in quadam corporis parte offenſuri ſumus officinam pro conferendis ſuccis teſtificantibus, unde in ipſam teſtam ex ovo recipiantur, producantur & ad vegetationem ac picturam teſtarum abſolvantur.

Teſta pertuſa reſarcinanda, prout oſſa fracta. Primaria officina vegetationis.

§. XXXI.

Procul ſit a me, ut vel in mentem veniret, tantum mihi in rebus phyſicis tribuere, quantum & Dn. Reaumurio & Dn. Mery debetur; intempeſtivum tamen eſſet, non proſequi velle opinionem experimentis confirmatam philoſophando, unde rerum naturalium ſcientia locupletetur; ſic non diſſentire videbimur; ſed evolvendam veritatem in agitata cauſa curæ cordique habere cordati viri judicabunt. Doctiſſimus MERY in dubiis contra ſyſtema Dni REAUMURII, magni hujus viri ſententiam ſequitur: Cochleam adultam ſpiris *numero pluribus inſtructam eſſe præ cochleis ex ovo, & circumvolutiones ſpirarum primas in cochlea juvene non eſſe minores præ circumvolutionibus in cochlea adulta;* ſed ſimul infert, id aliter ſeſe habere juxta valvas vel conchas muſculorum, qui in cænis noti ſunt. Diſtinguit itaque Dn. MERY inter cochleam ex cochlidum ſive univalvium, & inter muſculos ex concharum ſive bivalvium numero. Hanc diſtinctionem vero Dnus REAUMURIUS non admittit, quod omnium oſtracodermatum geneſin unam eſſe eandemque (*a*) conſequenter formationem teſtarum muſculi inter & geneſin cochleæ teſtæ perfectam intercedere analogiam, & *quidem recte*, ſtatuit: quod ſi enim natura aberraret in alterutro horum animantium, principium a juxta poſitione, vel proxime a geneſi lapidum & metallorum, deſumptum in ſe corrueret.

Dni MERY dubia.

Omnium conchyliorum geneſis uniformis.

(*a*) *vid. Dn.* Reaumurium ſupra §. XII. & HISTORIAM: *Il n'y à point de phyſicien qui n'etende de lui même, ce que nous avons dit des coquilles des Limaçons, à celles de tous les animaux, qui en ſont revetus.*

§. XXXII.

Cochlea in ovo tot habet ſpiras, quot adulta. Facultas in anteriore,

Non ſolum (§. XX.) volumine minor extra ovum, ſed & minima cochlea in ovo, totidem habet ſpiras, quot habet ad provectam ætatem cochlea devoluta; omnesque ſpiræ, una cum domiporta, omni ævo corpori animalis ſunt proportionatæ; ſic omnes teſtæ vegetatione augmenta ſumunt, ſalva ſucceſſiva amplicatione limbi, ſive domiportæ, vel thalami, termini extimi, i. e. ſpiræ ultimæ cochleæ, quam anterior pars corporis frequentat rependo & loco in alium ſe movendo, paſtum quærendo, congrediendo, rurſusque intra thalamum, ut deliteſcat, ſubrependo: poſterior vero corporis pars terminos ſpirarum ſuarum nunquam excedit, ſed in illis defixa, interanea animalis tenerrima complectitur. Exempla teſtarum ex ovo prætet *Tabulam Marſilli:* (§. XII.) & uterum Buccini *Liſteri Hiſt. Tab.* 881. nec non portionem uteri, *ibid. Tab.* 879. videſis in tabella noſtra adjuncta, non ſolum varias cochlides infinite parvas, ita ut non omnes in naturali magnitudine oculis nudis diſtincte aſſequi licuerit Filiæ nobis dilectæ, nedum meis, ſed quoque minutum *cornu Hammonis litoris Ariminenſis erectum, vulgare, ſtriatum, ſiliquam Raphaniſtri perfectiſſime referens*, JANI PLANCI *de conchis minus notis*, in *lapide Gedanenſi*, rariſſimum exemplum, exhibente: quæ omnia *ſub microſcopio* picta; *A*, portiuncula lapidis eſt, in quo hæret modo dictum corniculum; *B*, idem ſub lente auctum; toris circiter decem; labrum teſtulæ in lapide occultatum ad literam *a*; thalamus vero olim animalculi ſolutus apparet ad literam *b*, cavitatem perbelle oculis armatis exhibens. Adjunximus ſimilia cornicula inter ejectamenta maris Ariminenſis offenſa ex Obſervatione Dni *J. Ph. Breynii*, cui ejusmodi cornua *orthoceratitarum* nomine veniunt. Qui *Liſteri Hiſtor.* non habet, evolvat *ſupplem. actorum erudit. Tom.* II. p. 248. ubi Liſteri tabula, de qua ſupra verba fecimus, mutuata apparet. Jam vero quibus ad manus ſunt horum buccinorum ſpecimina prægrandia, ipſe judicet 1. utrum adultæ teſtæ vel plures ſpiras vel plures acroteria, vel denique illuſtriora pigmenta habeant, præ teſtis ex utero vel ex ovo; re ſic oculis legitime prehenſa, quilibet fateri cogetur, 2. circumvolutiones ſpirarum conchyliorum minorum omnino minores eſſe præ ſpiris adultorum; conſequenter 3. quod utique ſpiris primis non ſolum, ſed omnibus quid accedat, certo autem certius per intus ſuſceptionem, cum per juxta poſitionem ſpiris primis aliquid addi, ipſe Dnus REAUMURIUS conſtanter neget, tertius vero modus nemini

In poſteriore corporis parte.

Buccinum conſiderandum.

mini ſuboleverit. Sic Cymbium, ſive voluta conchæformis valde inflata, labio velut in concham explanato, turbine baſeos manifeſto: (hinc nobis *cochlis compoſita*) ex ovo *turbinem* habet per diametrum circiter $\frac{1}{4}'''$ ventremque proportionatum; ætatis provectæ *turbo* eſt vel $5'''$, venterque vel 7. pollicum. Mammæ (quæ Turbines ſunt paucarum ſpirarum ex ventre oblongo turgido in parvum mucronem leviter turbinatum aſſurgentes) ex ovo parum ſuperant ſemen papaveris; & in ſpecie virgineæ mammæ teſtaceæ mucro ſive papilla ita ſubſidet, ut fere non agnoſcatur; quæ ſi conferantur cum adultis, deprehendemus, ipſarum turbines cum ventre ſe ita habere ad adultarum turbines ventresque, prout ſe habent corpus pedesque fœtus humani duorum vel trium menſium erga gigantem, in cujus molem excluſus fœtus tandem excrevit. Jam vero turbines ejusmodi cochlidum, vel etiam *auriculæ* concharum, quas *pectines* ſalutamus, ita ſe habent erga animal ejusque teſtam integram, prout ſe habent ſpiræ tres priores cochleæ ad animal ejusque thalamum, vel ad ſpiram quartam, & vice verſa; conſequenter, quod illis proprium eſt, idem erit & huic commune, & vice verſa; ergo cochlea adulta non plures numerabit circumvolutiones, quam cochlea ex incunabulis. Buccinula *delineata* vix lineam alta, aut quod excedit, pulcherrima, granulata & ochroleuci parumque ſanguinei coloris ſunt, ſub microſcopio contemplanda; horum maxima vel $9''$ nec pluribus ſpiris in ſtrombo gaudent, nec pulchriora ſunt amictu.

Definitio Cymbii:

Mammæ.

Pectines.

§. XXXIII.

Interim tamen Dnus MERY teſtulas ſive laminas, ex quibus musculorum teſtæ conflatæ, acu tetigit, nec aliter potuit, quin recte inferret, ergo teſtas cum animalis partibus mollibus creſcere & augmenta capere, prout idem fiat juxta artus omnes partesque omnium animalium. *Ejus* obſervationes Dnus REAUMURIUS affirmare quidem viſus, ſed phænomena eſſe accuſat, quod aliquando plures in muſculis parvis apparere ſoleant lamellæ, quæ neque intus ſuſceptioni, nec juxta poſitioni originem debeant; nimirum tertium quid dari affirmat; ſi ſcilicet materia, quæ lamellas diſtinguit, terminos excedit, & ex attritu vel frictione ad loca fabuloſa, vel ab ipſis fluctibus deletur; quando autem in adultis muſculis talis materia transgreſſa (*cet excedant*) eſt ſublata, haud difficulter comprehenditur, qua ratione duæ lamel-

Dn. MERY teſtulas obſervavit.

Reſponſio Dni REAUMURII.

læ in unam coaluerint; effectus enim ex frictione vel attritu in musculis adultis palpabilis dicitur, visuique expositus.

§. XXXIV.

Periosteum quodcunque urgetur.

Plus simplici vice diximus, omnia animalia testacea *periosteo* qualicunque vestiri; in terrestribus, quorum perpauca, non facile ob tenuitatem distinguitur, nisi aceto fricentur testæ: tunc enim tollitur cuticula & vivaciores apparent testæ, quæ antea videbantur emortui coloris, vel obscurioris, & veluti nebulæ involuti. Idem accidit nonnullis marinis, uti Porcellanis & his similibus. In reliquis marinis, lacustribus & fluviatilibus oculos mox feriunt aut crassum, aut tenuius corium, sive cornu aut pergamento similia vel quasi cutacea involucra in superficie exteriore. In specie musculos membranaceo involucro & tenaci vestitos esse, quis non videt? sub hoc testæ, lamellis sibi arcte incumbentibus, vegetant; externa superficie, mediante membrana, satis lævi. Cum e contra ostreorum testulæ vulgarium *Finitorem* non excurrant, quin squamatæ appareant, scabræque sint in oris. Illæ testulæ plerumque quotannis in plurimis, in ostreis singulis fere mensibus, in musculis vero vel bis in anno augentur. Aliorum testulæ teneriores sunt, ut in musculis, chamis &c. rursus aliorum, uti in ostreis, pectinibus, pectunculis, crassiores. In omnibus tamen ætatis habenda ratio est. De ejusmodi laminis testaceis LEUWENHOECKIUS in genere. „ Testarum putamina in se magna multitudine cumulata esse, quorum ultimum concretum maximum est "; & in specie de Ostreis: „ Singulis noviluniis ostreum crassitie unius „ putaminis accrescere - putamen constare ex fistulis sive fibris fistulosis - materiam esse ipsissimum succum vitalem expressum - cum hic „ succus leviter coctus in grumum quendam coalescit - alter est succus „ lapidificus vitali permistus, unde materia lapidea sive testacea. [35]

Testulæ differunt inter se.

De his LEEUWENHOEKIUS.

(Vegetatio in diconchis clarior.)

Me judice vegetatio testarum in diconchis clarius, quam in cochlidibus, observatur, cum plerarumque cochlidum testæ ante frangi debeant, quam earundem incrementa consideranda veniant. Interim & in cochlidibus ejusmodi testulas (uti jam ante pluries diximus) sive lamellas vel putamina satis distincte cernimus. Sic RUMPHIUS p. 69. *de cochlea lunari*: de schaal is gemaakt van twee dikke huiden (*ita appellat interiorem & exteriorem parietem*); de binnenste huid is schoon Parlemoer —— zy laat zich ook in schilferen verdeelen / als men se in stukken slaat / welke alle dezelve NB. kolcur behouden / i. e. fracta testa

RUMPHIUS de cochlea lunari,

teſta in laminas reſolvi poteſt, quæ NB. eandem ſervant colorem; & *notanter de Caſſidibus lævibus*, ſive cinereis, *p.* 83. **Daare oude lip blyft ſtaan / en** NB. **daar onder** NB. **eene nieuwe dunne ſchaal voort kruipt /** i. e. eorum labium, quæ & fimbria dicitur, perſtat; *ſub illo* nova tenuis teſta prorepit vel prorumpit; quæ in hac cochlide nihil aliud eſt, quam quod a Dno MERY vocatur lamella, crementō muſculi vel alterius conchæ inſerviens. Sed, quæſo, quænam eſt *cauſa movens* materiæ, ex qua talis tenuis teſta ſub craſſo labio erumpit, ut neceſſariò labium exinde altius craſſiusque evadat, & quidem ad os caſſidis valde vaſtum, quod vocatur? ſane, quid valeret juxta poſitio ab exudante materia derivata? certo certius itaque in vegetatione, omnibus animalibus communi radicat talis accretio; vegetationem vero ſine intus ſuſceptione, nec mentis ideis concipere licet; cogor igitur fateri, quod exceptio intermedii modi a celeberrimo *Reaumurio* oppoſita Dno MERY non officiat.

De Caſſide lævi cinerea.

Recte Dn. MERY teſtas vegetare ſuſtinet.

§. XXXV.

Per coadunationem laminarum teſta mytuli & major & craſſior evadit; quæ vero *Leeuwenhoeckio* dicitur teſtula ultima & maxima, nobis eſt minima ad capitulum teſtæ aduncum ſub membrana inter laminas præexiſtentes prorumpens; quæ laminæ utique dignoſci poſſunt. Valva mytuli trium vel ſex vel novem linearum ardenti candelæ oppoſita, ſex vel octo vel decem faſcias aut laminas diſtincte exhibet, eſtque valva perfecta integri animalis minuti; ſi valvæ adultæ auctum volumen per lineas dividatur, totidem vel plures faſciæ nudis oculis apprehenduntur auctæ. Si a juxta poſitione originem haberent faſciæ, æquabiliter ſuper tota valva deponerentur In ſuperficie externa, ſed tunc abſorberetur valvæ integumentum pergamentum, ſive membranaceum, quod omnibus anni temporibus adeſt. Nec ad internum parietem locum habere poteſt juxtapoſitio; excluderet enim animal ex valvis, difficulter licet propter tendines valvis connatos; nihilominus tamen valva augetur & quidem lamellatim ſupra ſubterque ipſas teſtulas i. e. intra binas lamellas juxta prorepente nova teſtula; tale augmentum vegetationi & intus ſuſceptioni proprius accedit. *Uniones* ad internos parietes concharum, imo & mytulorum margaritiferorum, Dn. PLANCUS (*in præfat. de conchis minus notis, p.* 4.) concharum *vitia* judicat; nos *uniones* ita ſe habere reſpectu teſtarum judicamus, quemadmodum ſe habent oculi cancri, re-

Teſta mytuli porro conſiderata.

Lamella non

A juxta poſitione.

Tendines valvis connati.

Uniones in conchis.

Quid? cum oculis cancri collati; respectu novæ crustæ astacorum quotannis formandæ; iisdem enim mensibus, *Junio & Julio* reperiuntur & uniones & oculi cancri; hi abeunt successive in crustam novam, illi non inserviunt, nisi ad internæ testæ concharum noviter vernicem perlaceam super inducendam. Jam in oculos cadit, uniones ex ipsa substantia testæ prout verrucas ex cute prodire, pro documento, quod in substantia testæ intus susceptio negotium suum non solum habere possit, sed re ipsa habeat; porro, nisi valvæ ampliores fierent, etiam qua concavitatem, prout juxta convexitatem & ad ipsa latera augentur, perlacea illa materia iterum excluderet animal extra valvas. Sed forte dirimeret animal superflua, prout *cassis tuberosa labii partes?* Urget Dnus REAUMURIUS contra Dn. MERY extuberantes laminas, sive maximas, sive minimas, attritum pati. Sed cui usui esset juxta positio materiæ testificantis, tanquam separatum opus? idem esset, ac si una cum exudante superflua materia levissima avolaverit, si deleretur & aboleretur materia testificans juxta posita vel per minimum attritum, inter tot vehementes fluctus ad sabulosa littora, adque fundum maris non adeo alti; actum esset de opere tali separato, quæ domuncula dicitur, actum esset de opera & industria animalis architecti, ipsaque natura non perficeret opus suum, imo frustranee transpiraret animal etiam, si materia exudans non abiret in liberum aerem, abiret tamen in sabulum, in undas, & atmosphæra circum circa corpus conturbaretur, tolleretur. Nemo dubitat ungues animalium squamasque piscium, ex musculosis corporis partibus vegetare; si detrimentum passi, vel resecati ungues, liberaliter tamen in longum, in latum & in altum vegetant; & quis est, quem lateat, ungues ex lamellis hasque ex corneis fibris constare, ut squamas piscium silentio prætereamus (*a*). Attritus denique mytulis minoribus majus detrimentum conciliare potest, præ mytulis adultis & majoris voluminis. Illi a fluctubus super sabulo, in distantia duorum pedum, plus satis per axin suam agitantur præ majoribus mytulis, minimum toties, quoties majores; cum tamen illorum testæ teneriores sint reliquorum testis pene siliceis; hoc tamen non obstante minutuli mytuli crescunt in magnitudinem; quodsi vero externi parietes, vel qua partem, detererentur, animal per internum parietem nullo facto redintegrare posset

An deleantur extuberantes laminæ? Quod juxta positionem destruit.

De unguibus animalium & squamis piscium.

Ex frictione damnum mytulis? tamen crescunt minores.

(*a*) *Vid.* Histor. R. A. scient. 1716. p. 20. & lib. mem. ipsius celeberr. REAUMURII *ibid.* de la formation des ecailles des poissons p. 234. su.

ſet parietem externum, quin potius internus, a mucoſa & teſtificante materia, quam animal valvis clauſis tranſpirare dicitur, continuo augeretur, ut tandem animal extra valvas ſuas pelleretur; apertis autem valvis a fluctubus abſtergeretur tranſpirans illâ materia & lapidificans, nullo modo teſtæ proſpectura.

§. XXXVI.

Ingentis *Pinnæ* e. gr. *Liſteri Hiſt. Tab.* 374. figura quadantenus æmulatur in longum & latum crispæ lactucæ folium. In ea lamellæ pedetentim ſibi invicem ſuperinducuntur, attollentes teſtulas præexiſtentes, prout ad oculum videre licet, conſtituuntque faſcias majores ſucceſſive: eadem pinna 4. linearum eandem jam habuit formam & figuram e. gr. folii lactucæ; nec deſinit eſſe eadem pinna vel ad decem pollices aucta; vegetat itaque in ingentem molem; ad vegetationem autem teſtæ ſucci nutritii non niſi in animalis corpore quærantur; qui ſucci, ut producantur, teſta indiget canalibus, commune principium habentibus. Hoc principium, me judice, partim in cardine vel ad ſpondylum valvarum, partim ad loca ubi defixi ſunt tendines, in conchis, in cochlidibus vero partim ad claviculam, ſive hepatis inteſtinalis partem, alias *meconium*, partim ubi muſculi partis poſterioris, e. gr. cochleæ, tutiſſime quærendum: quodque ad membranas fluviatilium marinorumque mytulorum attinet, plus quam veriſimile eſt, illas a cardinis fibris originem trahere; & quod illæ cum cardine continuæ, & quod ejusdem cum cardine, corneæ ſcilicet, ſubſtantiæ ſunt. Cæterum vide *Leeuwenhoeckii* & *Liſteri* mytulum nondum natum ex ovo exemptum, cum placenta ſua, in indice *Tabularum Liſteri Tab.* 41. *f.* 8. *& in exerc. anat. III. Tab.* 4. *f.* 9.

Pinna conſiderata.

Primaria vegetationis officina.

§. XXXVII.

Alteram contra ſyſtema juxtapoſitionis difficultatem Dn. MERY offendit juxta quatuor paria muſculorum, quæ mytulorum teſtis connata (*a*) ſunt. LISTERUS non niſi duo talium ligamentorum obſer-

Dubium Dni MERY de muſculis mytulorum.

(*a*) *Conf.* SWAMERDAMI Bibl. Nat. II. Tab. VI. f. 11. *ibi loca quibus muſculi in oſſe lapideo* COCHLEAE *inſeruntur*: validiſſimi, *quorum ope animal prorepit & ſe promovet*; introrſum protenſi *& ſub teſtæ ſcapo transeuntes*; dico validi *muſculi, qui medium corporis in domunculam*

ſervavit paria, & inſuper adhuc vinculum cardinis ſive ſpondyli (*charnier*). Duo, inquit, muſculi ſeu ligamentorum paria teſtam claudunt, aperiuntque; nempe unus ad earum caput mucronatum, alter prope imam ſive latam marginem; præter hos vero muſculos alii quoque teretes atque teneriores muſculi, ſive corpora nervoſa ſunt, qui per medium animalculum tranſeunt. De cardine vero *Liſterus* utitur verbis Dni *ab Heyde:* vinculum, quo teſtæ connectuntur, in cavitate quadam ſitum eſt, coloris fuſci, ſubſtantiæ valde tenacis & duræ eſt; mollioris tamen ipſis teſtis eſt. Fortiſſimum muſculum alii vocitant tendinem teſtas conſtringentem, item robuſtum ligamentorum par transverſim poſitum & adnatum, ut in teſtam radicare videatur. Dicitur & cylindricus muſculus ex faſciculis minutarum fibrarum conſtans, quæ minutiſſimæ ſemper in minores ſubdividuntur, eodem fere modo, ut talci lamellæ ſemper in teneriores ſecernuntur. Hujus muſculi baſes adeo arcte teſtis adhærent, ut in crudo mytulo vix integræ ſeparari poſſint. *Liſt. Exerc. III. p.* 34. & *p.* 77. vocat muſculorum par craſſum & cuneiforme, qui tanta vi occluſas detinent teſtas, ut valde ægerrime divelli, vel a fortiſſimo viro, a ſe invicem poſſint: In anat: vero muſculi fluviatilis ſcribit: *ſiquidem per* illos (*muſculos*) *quicquid alimenti in teſtas transferendum ſit, ire neceſſe eſt.* RUMPHIUS eorum, tanquam tenuium venularum, quæ ſpondylo connatæ ſunt, meminit: **de ſchaalen krygende haar voedſel uyt dunne adertjes / die aan den ſpondylo vaſt zyn.** In *pectine* oſtendit LISTERUS craſſum muſculum centralem, & juxta hunc alium, ambos teſtis fortiter adhærentes. *Ind. Tabb. Tab.* 17. (*b*)

Quot habeant; eorumque ſitus.

Fibras minutiſſimas in minores ſubdividi.

Per muſculos alimentum in teſtas.

§. XXXVIII.

culam retrahunt, oſſi lapideo inſerti; & qui reliqui. *Nonne ergo dixeris* teſtam *cochleæ animalis ejusque corporis* partem conſtitutivam *potius, quam domunculam, vel opus a corpore animalis ſeparatum?*

(*b*) *Itaque Dnus Mery ſufficientem rationem habuiſſe videtur, quod ſyſtemati juxtapoſitionis oppoſuerit anatomen muſculorum, ſeu mytulorum. In mente ponamus mytulum magnitudinis mediocris; ubi* c. *ſit vinculum cardinis,* a. *tendo teſtas conſtringens,* bbb. *reliqui muſculi ſive tendines; tunc* (*ſecundum Dn.* MERY) *quando creſcit animal, & muſculos animalis augmenta ſua capere, ſimulque valvas in partibus ſuis creſcere neceſſe ſit. Impoſſibile enim eſt, quod* a. *teſtæ connatus tendo ſe plus ſimplici vice ſolvere,*

§. XXXVIII.

Modo experimentum Dni *Reaumurii* cum testa pertusa & redintegrata considerandum venit, cujus mentionem injecimus §. IX. Hoc experimento contra Dn. MERY militat, & ea propter firmum stare infert, quod cochlearum testæ formentur ab exhalationibus, quæ ex corpore animalis, intus postea latentis, prodeunt, & circa ipsum indurantur. Pertudit testas, & ecce (*Mem.* 1709. *p.* 371.) on voit alors cette liqueur s'epaisser & se figer, ou pour parler selon les idées les plus claires, les parties les plus subtiles s'evaporent, & les plus grossieres restent seules, & forment sur la partie du corp de l'animal, qui est *decouverte*, *une petite croute* très fine — c'est cette croute, qui forme *la premiere couche* de la nouvelle couche; on voit au *bout de quelques jours* cette croute s'epaissir par le moien de *differentes couches*, qui se produisent *sous cette premiere*; & enfin au bout de quelques jours, *le nouveau morceau* de coquille, qui s'est formé, a à peu prés la meme epaisseur de l'ancien morceau de coquille, que l'on à ôté au limaçon. Applicatæ pelliculæ ad vulnus *in interno testæ pariete* superficies interna, quæ corpus respexit, testa fuit obducta, in altera parte vero pelliculæ nihil tale evenit (*Mem.* 1709. *p.* 374.). Le côté de la peau, qui touchoit le corps de l'animal s'est couvert de coquille, & *il ne s'est rien formé sur la surface exterieure.*

Experimentum Dni REAUMURII considerandum.

§. XXXIX.

Non inficias imus, quod si testa cochleæ (sed *notanter*, intra tertiam spiram cum dimidia forte, non in prima nec secunda, neque in secunda cum dimidia pene, sub quibus spiris animalis tenerrima & non nisi cum discrimine vitæ quamcunque læsionem admittentia interanea sunt) pertusa sit, aër externus per vulneratam testam fortius agat in partes corporis, quæ ipsi & frictioni juxta foramen in longum & latum *vere*, *& valva aucta in alium locum transportare possit; si forte possibile foret, id obtenturum esset animal in* b. *Non intrabo in id, quod Dn.* REAUMURIUS *regessit, exemplum desumptum ab astacis, squillis, cancrisque, quos loricas suas quotannis deponere dixit, non obstantibus ligamentis, quæ transponantur; de quo* HISTORIA *dicit, quod sit* un exemple un peu different à la verité.

Spirarum contenta.

Aër externus fortius agit per vulnus in corpus cochleæ.

tum expoſitæ ſunt, in primis cum vel extra thalamum moventur, vel recedunt, & quod ex papillis palpabilibus, quibus ſolum anterior pars corporis animalis abundat, materia viſcoſa, tenax & teſtificantis ſubſtantiæ exprimatur; qua de re jam ſupra egimus paſſim. Nec admirationem nobis injicit, quando (juxta *primum caſum*) teſtæ foramine libero, vulnus reſarciatur. In reliquis animalibus, in quibus nulla juxta-poſitio (niſi hoc vocabulo nimis liberaliter utaris) locum habet, multa vulnera quæ non maximi momenti, nullis adhibitis remediis, ſolum *Ulcere* in Eſcharam abeunte, ſub Eſchara in ipſam cutem perfecte ſanantur. Indigitat Dn. REAUMURIUS, quod primum ad externam ſuperficiem vulneratam nova lamella teſtacea ſuperinducta, & redintegratio teſtæ ſucceſſive facta fuerit, ita ut decem vel duodecim diebus demum vulnus reſarcitum. Hoc non temere factum. Si ſuffeciſſet uberrima e papillis exudans materia viſcoſa & perdurans ad reficiendam teſtam, quare non ſtatim abiit in turundam, ut citius vulnus non plane lethale teſtæ, nec adeo craſſæ, occluſerit? quod animal ſaliva oris eructata longe citius redintegrat limbum ultimæ ſpiræ læſum, vel eundem circa ambitum amplificat. Non recoquere volumus, quæ de interna teſtarum ſtructura, toties quoties opus fuit, in medium protulimus; videſis aſſerta noſtra & probata, nec obſtupeſcas, ſi dixerim, teſtarum fibras fiſtuloſas, reſectas licet, non prohiberi ad proceſſus ſuos, facto vulneris interruptos, proſequendos, eosdemque intra 10. vel 12. dies reficiendos & abſolvendos ſub depoſita ex muco animalis expreſſo *eſchara* in ſuperficie teſtæ externa, quam Dn. REAUMURIUS primam vocat lamellam: omnino curam mediante intus ſuſceptione continua perſolvere potuit ſuccus vitalis lapidifico ſucco permiſtus ex fibris fiſtuloſis teſtularum læſis, ſubter eſcharam teſtaceam applicatus, usque ad internum vulneris parietem, quem utique pars corporis vicina muco clauſit & poliendo ultimam addidit manum, ut ita loquar. Idem fit in vulneribus cutaneis ipſamque cutem perforantibus, neminique ignotum eſt, muſculis, una cum venis reſectis, & coadunatis rurſus, vel novos venularum ramulos propullulare. Experimentum itaque Dni REAUMURII quoad caſum primum, vulnus quidem teſtæ comprobat reſarcitum, non vero, ni fallor, id factum eſſe ſola virtute materiæ, quæ ex corpore animalis exhalat, & quidem incipiendo a ſuperficie externa & procedendo ad ſuperficiem internam; cum inſuper perquam difficile ſit introſpicere per primam ſuperam lamellam in ſtrata lamelloſa, & obſervare, quid ſub illa ſpatio multarum dierum ſucceſſive deponatur introrſum, quem proceſſum vix

Cura vulneris examini ſubjecta.

mentis

mentis oculis cernere licet. Demum ſequeretur, quod omnes ſpiræ, quæ ſecundum hypotheſin Dni *Obſervatoris* extra ovum demum corpori animalis ſuperinducuntur ex exudante materia, non aliter fiant, quam quod hæc materia ad formandam primam novæ ſpiræ lamellam aſcendat ita, ut inter illam & ultimam lamellam parietis interni ſpatium maneat tamdiu, quamdiu reliquæ lamellæ primæ non fuerint ſubappoſitæ; quod non dixerim, quodque mirabile materiæ exudantis artificium foret.

§. XL.

Quoad *caſum ſecundum*, mecum non convenio, quare materia exudans & teſtificans non tranſcenderit paniculam, vel potius penetraverit (*le peau de cannapin*) ſive in ſuperficiem teſtæ vulneratæ, ſive in ſuperficiem paniculæ? (il ne s'eſt rien formé ſur la ſurface exterieure) cum in eadem panicula poros vel viſibiles crediderim. Invertamus itaque formationem teſtæ ex materia exudante per juxtapoſitionem: tunc prima lamella cujusvis novæ ſpiræ generatur corpori animalis proxima, ſecunda priori, & ſic porro reliquæ ſibi ipſis ſuperimponuntur, & quidem ſuperficietenus adusque parietem externum abſolutum. Cum vero per paniculam penetrare non potuit materia teſtificans, non penetratura per primam, ſecundam, vel tertiam ſeu jam formatas & coadunatas lamellas, ut reliquas ſuperimponat, tumque demum ceſſaret ire plus ultra; ceſſaret materia craſſa, atmosphæræ ad inſtar circum circa corpus perdurans. Nolo verba facere ſuperflua de pictura & coloribus, quos ſanato vulneri iterum inducere, vel imprimere deceat materiam exudantem virtute juxta-poſitionis; nam *collare* juxta ejusmodi vulnera officia ſua præſtare nequit. Neque teſtas *tribulorum* marinorum, aut muricum ſimiliumve vulnerarem, multominus eorundem murices, ut reſtituerentur eodem modo, prout cochleæ teſta reſtitui creditur.

§. XLI.

Sic, cum pace *tanti viri*, non video experimentum, quod Dnus REAUMURIUS contra Dnum MERY adeo urget, ſatis firmo ſtare talo, acſi *teſta cochleæ a juxta poſitione materiæ ex corpore animalis exudantis*, tanquam ſeparatum opus, & *ne quidem facto animalis*,

exſtrueretur læſaque ſimili modo iterum redintegraretur, cum nec limbus extimæ ſpiræ ſine facto animalis vel ampliari, vel læſus refici queat.

Facinora caſſidis tuberoſæ circa labium vetus;

Et quid dicendum de CASSIDE TUBEROSA, ſive *cornuta*, quæ mirum in modum labium quo indiget novum adeo ſcientifice ſibi conciliat, ut prius id, quod de veteri labio ſibi obſtat, ore ſuo abolere & ſupprimere didicerit, ſicque de induſtria ſua gloriatur, nec otioſa eſt juxtapoſitionis inanimis contemplatrix domunculam ſibi conſtruentis: quem callidis proceſſum RUMPHIUS ſic (*p.* 80.) exponit: **Dewelke dan over de vorige lippen overgaande / moet het dier noodzaaklyk door een ingeboorne doch wonderlyke Eigenſchap / het geen / dat hem in den weg tegenſtaat / wederom konnen weg ruymen en nederleggen.**

Aliter in caſſide lævi cinerea;

Econtra, in CASSIDE *lævi cinerea*, cujus ſupra mentionem fecimus, labium vetus perdurat, quando ſub eodem nova & tenuis lamella prorumpit: **dat haar oude lip blyft ſtaan / en daar onder eene ſchaal voortbruipt / dewelke alle hoeken en kanten aan de overzyde ontmoetende door de kragt van 't levende dier weder weeft voordt en zich nederlegt / weshalven men dikwils de oude naaden in den mond boelen kan.** Ejusmodi tamen additiones & operationes animalis ad oras domiportæ nullatenus tollunt intus ſuſceptionem teſtæ ex ovo, ne dum patrocinantur juxtapoſitioni, qua crementa capere teſtæ dicuntur.

Quæ facta non tollunt intus ſuſceptionem.

Et quid ſi violaremus teſtas TRIBULORUM, MURICUM & ſimilium, prout cochleas hortenſes, vel horum ipſos murices? Aut *Tribulus* murices ſuos breves; SCORPIUS & OSTREUM muricatum longiſſimos & acutiſſimos aculeos, ſive proceſſus aculeiformes in prima juventute breviores habuerunt, aut nullos. Ultimum non dixerim: ſed qua ratione murices breviſſimi augmenta ſumpſerunt, ut longiſſimi, imo acutiſſimi tandem facti? minime per juxtapoſitionem, opus lithiaſi applicandum, bene tamen per intus ſuſceptionem, quæ vegetationem docet. Simili modo vegetant aculei & claviculi *Echinometrarum;* & quid tandem inanime opus juxtapoſitionis patraret in *conchis clathratis*, *feneſtratis*, *circinatis*, *literatis* &c. vel in *figuratis*, uti *in avicula*, *tudide polonica*, *ephippio anglorum* & his ſimilibus.

Exempla a tribulis, muricibus, ſcorpio, oſtreo muricato; Claviculis Echinometrarum. Et pluribus.

§. XLII.

Dni REAUMURII hypotheſis.

Syſtema juxtapoſitionis celeberrimi REAUMURII fundamentum habet ſuper *hypotheſi:* quod animal quidem ex ovo prodeat, ſed falſum quod ſit, animal cum teſta ſua integra in conſpectum venire

(§. 11.)

(§. 11.) (*a*). Hanc hypotheſin dubiam eſſe, ſatis luculenter demonſtraſſe confidimus. Reſtat nobis, ut adhuc rem, ſatis quidem arduam, veritatis lampade colluminemus. Mentionem facit Dn. *Reaumurius* tenuiſſimi muſculi, mediante quo cochleæ in prima juventute *non alibi*, niſi *proxime ad centrum ſpirarum* (i. e. ad ſpiram primam:) alligatæ dependent; qui muſculus vero ætate provecta de loco *intra ſecundam & tertiam ſpiram* teſtæ transpoſitus & defixus deprehendatur; qua obſervatione tollendam dicit objectionem Dni MERY *a tendinibus, muſculisque mytuli* deſumptam. Muſculum talem in aliis cochlidibus appellamus funiculum, qui teſtæ connatus deprehenditur, quique in cochlea, æque ac in aliis animalibus teſtaceis, non habita ætatis ratione, conſtanter in ſpira teſtæ prima quærendus. Hepar, falſo creditum, antiquis *meconium*, ſive *ſacculus lacteus ſpiralis* HARDERI, omnes ſpiras ab earum centro ad usque collare, quod dicitur, ſive partem corporis anteriorem, mobilem, arctiſſime involvit occupatque, adeo ut illo ſacculo ſpirali curatius & magis acuta duci nequeat ulla ſpira. LISTERUS hunc ſacculum pro inteſtinorum cæcorum compagine habet, quam anteceduut branchiæ, cor, viſcus quidam cinereus: (an hepar verum?) inteſtinum rectum, ingluvies, ſtomachus, omentum, penis, vulva, veſiculæ ſeminales, ovarium, uterus. Terque quaterque curioſitatis gratia anatomen cochleæ, omni teſta privatæ, fuſcepi: ſed, licet aliquando, præmonſtrante *Swammerdamo*, portiunculas teſtæ, quibus muſculi defixi fuerant, non ſolverim, tamen facinoris, cum *ipſo*, aliud non reportavi brabeum, quam cadaver animalis intra biduum vel triduum extincti; & ſufficiant

Ejus argumentum de muſculo ad primam ſpiram cochleæ. Quid ſit?

Partem poſteriorem cochleæ abſolvit ſacculus lacteus ſpiralis.

Cochlidum quarundam anatome.

(*a*) *Hanc hypotheſin jam fovit* Sil. Ital. de Bello Punico Lib. XII.

Exiguos format per prima volumina gyros,
Mox tremulum vibrans motu gliſcente liquorem
Multiplicat crebros ſinuati gurgitis orbes,
Donec poſtremo laxatis circulis orbes,
Contingat geminas patulo curvamine ripas.

Licet ſententia autoris rite trutinata & ad intus ſuſceptionem applicari poſſit.

ciant tibi, LECTOR docte curioſe! *Tabulæ Liſteri*, quæ ſeparatim cum indice in forma folii minore æri ſunt inciſæ, ibidemque Tab. 1. fig. 1. offendas ſacculum ſpiralem cochleæ, quæ *Gesnero pomatia* audit; Tab. IV. fig. 1. & 3. cochleæ terreſtris ſtriatæ; Tab. VI. f. 1. 2. 4. Cochleæ viviparæ fluviatilis; Tab. VII. fig. 1. 2. Purpuræ fluviatilis, & in *Harderi* Tab. fig. 1. cochleæ terreſtris. Item *Bibl. Nat.* SWAMMERDAMMI Tab. IV. V. VI. VII. His omnibus quidem perſpectis, in HISTORIA Reg. Acad. ex memoriali libello Dni REAUMURII legimus: Ces limacons ſont attachés à leur coquille par un muſcle, qui, lors qu'ils ſont extremement jeunes, ne peut être, qu'extremement proche (*quod omnino verum:*) du centre de leur ſpirale. *Cependant il ſe trouve toujours entre le 2me & le 3me tour de cette ſpirale, quand ces Animaux ont pris toute leur naiſſance.* Hoc abſolute fallit; muſculus enim vel funiculus a puncto extremo dependet, non aliunde; poſterior illa corporis pars autem, uti jam diximus, exquiſite ſpiralis eſt, ut neceſſario in punctum primæ ſpiræ teſtæ incurrat; hinc impoſſibile prorſus eſt, quod illud ſpiræ mollis punctum, non aliunde dependens, tranſcendere poſſit ſpiram teſtæ ſecundam, etſi centum annos vixerit animal. Quodſi vero trans locatus aliquando fuerit viſus funiculus, involvit caſum in anatome violentum funiculi: vide *Rumphium* paragrapho ſequenti. Sacculus vel tres ſpiras implet (ſcil. in cochlea:) occupatque, tenuiſſimis hinc inde muſculorum propaginibus teſtæ defixis; cum parietes ſpiræ primæ, ſecundæ & tertiæ plane non ſint politi vel argentati; prout eſt thalamus animalis, in quo portio mollis corporis anterior quieſcit, ſed poroſi ſunt; in illis ſpiris ſacculus ſpiralis quieſcit in ævum, quando anterior pars pro lubitu & pro neceſſitatibus animalis movetur, domunculam ita dictam ſecum trahens. Re ſic comperta, priores tres ſpiræ pro parte teſtæ cribroſa habendæ, ubi & ſuccus nutritius lapidifico mixtus & colorum materia præparata & filtrata per vaſcula ſuſcipientia fiſtulasque hisque ſimiles fibras in teſtam immittuntur, & producuntur, ut teſtæ, tanquam partes conſtitutivæ animalium, vegetare poſſint, una cum animali. Sic nobis datum erit intelligere, unde ſit ingens teſtæ volumen ætate provecta, quod in ovo fuit rapæ ſemine minus.

Muſculus ille a puncto ſpiræ primæ dependet.

Parietes teſtæ poſteriores quomodo comparati;

Per quos officina virtutes vegetationis abſolvit.

§. XLIII.

§. XLIII.

Ab illo itaque, quod diximus punctum primæ ſpiræ, ejusque ſalute, vita animalis, ejusque vegetatio dependet. Si læduntur vaſtiores ſpiræ, modo, quo monſtravimus, reſarciri poſſunt; verum, ſi lædatur prima ſpira, vel hujus punctum, ita ut pertundatur, vel portio teſtæ ipſi auferatur, prorumpit portio ſacculi molliſſimi extra vulnus, vulnusque non reficitur, ſed inflammatio inſequitur, & animal certo certius mortem ſubit. Quod autem ſacculus integer per integram ſubſtantiam ſuam & quoad ſingula interanea valde delicatulus eſt, habilis quoque erit, ad ſuccos, quibus animal opus habet, legitime præparandos, concoquendos & transfundendos; cum e contra anterior corporis pars aſpera, rugoſa, fortiter membranoſa & muſculoſa, injuriarumque liberi aëris patientiſſima ſit. Breviter, puncto ſpirali cochleæ frivola manu læſo, idem eſt, acſi *Nautilo craſſo* aut cornu Ammonis (**poſthoozntje** Rumphii) funiculum rumpere præſumpſeris. De Nautilo *Rumphius* hæc: **van het achterſte deꝛs ſpſs / 't welk tegens het eerſte afſchutzel legt / gaat een lange aader dooꝛ alle gaatjens van de afſchutzels / en dooꝛ alle de hamertjes tot aan het binnenſte middelpunct / dewelke het eenigſte iſ / waar mede de viſch aan de ſchaal vaſt hangt / en die almede licht afbꝛeekt / alſ men den viſch uptrekt / zynde dooꝛts de hamertjes leeg.** Similis eſt ſtructura teſtæ quæ cornu Ammonis. Quod in ſpecie ad *cameras Nautili* attinet earumque parietes intergerinos infundibuliformes, nunquam mihi in mentem veniret, id eſſe juxta poſitæ materiæ exudatæ opus; induſtriæ potius & operæ animalis illud adjudicarem, ita tamen, ut ab intus ſuſceptione jure communi cum reliqua teſta participet, quod vel in ovo unam alteramve jam lucratum ſit animal concamerationem (*a*). Aucto corpore animalis longior

Sacculus læſionis impatientiſſimus.

Punctum ſpirale cum funiculo umbilicali collatum. De Nautilo craſſo & cornu Ammonis.

(*a*) *A Doctiſſimo* J. Ph. Breynio, *quem* Gualtierus *ſequitur*, *ejusmodi* teſtacea *animalia vocantur* polythalamia: *quam nominis rationem quidem non improbo*, *quod nec frivole nec moroſe de aliorum induſtria ſentio; interim tamen ex natura rei ſupra paſſim indigitavi*, *quo ſenſu proprie* thalamus *in oſtracologia ſumatur*, *ne in ideas de multis thalamis conchyliati animalis minus adæquatas incurramus. Prout enim* thalamum *in ſenſu proprio dicimus certum receptaculum*, *in quo pro lubitu corpus noſtrum quie-*

gior redditur funiculus, & nova exoritur camera; qualibet limpidum quid continente, ſine dubio in ſubſidium funiculi; quod liquidum, teſta commota, vel per luſtra auditur, in nonnullis, quæ curioſitatis gratia in muſeis aſſervari ſolent. Thalamo, in quo animal integrum quieſcit, ſemel ad determinatam capacitatem ampliato, nulla amplius additur concameratio. Ita quoque ſeſe res habet cum breviſſimo muſculo tereti reliquorum turbinatorum, vel cum ipſo puncto ſpirali cochleæ; ut itaque Dni REAUMURII aſſerto *in libello memor.* 1719. *p.* 386. calculum addere hæſitaverim: „ la queüe de l'animal „ *n'étant point adherente*, au ſommet de la coquille, comme quelques „ uns l'ont crû, *il lui eſt aiſé de ſe deplacer*, ſur tout dans te tems, „ que l'endroit, *par lequel l'animal eſt attaché à la coquille*, change." Firmum manebit, ſacculum lacteum cochleæ *Harderi* & funiculum Nautili a puncto primo ſpirarum dependere, ita *ut locum non mutent*; multoque minus tendines muſculi myttulorum in conchis defixi mutabunt loca ſua.

Thalamus Nautili.

§. XLIV.

De operculis quarundam cochlidum; Coronidis loco quædam de *operculis quarundam cochlidum* memoravit Celeberrimus REAUMURIUS circa finem libelli 1719. cochlearum ſcil., quæ imminente hyeme januas domiportæ claudant; exi-

te deponere & condere, rurſusque omni tempore ad beneplacitum ex eodem erigere poſſumus ad ambulandum; ſic in cochleis thalamum *dicimus* ſpiram ultimam vaſtiſſimam, *in qua corporis antica pars tota cum planta (quæ pedum loco eſt) conditur, & ex qua exporrigere & promittere corpus valet animal. Prout vero receptaculum omni tempore undique clauſum thalamus dici nequit, ſic ex. gr.* Nautilus *magis improprie dicitur habere teſtam polythalamiam. Cameras quascunque quidem claudere poſſumus, &, ſi libet, in ſempiternum; thalamos vero nobis præcludere nemo præſumat; deſinunt eſſe thalami, ad quos aditus nullus; in tantum modo ab Etymologia teſtarum* polythalamiarum *diſſentimus, ab uſu vocabuli non alieni, ut recte intelligamus* autores, *nosmetque ipſos.*

existimans, succum lapidificum, ex quo oriantur ejusmodi opercula, eandem cum succo testificante non habere consistentiam. Supra jam innuimus, unde fiant ejusmodi opercula in cochleis, quæ, inito vere, iterum rejiciuntur. Sed nominabimus quædam *opercula*, *quæ cum animali perdurant*, quæque animalia constanter secum circumferunt singulari spectaculo, capitibus suis connata, nunquam deponibilia; quæ aliquando ponderosa sunt, ut umbilici marini; alia, leviora, ad corneam quandam substantiam accedunt, ut ungues odorati. *De operculo cochleæ lunaris Rumphius p. 69.* op zyn hooft draagt hy een groot rond schild / waar mede het zyne deur vast sluit / NB. een hand breed en een vinger dik / steenhard NB. als of het een witte keisteen was (durius est itaque ipsa testa) aan de buitenste zyde wat bultig als een linze / wit en zomtyds met vlakke kuiltjes; aan de binnenste zyde is het plat / doch een weinig met gieren uitstekende / die schielyk in malkander loopen / en een navel formeeren / met een ros of bruinachtig velletje bedekt / dat daar aan NB. vast zit (prout membranæ super testis, quas periostei vices subire diximus) en deeze zyde NB. aan 't vleesch van 't Dier. Cum autem multæ sint varietates umbilicorum marinorum, & plerumque officinales, multitudo quoque erit animalium testaceorum galeatorum. Illius farinæ quoque sunt umbilici apud *Mercatum metallotheca p.* 138. & apud *Scillam vana speculazione desingannata del senso Tab.* XVII. Hic erronee suspicatur esse ipsarummet cochlearum rudimentum, quod exinde tanquam ex ovo in perfectas cochleas abeat; ejus sententia singularis est, quod dicta opercula testarum cochlearum figuram, in spiras convoluta, referant; vid. pluribus *Assaltum in notis ad Mercatum:* conf. *Hans Sloane It. Jamaic. p.* 254. *Tab.* 241. *f.* 1, 2, 3. Interim nemo sibi facile in mentem revocabit, ejusmodi scutum, vel galeam potius, esse opus separatum, cum a capite separari nequit, quocum etiam crescit, & quidem ad amussim, ut omni tempore domiportæ æquabile sit operculum; ergo etiam augmenta ex capite animalis capit, consequenter connectitur cum vasis capitis, nihilominus figuram umbilici satis accurate describens, ita ut omnis juxtapositio exulare appareat. *Murices* diversis utuntur januis, quæ *ungues odorati* vocantur, quod ad figuram unguium humanorum aliquantisper accedunt, in nonnullis tamen spiralis linea descripta: illorum præstantissimus & officinalis petitur a *murice ramoso;* corneæ autem sunt substantiæ, unde materia exudans, quæ dicitur, testificans, cum his unguibus nihil commune habere potest. Quod vero ejusmodi scuta, vel galeæ partes animalium

quæ perdurant cum animali, vegetationem comprobant.

ſint, non fallimur, illas ex ipſo ovo originem habere, quippe omni ævo accommodata eſſe debet domiportæ janua & vice verſa.

Liber Baro Wolff. Ethic. III. §. 458.

Cum Creaturæ ſint verbum Dei, hiſtoria naturalis vera eſt verbum Dei in ſcripturam relatum, hypotheſes vero philoſophorum ſunt opiniones commentatorum cum illo non confundendæ.

TABELLA.

Cujus icones exponuntur Lucubratiunculæ hujus. pag. 28.



COM-

COMMENTARIOLUM
IN LOCUM
PLINII
Hiſt. Natur. Libr. IX. Cap. XXXIII.
DE
CONCHARUM DIFFERENTIIS.



oncharum genera, in quibus mira ludentis naturæ varietas, tot colorum differentiæ, tot figuræ, planis, concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio orbe cæſis, in dorſum elatis, lævibus, rugatis, denticulatis, ſtriatis, vertice muricatim intorto, margine in mucronem emiſſo, foris effuſo, intus replicato; jam diſtinctione virgulatâ, crinitâ, criſpâ, cuniculatim, pectinatim, imbricatim undatâ, cancellatim reticulatâ, in obliquum in rectum expanſâ, prædenſatâ, porrectâ, ſinuatâ: brevi modô ligatis, toto latere connexis, ad plauſum apertis, ad buccinum incurvis. Navigant ex his veneriæ præbentesque concavam ſui partem & auræ opponentes per ſumma æquorum velificant. Saliunt pectines & extra volitant, *ſeque & ipſi carinant.*

NOTÆ ET CONJECTURÆ AD HUNC LOCUM:

CONCHARUM GENERA. Latius hic ſumptum Conchæ vocabulum teſtam quamvis ſignificat, ſive turbinatam ſive planam. Ita Veteres, præcipue Latini, Rhetoricæ ſtudioſi, auribus magis quam intellectui indulgentes, ideas per æquivoca confundere, quam voces in eadem ſignificatione aliquoties repetere, maluérunt.

GENERA. Quia Plinius ex autoribus, quos ſedulo volvit, confuſe ſpecies Teſtaceorum recenſet, videntur ejus temporis eruditi de generibus conſtituendis non fuiſſe ſolliciti. Colligebant Conchylia, primario eſus, ſecundario admirationis & *ornatus* cauſa: ſufficiebat rudis notitia & vulgaris nomenclatura. Teſtarum conferre genera earundemque ſubordinare ſpecies Recentioribus demum in mentem incidit, poſtquam de Hiſtoriæ naturalis Incrementis & augmentis cœperunt laborare.

LUDENTIS NATURÆ. Natura, hoc loco, ſenſu Ariſtotelico eſt Vis plaſtica Animæ ſenſitivæ in Teſtaceis habitantis, quæ ludere dicitur, quia varietatem formarum ob varios uſus, nobis non enumerandos, appetit & producit, non ſine oblectatione & applauſu ſpectatorum, ejus operationes velut in theatro intuentium. Sed, quia vis animæ plaſtica, hodierno ſeculo melius informato, ſpectrum naturæ eſt, operatio ejus jure pro figmento, ejusque luſus ſeu Comœdia pro mero habetur ſomnio. Cautius diceret moderna phraſi *Plinius:* in quibus magna & ſapiens differentia. Neque enim varietas ſpecierum caſu accidit, ſed, ob certos fines, a Deo, autore hujus mundi, deliberato conſilio, eodemque optimo, introducta adhuc conſervatur, quanquam omnes illi fines humano intellectui ſint imperſcrutabiles.

VARIETAS. Recte, *magna varietas!* Nemo enim hactenus omnes Conchyliorum differentias plene expoſuit. Miratur Plinius has ipſas ex ſolo maris mediterranei gremio cognitas. Quantam hanc varietatem prædicaſſet, ſi, quas novus orbis, & undique jam conquiſita curioſitas hodie offert, inſpexiſſet. *Nos quotidie in admirationem adducimur*, inquit Fabius Columna Lib. de Purp. Cap. XIX. varias intra manus noſtras ex variis locis habentes, ut, qui omnium icones & deſcriptiones tradere vellet, maximum admodum volumen impleret, extra alias ab aliis deſcriptas. Pater *Bonanni*, in Recreat. mentis & oculi, ſupra quin-

quingentas teſtaceorum differentias expoſuit: in Muſeo Kircheriano plures addidit: neutiquam omnes exhauſit. *Rumphius* in Inſulis Indiæ Orientalis intra 28. annos, 360. ſpecies ſummo ſtudio collegit, plures deſcripſit, plures aliis deſcribendas reliquit; multas *Schynvoetius* in Notis ad dictum Authorem, easdemque raras & ſumme pretioſas, addidit; ſed omnem numerum nec hic inire audet. Sunt a *Fabio Columna*, Libris de Purpura & Aquatilibus, quædam rariores teſtæ, data opera deſcriptæ. Angliæ proventum *Liſterus* peculiari Libro expoſuit: idem & omnes, quotquot in Muſeis Patriæ vidit, teſtas manu filiæ depingi & æri incidi curavit, congeſto volumine ſatis ſpiſſo. Plura offerunt Muſea tam privata quam publica, de quibus *Grewius*, *Jacobæus*, *Wormius*, *Valentinus* videndi ſunt. In maris fundo terræque gremio plura latitant, reperiuntur lapides teſtis referti, quas integras nondum videre contigit. Miratur Plinius varietatem concharum incredibilem: mirantur cum ipſo poſteri, ſed plerique ſine philoſophia laudant, ludunt, appetunt, veluti nuces pueri, aut ut cimelia divites. Pauciſſimi de Incrementis Hiſtoriæ naturalis cogitant. Qui cæteris accuratiores ſunt, nomen lepidum, more Belgarum, teſtulis annotant: a deſcriptione abſtinent difficultate repulſi. Etenim tot figuras, tot colorum differentias, tot appendices Teſtarum diſtincte verbis congruis exponere, ſuperat vires vulgaris Philoſophi; difficilius adhuc ex multiplici teſtarum compage eruuntur earum differentiæ ſpecificæ, quæ niſi conſtituantur juſtæ, manet vaga, obſcura & nunquam capienda Teſtaceorum Hiſtoria: multiplicantur, præter neceſſitatem, entia, & crambe toties totiesque cocta apponitur. Adhærent rebus falſa nomina, nec erit Judex de nomine rerumque convenientia ſtatuturus. Laudo proinde *Liſteri*, *Rumphii*, *Majoris*, *Charletonii*, & noviſſimum *Langii* inſtitutum, quo de generibus Teſtaceorum conſtituendis laborare inceperunt. Sed, ut verum fatear, *Liſterus* pingit, non evolvit, nec definit ſpecies. Differentiæ ejus ex titulis & Tabulis præmiſſis cognoſcendæ, paſſim ſunt negativæ, paſſim ſpeciales, generibus ſiniſtre attributæ: in Buccinis, Neritis, Pectinibus magna confuſio. Veteres author non legit, nec Recentiores ſollicite contulit; multa inſufficienter, multa obſcure, ex verborum inopia inſcripſit. *Rumphius* nimis laxus eſt, ſuæ collectioni & inſtituto, quo animalia ſimilia in Teſtis habitantia quomodocunque compulit, ſufficiens. *Major* deficit in rebus, abundat in terminis ex Ramiſtico Dichotomiæ ſtudio præter neceſſitatem, in confuſionem Theſauri teſtacei, conceptis. *Charleton* nomenclaturas magis, quam Teſtarum differentias ſcrutatus: cum *Aldrovando*

&

& *Rondeletio* ignorat pleraque. Claſſes ex lectione Veterum expoſitæ paſſim confluunt, paſſim ſpecies inſerendas excludunt. *Langius Tournefortii* methodum Botanicam imitatus, cæteris videri poterat accuratior; ſed in definiendo, examinando & diſponendo, valde eſt proletarius: differentiis obſcuris, negativis, longe petitis utitur: conchas anatiferas male cochleis annumerat, ex umbilicis marinis *Bonanni* p. 114. incaute Cornu Ammonis facit. Ex animalculo *Bonanni* teſtam formatum, *Rumphii* textu non inſpecto. Simili incuria, & in *Kircheri* Muſeo verſatus eſt. Reliquos autores parce legit. Taceo miram ſpecierum confuſionem, quæ inutilem *Langii* laborem demonſtrabit ſecundum ejus conſilia Theſaurum teſtaceum diſpoſituro. An felicius in hoc argumento verſatus ſim, æquus lector judicet.

TOT COLORUM DIFFERENTIÆ. Quas oculus deprehendit, mens miratur, nulla lingua vel manus valet exprimere. Ecce Indicem colorum, a ſcriptoribus hujus argumenti paſſim nominatorum, quem ſedulo congeſſit *Langius:*

Achatinus color - Acu pictum opus - Æneus color - Æris rubigo - Alabaſtricus - Albeſcens ex cæruleo - Amaracinus - Amethiſtinus - Anthracinus - Aqueus - Arbuſculas repræſentans - Argenteus - Argenteus ſplendor - Argento ſimilis - Argento Obryzo ſimilis - Ater - Attalica veſtis auro argento & multicolori holoſerico texta, drap d'argent - Argentum textile latine dicta - Aurantius - Aureus.

Badius - Balauſtinus - Badiolus - Burrus.

Cæruleus ex argento - Cæſius - Calceus - Caltulus - Candidus - Candidiſſimus - Candor margaritarum argenteus - Carneolus - Carneus Caſtaneus - Ceraſinus - Cereus - Ceruſſatus - Chryſolithicus - Cyaneus - Cinnabarinus - Cinereus - Subcinereus - Cinereus ex livido Colores aqua diluti - Conchyliatus - Coracinus - Corallinus - Corneus - Croceus - Sub-Croceus - Cruentatus.

Eburneus - Eliotropium Gemma.

Ferrugineus - Figlinus - Flammeus - Flavedo vitrea - Flaveſcens ex albo - Flaveſcens pallide - Flavicans - Flavidus - Flavus - Sub-Flavus - Folioſum opus - Fulvus - Sub-Fulvus - Furvus - Fuſcus - Sub-Fuſcus - Fuſcus ad nigredinem accedens - Fuſcus ex viridi.

Gipſeus - Glaſteus - Glaſticus - Gummi Sinenſi obvelatus.

Helvaceus - Helveus - Helvus.

Janthineus - Igneus - Immaculatus - Infuſcatus ex ſumma viriditate.

La-

Lacteus - Laneus - Lentiginoſus - Leonatus - Leucophæus - Lienaris - Ligneus - Lividus - Luridus - Luteus.

Maculatus - Maculoſus - Malacus - Margaritarum albedo purpuriſſa velata - Margaritæ ſublucidæ color - Margaritis ſimilis - Marmoreus - Marmor candidum Drepitanum - Tiburtinum - Melinus - Miniatus - Submineus - Molochiticus - Murinus - Muſicum opus - Muſtelinus.

Niger ex cæruleo. Nigricans - Nigricans e cæruleo - Subniger - Nigerrimus - Nitens - Niveus.

Oleacinus - Ut oliva viridis condita - Oloſericum nigrum - Oloſericum villoſum - Onychinus - Opacus - Opalinus - Oſſeus - Oſtrinus.

Palearis - Pallidus - Papyrus Turcica - Parius lapis - Pellucidus - Perlatus - Phrygium opus - Piceus - Pictus undatim - Pinguis - Plumbeus - Porcellanus - Porraceus - Pramnius - Pullus - Puniceus - Purpuraſcens - Purpuraſcens ex albo - Purpuraſcens ex Viola - Purpureus.

Ravus - Reticulatum opus - Roſeus - Rubedo cuprea - Rubeus - Ruber - Sub. ruber - Rubeſcens - Rubeſcens ex argento, ſub Sandaracca pellucida latitans - Rubidus ignaviter - Rubiginoſus - Rufeſcens - Rufeſcens ex albido - Rufeſcens ex fuſco - Rufeſcens ex rubigine - Rufeſcens leviter - Rufeſcens pallide - Rufus - Ruſſeus - Rutilus.

Sandichinus - Sandaracca velatus - Sanguineus - Segmentatum opus, Subuculis & monilibus ornatum opus - Sulphureus.

Terreus - Teſſellatus - Thalaſſinus - Tophaceus - Tophinus - Tyrius.

Variegatus - Venetus - Veprium acumina repræſentans - Vermiculatus - Vinatus - Vinoſus - Violaceus ad nigrum vergens - Vireſcens cum argenteo ſplendore - Vireſcens e cæruleo - Vireſcens leviter - Viridis - Subviridis - Virideſcens ex flavo. - Subviridis ex albo - Viridus - Unctuoſus - Volturinus - Sub-volturinus.

Xerampelinus.

Ziziphinus.

Nomina lego ſatis multa, ſed vix ſingula perfecte intelligo. Ita de coloribus Autores fingunt, ſcribunt, non definiunt. Optandum, ut nomina recepta revocentur ad ſenſum, & ex rebus non exoticis, vel raro videndis, ſed ex tritiſſimis & cuivis obviis colorum gradus ſtatuantur.

TOT FIGURÆ. Quas hactenus nemo auſus eſt enumerare, nedum ad regulas conſtantes & uſus revocare. Obſtupui, cum aliquando ex coni varia inflexione & ſectione cochleas viderem inimitabili artificio conſtructas.

ſtructas. O! dixi, quam γεωμέτρης artifex! Quantum eſt, quod neſcis, homo Geometra! Huc adſis quæſo, inſpice, concede oculos, inſpice ſpirarum ordines inflexos, eductos, diductos, conjunctos; ecce Conos, Ellipſes, Parabolas, incredibili proportione & elegantia conſtructas! Spondeo, ſcalare Buccinum, aut teſtam quamvis pretioſiſſimam, ſi geneſin horum corporum ex Cono, vel Parabola ad manum Autoris expoſueris, neſcies geneſin: quid ergo de figurarum fine, & partium uſu ſtatueris? An animal Teſtæ, An Teſta animali ſe accommodat? Quamcunque partem elegeris, urgebit quæſtio: cur exemplar talem præciſe figuram expoſcat?

PLANIS. Intelligit, procul dubio, Teſtas cæteris planiores, non exacte planas, quales in genere teſtaceorum non reperimus. Reſpicit forte ad Aures maris, Oſtrea nonnulla, Pectines & quæ in Concharum genere omnium maxime plana ſunt, Amuſia deſcripta *Rumph. p.* 144. *Tab.* 45. *lit.* A. & B. item *Bonanni p.* 447. *n.* 108.

CONCAVIS. Concavæ quidem omnes Teſtæ ſunt, proprie tamen concavitas de Conchis dicitur, quanquam & concavæ præ cæteris appareant Echinorum Teſtæ ſeu globoſæ, ſeu ellipticæ, ſeu alius figuræ. Nec non Balani & Oſtrea echinata, &, quam Volam dicimus, Diconchæ auritæ ſpecies depicta *Bonanni p.* 110.

LONGIS. Longæ poſſunt dici plures Teſtæ. Tales ſunt 1. Tubuli. 2. Coni. 3. Cylindri. 4. Strombi. 5. Buccina; & ex genere Concharum, Solenes Oſtreumque longum *Rumphii.*

LUNATIS. Difficile indicatu, quid per lunatas Conchas *Plinius* ſibi velit. In cochlearum genere aliquæ lunares dicuntur, ſumto denominationis fundamento, ab operculo, inſtar Lunæ, rotundo. *Liſterus* Cochleas quasdam patulas, ore ſemicirculari lunatas appellat abuſive, cum tales demum ſemilunares audiant. Inter alatas *Rumphii*, quas *Langius* auritas appellare mavult, aliquæ in limbum ſemicircularem profuſæ, ruſtica comparatione poſſent ſemilunares dici. Inter conchas quædam pariter ſemicirculares ſunt: e. g. Chama ſquammata *Rumphii p.* 128. ſeu Concha imbricata *Bonanni p.* 109. *n.* 83. Sed, an has autor lunatas dixerit, manet in dubio. *Rumphius* ſemicirculares ſubaudit *p.* 162. *Harduinus* in notis exponit: *in Lunæ cornuum ſimilitudinem curvatis.* Ita *Seneca Oed. vſ.* 465. caudam lunatam Delphinorum dicit: & *Stat.* V. Thebaid. *vſ.* 145. lunati agminis meminit. Sed teſtas in corniculatæ Lunæ modum figuratas non vidi. *Fabius Columna* Cochleas Perſicas lunatas vocat, quia in margine rotundum ſinum quaſi exſciſſum habent, pro linguæ uſu. *Lib. de Purp. Cap.* XIIX.

qui

qui character ex *Rumphii* ſententia cochleis alatis eſt perpetuus, licet non omni in ſpecie æque notabilis. Sed dubito, an ab hac levi & vaga nota, aliena a ſeculi ſui ſubtilitate, ſpeciem denominare *Plinius* voluerit. Exiſtimo, hic potius *lunatum* dici antiqua phraſi, *quicquid ad ſpeciem Lunæ rotundum* eſt.

IN ORBEM CIRCUMACTIS. *Rumphius* de Conchis circularibus, planioribus, qualis Chama literata rotunda eſt, intelligit; ſed hæ orbes ſunt, non in orbem circumactæ. Malim Cornua Ammonis, quibus orbicularis figura eademque ſpiralis competit, ſubintelligere. Quanquam & cochlea ſolaris & laciniata *Rumphii* hunc characterem recipiant. Videtur Author, contuliſſe Cornua, Nautilos & Cochleas brevioris ſcaphi per diametrum late expanſas, puta *Rumphii* Valvatas; pergit enim

DIMIDIO ORBE CÆSIS. Quod de Nautilis valet præ cæteris. Pecten virgineus *Rumphii* & Chama ſtriata ejusdem, corpora quædam parte reſecta, imitantur, neutiquam ſegmenta orbium exprimunt.

IN DORSUM ELATIS. De ante dictis *Rumphii* Valvatis hoc tuto accipitur, quanquam & Porcellanæ, Caſſides & Murices *Langii* huc ſpectent. His enim convexitas eſt eminentior & turgidior, cujus ſuperficies verticalis in oſtracologicis audit dorſum: vide *Majoris* Lexicon ſub hac voce. Anguſte igitur nimis *Harduinus* exponit: „utraque teſta „ ſuperiore & inferiore plurimum cava, ut concha tota ad rotundam „ proxime formam accedat." Hoc ſenſu verba de ſolis bivalvibus dicta e. g. de patellis, chamis lævibus, fragis, nucibus piloſis, poſſent accipi.

LÆVIBUS. Varii dantur Lævoris gradus in teſtaceis. Quædam ad nitorem a natura ſunt læviſſima, quaſi hoc ſigno a cibo excluſa, uti Porcellanæ, Stromborum & Cylindrorum aliqui. Quædam in comparatione cum ſtriatis & verrucoſis ſaltem talia. Vid. *Lang. p.* 81. Quædam ſub cruſta ſcabra ſuperficiem opalinam læviſſimam abſcondunt, qua detracta demum colore & lævore fulgent, ut Nautilus craſſus, Trochi, Cochleæ lunares. Vide de ejusmodi Teſtis præparandis *Rumphii* muſeum.

RUGATIS. Rugæ dicuntur Lamellarum ſuperſtructarum extremitates in teſtis conſpicuæ, eædemque irregulares, ruptæ ſibique diſſimiles; vid. *Langii Method. p.* 21. Ideo rugoſæ dicuntur, pleræque conchæ anomiæ, præcipue vero Concha ad figuram triquetram accedens *Liſteri de Cochl. p.* 229. Item, Muſculi. Nonnunquam & Rugæ audiunt omnes laxioris ſuperficiei corrugationes & inæqualitates, lævorem ex-

actum interrumpentes, qualis rugoſitas inter coſtas pectinum, præcipue in duplici Corde Veneris *Rumph. Tab.* 48. *n.* 6. obſervatur. Hic Plinius rugas extantiores infert. *Rumphius* Chamam aſperam in exemplum ponit. Fors Fuſorum & buccinorum quædam ſpecies magis quadrant. vid. *Rumph. Tab.* 29. *Lit.* F. G. & *Tab.* 49. F. G.

DENTICULATIS: Denticuli ſunt crenæ acutius prominentes in aperturis Teſtarum quarundam, definiente *Majore* in Lexico: conſentit *Harduinus* inquiens: in ambitu ſerratis, teſtæ margine in dentium formam ſecto, ſeu ita laciniato, ut varios mucrones referat, Gallis *dentelé*. Fors ad nummos ſerratos & ita quaſi dentatos reſpexit. Gaudent ejusmodi dentibus, ideo denticulatæ dicendæ, ex turbinatorum genere, porcellanæ, & in ſiniſtro aperturæ latere quædam caſſides. Inter conchas quarundam articulatio fit per gomphoſin, ubi ſub cardinibus comparent dentes, cum oppoſitis loculis, iisdem adaptatis. In margine notabiles dentes habent Nuces piloſæ, Tarentinorum dictæ *Bonanni*, &, præ cæteris Chamarum aſperarum teſtæ.

STRIATIS. Striæ ſunt eminentiæ ſtrictæ & longæ, per convexum teſtæ. Sed *Wormius* ſtrigiles habet pro ſtrigibus, quas canaliculos conchæ aculeatæ exponit; *Muſ. p.* 253. Plerumque ſtriæ & ſtriges ut eminentiæ & harum interſtitia, ſeu ſulci, ab eminentibus ſtriis intercepti differunt. Unde *Harduinus* in ſua lingua vocem *canelé* ſubſtituit, addens: ſtria eſt virgata in convexa Conchæ parte eminentia illa, quæ eſt inter canaliculos ſulcosque, qualis in eo columnarum genere quod inde ſtriatum dicitur. Magna ſtriarum in Teſtaceis eſt diverſitas. Sunt magnæ, parvæ, eminentes, exochæ dictæ, compreſſæ. Sunt ſolidæ, fiſtuloſæ, latiores, ſtrictiores; læves & aſperæ; transverſales, longitudinales, denſiores, rariores, canaliculatæ, intra concavæ extra convexæ. *Lang. p.* 31. Non eſt fere genus inter teſtacea, cujus non aliqua ſpecies ſtriata ſit. Omnino ergo & ex ſtriis licet repetere differentias, ſed non genericas, verum ſpecificas. Quanquam & hoc notandum, quod coſtæ differant a ſtriis, tanquam partes latiores & craſſiores a ſubtilibus & linearibus earundem inſcriptionibus. Unde teſta ſimul & coſtis & ſtriis inſtructa eſſe poteſt. Exemplo ſit Cor Veneris duplicatum *Schynvoetii* ad *Rumph.* Tab. 48. n. 6.

VERTICE MURICATIM INTORTO. Vertex *Plinio* dictus, recentioribus audit Mucro: eſtque nil aliud, quam proceſſus teſtæ conice ſpiralis, ex ventre ampliore. *Langius* varias notavit mucronis hujus differentias, viditque alium elongatum p. 39. alium admodum elongatum p. 38. gradatim acuminatum; arcuatim in linea recta, ſeu plana, acu-

acuminatum l. c. quæ ſingula valent de vertice Plinii. Quando vero mucro præciſe apicem ſpiralis coni denotat, hoc vertici jam dicto non convenit; nec convenit huic loco alia verticis acceptio, quando in conchis partem acutiorem circa cardines denotat, quam *Langius*, ſpeciali nomine, umbonatam dicit, ſi eminet in teſta, ut ſolet umbo, ſeu centrum elatum in ſcuto.

MUREX. Nomen valde æquivocum. Audit ita, 1. Teſtæ aculeus exſertus. 2. Teſta aculeata ſeu obſita modo dictis aculeis; 3. Aculei majores minoresve exteriores & inclinati. *Lang.* p. 22. 4. Purpura cochlea. 5. Cochleæ alatæ *Rumphii*, ſeu auritæ *Bonanni. Lang. p.* 27. Primum ſignificatum *Plinius* in mente habuit, quando meminit verticis muricatim intorti. Id enim non poteſt non de mucrone Turbinis, aculeis obſito, ſive ut loquitur *Harduinus*, de turbinatim convoluto conchæ vertice, nec ſine aculeis accipi: qualem in Murice marmorato *Rondelet. L.* 2. de teſtaceis c. 7. c. 76. Volutis coronatis, Veſpertilionibus *Rumphii* deprehendimus. Exoticas conchas vix vidit *Plinius*. Non audeo ergo, cum Fab. Columna Lib. de Purp. cap. XIX. rariſſimum genus diconchæ hic allegare, cujus effigies interna eſt auriformis, externa vero ob proceſſum ex dorſo ſtyloidem incurvum, & petioli inſtar exporrectum, Peponi minimo ſimilis. Non dicit *Plinius*: vertice muricatim incurvo, ſed intorto. Ubi Turbo? Verba: *vel ad Buccinum incurvis* plane huc non quadrant: nam non amplius de vertice in his loquitur, ſed de tota teſtæ figura? Ubi hic ſpecies Buccini? Ubi Buccini formis curvatura?

MARGINE IN MUCRONEM EMISSO. Margo dicitur in oſtracologicis, extremitas teſtæ patentis: conf. *Columna* de Purp. c. 1. §. 28. Mucro, niſi hic vertici, ut conjicio, opponeretur, de turbine poſſet accipi, & margo in mucronem emiſſus, ita exponi, quod turbo acutior conicus per productiones planas marginalesque teſtæ ſit formatus, velut in quibusdam ſtrombis *Langii* id cernimus. Quin & in oppoſitione verticis & mucronis data interpretatio procedit. Nam poteſt dici *Plinius*, inter acuminatam ſpiram quamcunque & inter conicam & ſtrictiorem, diſtinxiſſe, illamque verticem, hanc mucronem, notanter vocitaſſe. Sed, quia mox ſequitur alia marginis differentia, nempe foris effuſi, & intus replicati, & præterea mucro veteribus etiam acutum teſtæ proceſſum quemcunque denotat; in hoc eosdem imitante *Columna* de Purp. c. 17. §. 3. malo verba Plinii, *margine in mucronem emiſſo*, de proceſſu marginis, quam totius teſtæ interpretari. Ex margine autem longiores proceſſus varii eminent. Unus in Turbinibus

nonnullis, quos *Rumphius* Fuſis comparat, imo in nonnullis cochleis & Buccinis ſub nomine roſtri notus eſt: unde & nova turbinibus jam dictis differentia applicatur. Unus proceſſus longior etiam ex margine alicujus Alatæ apud *Rumphium* protenditur. Plures vero huic ſimiles in Harpagine & Cornuta millepede *Rumphii* extant; quos metonymice *Plinius* in ſingulari commode ſignificare potuit.

FORIS EFFUSO. Id præcipue nonnullis Buccinis alatis, ſeu Muricibus Langianis competit. In oppoſitione ad ſequentem phraſin, *intus replicato*, poſſunt & in hunc cenſum venire Caſſides, quarum exſerti margines per teſtæ duplicaturam craſſeſcunt. Malim tamen effuſionem marginis, de ſimplici per horiſontem expanſione, quam de fimbria interpretari. Obſcurus vero, ni fallor, h. l. *Harduinus* eſt, inquiens: „ Cum, deducta & hiante concha, explicat ſeſe foris uterque margo, neque introrſum revolvitur. „ Videtur de conchis, ſeu de bivalvibus, loqui, cum tamen filum ſermonis ducat potius ad cochlidas.

INTUS REPLICATO. Recte *Harduinus* utroque latere conchæ ſeſe introrſum colligente. Tali margine *Langii* Nuces, & ſemicaſſides noſtræ gaudent. Limbus enim teſtæ introrſum, velut ad duplicaturam vel fimbriam flectitur.

JAM DISTINCTIONE VIRGULATA. Ante de ſtriis dixerat. Ergo virgæ non ſunt ſtriæ. *Rumphius* chamæ virgatæ meminit, in qua rubras linearum ſubtilium acute concurrentium inſcriptiones, virgis cœleſtibus quodammodo ſimiles video. An hæc diſtinctio virgulata? ſane hic ſenſus expreſſior, quam dum ductus in conchis literatis & Arabicis hic ſubaudit *Rumphius* p. 162. vel dum *Harduinus* metaphoram a veſtibus ſimilibusque rebus repetit „ in quibus virgæ ſunt viæ transverſa„ tim & decuſſatim ductæ. Unde veſtis virgata eadem, quæ ſcutulata „ eſt. „ In Oſtracologicis hæc interpretatio nondum recepta. Ubi potius ad virgas Cœli cognitas, quam ad veſtes incertas obſoletasque oculos & mentem dirigimus.

CRINITA. Quid Crines? Villos monſtrat Columna de Purpura C. I. §. 30. oſtendens lanuginem muſcoſam ſuper teſtis. Sed hæc Teſtis accidit, non ineſt. Idem & fibras muſcoſas & purpuraſcentes, ſeu lanuginem Oſtrearum crines vocat. Tali ſenſu & *byſſus pinnarum*, ſeu collectio fibrarum, ex ſtrictis pinnarum commiſſuris in terram germinans, crinis audiret; mihi vero hæc teſtas nulla interna nota ſignificant. Conjicio, *Plinium* dixiſſe crines denſiſſimas ſubtiliſſimarum linearum inſcriptiones, ſive ut *Harduinus* loquitur, ſegmenta vel lineolas crinium inſtar porrectas, quales in Conchis anomiis trilobis inter alias advertimus. Sunt mihi

mihi visa hujus petrefacti specimina selenitica pellucida, in quibus lineæ illæ non læves & æquabiles, sed velut dehiscentes & fibrosæ apparuerunt. Vel magis ad sensum crinitas dixit testas illas pilosas & quasi setis hispidas, quales in Buccinorum & Muricum genere depingit *Rumphius*, qui harum velut oblitus, distinctionem crinitam Plinii ad conchas literatas & Arabicas subtilissime striatas, male applicat. Posset *Columna* Penicillum, Lib. de Aquatilibus depictum, rectius allegare.

CRISPA. Villi Testarum externi crispi sunt; sed, quid hæc ad Testas distinguendas? superficies crispa *Plinio* visa est. Crusta Testarum aspera scabra legitur, item rugosa; sed ideo non est crispa. Concha scabionata Rumphii *p.* 140. exochis incurvatis crispatur. Si fallor in hac, prætendo superficiem Conchæ, quam *Rumphius* Felis linguam nominat *p.* 147. quod perpetuis eminentiis veluti papillis sit obsita, qualia corpora vulgo & crispa dici solent, magis proprie *Rumphius* toties jam nominatas Conchas Arabicas, crispas, propter strias circinatas dicit.

UNDATA. Undosa, undulata alias dicuntur, quæ colores fluctuum more pro luminis alia atque alia incidentia alternant. Undata autem, quæ fluctuum exemplo hiulca, modo in colles elata, modo in valles sunt demissa. Exemplo sint Murices, Brandaris & quædam species Sympuli, a nobis ita vocati.

CANALICULATIM. Aliis caniculatim. Canaliculi aliquando sunt processus Testarum longi & pervii. Hic intelliguntur vel profundiores sulci sive striges per corpus Testæ dispositæ, vel ductus, per corpus testæ pervii supra elati, infra vel plani, vel concavi, quæ alias striæ canaliculatæ dicuntur. *Aldrovandus* cum Hermolao legit: CUNICULATIM; sequitur *Harduinus*. Lectio minime absona, & plurium Codicum autoritate confirmata: nam ductus intra Conchas cuniculis assimilantur. Respexit *Plinius* ad locum *Aristotelis*, *Lib.* V. *Hist. Anim.* quem *Theodorus* hoc sensu vertit. *Aldrov. Lib.* III. *de Test. p.* 287.

PECTINATIM. Præstantissimi Codices, teste *Harduino* ad *Plinium p.* 541. addunt *divisa*. Ita facilior sensus est. Pectines dicuntur Testæ, parallelis exochis longitudinariis divisæ: a similitudine instrumenti, quo textores fila trajecta condensant; Græci κτενες nominant, a manuum pedumve digitatorum similitudine, teste *Charletono Onom. Zoic.* Pectinatim divisa vel undata proinde dicenda sunt testacea, quorum striæ parallelæ per corpus decurrunt.

IMBRICATIM UNDATA. Imbrices dicuntur tegulæ tectorum planæ; per similitudinem audiunt ita testarum striæ vel rugæ, in decursu fractæ,

ctæ, & tegularum dictarum inſtar diſpoſitæ, *Major* in Lexico. Imbricatim undulata exponit *Langius*, *Harduinum* ſecutus, de teſtis ad undarum ſeſe attollentium ſpeciem diſtinctis: quæ ſimilitudo non ſufficit. Expreſſior altera *Harduini* cum ſquammis piſcium comparatio. Malo imbricatim undata interpretari de teſtis ſtriatis, quæ aliquoties fractæ, & per multiplices quaſi laminas decurrentes, tecta tegulis ſtrata imitantur: quales in oſtreis & nonnullis pectinibus conſpicimus.

CANCELLATIM RETICULATA. Cancelli ſunt interſtitia ſtriarum in longum & transverſum extenſarum, ut tota earum textura rete, vel craten repræſentet: quod opus naturæ reticulatum ſeu cancellatum, alio nomine, Clathrum dicitur, *Columna de Purp. C.* X. §. 4. Huc reſpiciens *Plinius* dicit: *cancellatim reticulata*: id eſt, ut interpretatur *Harduinus* „ ſecta lineolis teſta, in transverſum compactis ad retis ſi„ militudinem vel cancellorum, cancellis ipſis modo oblique ductis a „ conchæ capite ad marginis latus: modo rectis a ſummo vertice ad „ marginem imum: iisdem modo denſioribus ſive preſſioribus & qua„ dratis: modo porrectioribus & oblongis, modo in arcum toto con„ chæ corpore ſinuatis." Talis ſtructuræ ſunt *Rumphii* Favus *p.* 140. & quædam Chamarum ſpecies eidem ibidem depictæ.

IN OBLIQUUM IN RECTUM EXPANSA. His innuit præcipuam Concharum differentiam, quam *Langius* terminis *æquilateræ* & *inæquilateræ* ſignificare maluit. Videlicet ſi conchæ per dorſum inſpiciuntur, vertex earum vel utrinque æqualiter vel inæqualiter dilatatur. Priorem extenſionem dixit *Plinius in rectum*, poſteriorem *in obliquum expanſam*. Exempli loco cape pectines & conchas pictorum. Illos videbis a cardine æqualiter & regulariter expandi, has ab uno ſaltem latere diffundi. Recte hic *Rumphius* Pectinem Virgineum & Tellinas allegat, tanquam obliquas, ſed Oſtreæ, ut pergit, mea opinione, non ſunt in rectum expanſæ omnes; melius Pectines huc referuntur.

PRÆDENSATA. Hoc iterum de Conchis intelligendum. Neque enim denſum hic craſſum ſonat, ut aliqui ſubaudiunt; ſed, mea opinione; *raro* oppoſitum recepta Phyſicis ſignificatione notat contiguitatem arctiorem, ut adeo Teſta prædenſata h. l. ſit accurate clauſa, vel circa cardines magis connivens. Enarrare jam videtur *Plinius* differentias circa valvarum conjunctionem obſervatas, poſtquam de earundem expanſione verba fecit, hinc jungit prædenſata, porrecta, ſinuata, quæ mihi ad margines, marginumque juncturas ſpectare videntur. *Rumphius* denſata legit, & teſtulas compactas intelligit.

PORRECTA. Dupliciter Conchæ poſſunt dici porrectæ, vel ratione car-

cardinis, vel ratione laterum. Latera exporrecta jam per expanſionem ſeu rectum ſeu obliquam ſignificavit *Plinius*. Reliquum ergo eſt, ut cardinem exporrectum ſubaudiamus. Contingit videlicet in Concharum valvis, alteram recipere, ita, ut major minorem marginaliter & eminenter claudat, tunc cardo plerumque in roſtrum productus, ſuper teſtæ incluſæ verticem recta incurvatur, & commode porrecta ſuperior teſta dici poteſt. Hodie tales Conchæ anomiæ vel anomalæ, vertice roſtrato appellantur, & petrefactæ tanto ſunt frequentiores, quanto rariora earundem nativa exempla. Deſcribit eas *Columna de Purpura Cap.* XII. *Rumphius* porrectas teſtas nominat cochleas teretes in longum eductas, quas nos Cylindrorum mucronatorum, item, Turricularum, Terebellarum nomine inſignimus.

SINUATA. Sinus in teſtis appellatur arcuata vel lunata Teſtæ Concavitas. Nolim huc ventres Turbinatorum cavos trahere. Explico *Plinii* vocem de *Conchis*, in ſpecie iis, quarum Teſtæ in latere longiore ad quendam velut angulum fractæ ſua conjunctione notabilem ſinum quaſi muliebrem formant; unde & Hyſteroconchæ, & Venereæ ſolent appellari, quanquam non his ſolis ejusmodi ſinus adſit, verum & Bucardia & Cordatæ quædam teſtæ eum communem habeant. Id magis convenit, quam ſi ſinus in mallei Polonici hiulcâ planitie, aut inæqualibus lateribus judicem cum *Rumphio p.* 162.

BREVI MODO LIGATA. Non dicit articulata, vel conjuncta, ſed ligata. Aliud omnino eſt ligamentum, aliud articulatio. Non omnes Conchæ ſibi inarticulantur, quædam ligamentis cohærent, ſive nerveis ſive membranoſis. Notanter autem dicit: Brevi modo ligata. Quoniam mox diſtinguit toto latere connexa. Innuit ergo, quasdam Conchas circa Cardines ſaltem levi & brevi ligamento nerveo cohærere: quod de pectinibus generatim, & de pectunculis quibusdam certum eſt. Neſcio, quid *Rumphio* in mentem venerit, ut brevi modo ligatas cochleas lunares (**die haer en rond zyn**) habuerit. Sed jam video, ipſum pro: *modo*, legiſſe: *nodo*; ut adeo cochleas nodoſas memineric. Eandem lectionem ſecutus *Fab. Columna*, Conchas anomias trilobas, ob cervicis anguſtiam, brevi nodo ligatas, autumat, *Lib. de Purp. C.* XVI. Sed ejusmodi junctura concharum non ligata, ſed inſinuata eſt. Nodi nulla ſimilitudo. Legit *Harduinus nodo*, & brevi nodo latiori margini opponit, quod non capio.

TOTO LATERE CONNEXA. Dicit: *connexa*, non: *ligata*: quoniam, quæ toto latere cohærent, non ligamento ſed membrana conjunguntur, veluti Muſculi, Solenes, Pinnæ. Dicit autem: *connexa*, non

inarticulata. Ergo vix habuit reſpectum ad concham πολυλέπιδογλυμὸν *Columnæ Cap.* XXIX. quæ habet exiguorum cardinum longam ſeriem inter vertices, quibus utrumque latus rectum quaſi conſutur. Fors tamen & hæc concha pariter mediante membrana cohæreat: quod nobis teſtam ſolummodo hactenus obſervantibus eſt incompertum.

AD PLAUSUM APERTIS. Quid hoc? Fallor, aut audio Chamas ſignificari, aliasque conchas, quæ teſtis clauſis in latere per rimam magis minusve diductam hiant. Unde & Chamæ vel Hiatulæ appellantur. Plauſus certe Teſtarum ſimilis manibus plaudentibus eſt: Nam, quemadmodum manus manui plaudenti per volam jungitur, ita & concavum teſtæ concavitati alterius in conjunctione imminet. Sed en! *Plinius* dicit: *ad plauſum apertas*, quibus ſic aperta hiantiaque labra chamarum reſpicit, & ad plauſum edendum natæ factæque, ſi inter ſe illidantur, videri poſſint, ut recte conjicit *Harduinus*. Conjunctio quoque valvarum in chamis mediante gynglymo & forti ligamento, ad plauſum imitandum & excitandum longe eſt convenientiſſima. Chamas apertas in maris fundo jacere, & valvas majores ad nutum minutioris animalculi inhabitantis cum impetu claudi, *Rumphius* ipſe autor eſt, qui tamen hunc plauſum conchis naturalem & convenientiſſimum mutat in *pulſum* præternaturalem conchis, quaſi *Plinius* innuere voluiſſet, quod conchæ percuſſæ aliæ aliis facilius dehiſcunt. Mihi ita *Plinius* poſt pulſum, non ad plauſum apertis dixiſſet.

AD BUCCINUM INCURVIS. Buccinum dicitur Teſta turbinata longa, ſpiralem conum ex acuto apice in amplum ventrem majoris diametri producens. In hoc nil niſi ſpiræ incurvæ ſunt: ad buccinum ergo incurvæ, *ſenſu Pliniano*, non ipſum Buccinum, ut putat *Rumphius*, ſed Conchæ erunt, bivalves anomalæ, curvæ, qualis v. g. eſt Concha anomia rugoſa & adunca, depicta, *Bonanni Recreat. p.* 103. *n.* 31.

NAVIGANT. Pauciſſima animalia teſtacea in mari navigant. Pleraque vel in ſcopulis, vel in arena, vel in littore habitant. Inter ſaxa *Murices*, *Patellæ*, in arena *Tellinæ*, *Pinnæ*, *Solenes*, *Caſſides* hærent. In *fundo* maris Oſtreæ & Chamæ aſperæ: Et hæ quidem immotæ jacent; Amuſia piſcatores intercipiunt. De teſtis inanibus & derelictis aqua levioribus non loquimur. His enim fluctus pro vehiculo ſunt.

NAVIGANT: VELIFICANT. Dicit prius *navigant*, poſt *velificant*. Aliud ergo navigare, aliud velificare in teſtis. Prius de iis intelligo, quæ obverſa convexitate, naviculæ inſtar, innatant, nec adeo vento obſequuntur, quam ſubmerſioni reſiſtunt. Poſterius de teſtis, quæ præter

ter id, quod navigant, ſuperficiem vel latus aliquod vento obtendunt, quo irruente propelluntur.

VENERIÆ. Non dicit: navigant ex his ſolæ veneriæ: ut minus caute accipit *Harduinus*. Nam mox ſequitur de pectinibus, *ſeque ipſi carinant, ſed ex his*, videlicet ante recenſitis generibus, *navigant veneriæ*. *Rondeletius* ſub veneriis his muricem *Mutiani*, de quo *Plinius L.* XXXII. intelligit. Eſt hujus quædam cum porcellanis, veneriarum nomine hodie ordinarie venientibus, convenientia; ſed has non navigare, verum ſub arena latere, nec navium carinis, *Mutiani* muricis more, verum ſaxis, tempore plenilunii adhærere, ideoque [illegible] Porcellanas vero charinas ſive venereas, non a Veneris cultu, ſed ſinus ſimilitudine, qui *Græcis* χοιρὸς, Latinis porcus vel porculus, *Ennio* matriculus vocatur, nomen traxiſſe, ſcribit *Rumphius*, teſtis fide dignus. De alio igitur genere *Plinius* procul dubio loquitur: *Porcellanis* certe, quæ ſequuntur, verba non conveniunt, *præbentesque concavam ſui partem & auræ opponentes, per ſumma æquorum velificant*. Latus enim concavum, quod auræ opponere poſſint, non habent: vide Schemata *Rumphii*, donec tabulæ Gottwaldianæ in lucem Cl. *Breinii* cura venerint, quæ hoc teſtaceorum genere abundant. Neque ii rem acu tangunt, quibus auris maris, ὠτάριον ſive οὖς Ἀφροδίτης i. e. auris veneris, de qua *Heſychius* p. 714., ſubintelliguntur. Ejusmodi enim teſtæ non navigant, ſed patellarum more ſcopulis adhærent, ut refert *Rumphius*. Oppido vero abludit *Harduinus*, buccinorum ſeu muricis aliquod genus hic innuens. Utraque enim appellatio & buccini & muricis magis vaga quam veneriarum eſt, nec in omni ſignificatu ſtructura ad navigandum habilis. Qui Neritas huc arceſſunt *Ariſtotelis Lib.* IV. *Hiſt. Animal.* C. IV. p. 452. mea opinione non procul a vero abſunt. *Nereus* enim, Deus maris, in tali cochlea navigare pingitur. Teſtam ei levem & latam eſſe, *Oppianus* docet *Lib.* I. *Halieut. v.* 331. De bifore teſta nihil *Plinius*, nec hoc quidquam ad natandum facit. Non obſtat turbinatum genus. Nam & *Nautilus* turbinatus eſt, quem carinare tamen autores conſentiunt. *Neritæ* conveniunt verba: „ præ„ bentesque concavam &c." Ex *Plinii* relatione *Nautilus* alio modo velificat. „ Inter præcipua autem, inquit, miracula eſt, qui vocatur „ *Nautilos*, ab aliis *Pompilos*. Supinus in ſumma æquorum pervenit, „ ita ſe paulatim ſubrigens, ut, emiſſa omni per fiſtulam aqua, velut „ exoneratus ſentina, facile naviget; poſtea prima duo brachia retor„ quens, membranam inter illa miræ tenuitatis extendit. Qua velifi„ cante in aura ceteris ſubremigens brachiis, media cauda, ut guber-

„ naculo ſe regit. Ita vadit alto, liburnicarum ludens imagine, &, ſi „ quid pavoris interveniat, hauſta ſe mergens aqua. " Priori modo carinant & velificant quoque *Cymbia*, *Perſica*, *Bullæ*, *Ficus*. Sed in his nil venerei.

SALIUNT PECTINES. Conſentit *Ariſtot. L.* IV. H. A. *Cap.* IV. *p.* 439. Dubitat *Jonſton*, quia pectines non poſſe diducere valvas expertus eſt. Fidem prioris liberat *Rumphius. p.* 143. *&* 144. teſtatus, hunc ſaltum facere planas pectines, non mediante valvarum plauſu, ſed per maniculam (**handchen**) quandam calloſam, quam aquæ impingunt, ut, ea renitente, valvas parte barbata prævia promoveant.

SEQUE IPSI CARINANT. Notanter *carinant*, non *velificant*. Hæc gratis fingit *Harduinus;* neque enim ita valvas diducunt pectines, ut altera pars planior veli vices expleat, ſed ſupinæ navigant convexo latere. Idem mos *Amuſii*, de quo *Rumphius*.

SCIAGRAPHIA METHODI
AD
GENUS SERPENTIUM
ORDINATE DIGERENDUM.

- SERPENTIUM (a)
  - ORDO I. Anguis. (b)
    - Capite discreto, cauda attenuata.
      - VIPERA.
        - Dentibus anticis caninis. Κυνόδον.
          - Vulgaris variorum locorum: Ἔχις.
          - Caudisona.
          - Conspicillaris.
        - Dentibus pectinatis (Lucii piscis vel Crocodili similibus) Ἰχθυόδον.
      - COLUBER. * Dentibus acicularibus, plurimum umbrosis, & velut acupictis. Αὐγαιόδον.
      - ANODON. Ἄνοδος; Edentulus.
    - Capite indiscreto, cauda truncata.
      - Cauda præ capite anomala. SCYTALE.
      - Capite & cauda anomalis. AMPHISBAENA.
  - ORDO II. Vermis. (c)
    - Lumbricus; teres
      - terrestris: vulgaris.
      - aquaticus: Vena Medeni seu Gordius.
      - animalium.
    - Tænia; planus.
    - Hirudo: ventre sessili.

* *Prisci* Colubrum anguem domesticum, aquaticos proprie Serpentes dixerunt. Permulti ex iis tanquam mites & innocui celebrantur, vel quorum morsus non nisi inflammationem partis læsæ inducit, facile exstinguendam.

(a) *Serpentia* sunt animantia apeda & apinnia; corpore vel tereti vel complanato; aut cortice tecto aut nudo.

(b) *Anguis* est animal serpens, capite organis sensoriis prædito; pulmone respirans —— cute squammata; vertebris costisque per longitudinem corporis instructum —— Plurimi deponunt exuvias.

(c) *Vermes* apodes sunt omnesque nudi. Qui pedati, sunt Insecta, nobisque non veniunt in censum Vermium.

De Drukker van dit Werk G. J. WISHOEF COENRAAT ZOON, *maakt aan de Liefhebbers bekent, dat by hem nog te bekoomen ſyn, eenige exemplaaren van de volgende Werken van denſelven* Autheur, &c.

J. Th. Klein Sciagraphia Lithologica curioſa, ſeu Lapidum Figuratorum Nomenclator &c. cum præmiſſa epiſtola M. A. Cappeller de Studio Lithographico &c. cum figuris, Gedan. 1740. 4°.

—— —— An Tithymaloides frutescens, foliis Nerii, cum fig. ibid. 1730. 4°.

—— —— Deſcriptiones Tubulorum marinorum, ac diſſertatio Epiſtolaris de Pilis Marinis, cum fig. ibid. 1731. 4°.

—— —— Naturalis Diſpoſitio Echinodermatum: accedit Lucubratiuncula de Aculeis Echinorum Marinorum, & Spicilegium de Belemnitis, cum fig. ibid. 1734. 4°.

—— —— Mantiſſa Ichthyologica de Sono & Auditu Piſcium, Lipſiæ 1746. 4°.

—— —— Hiſtoriæ Piſcium naturalis Miſſus primus de Lapillis eorumque numero in Craniis Piſcium, cum Præfatione de Piſcium Auditu: Acceſſerunt Anatome Turſionum & obſervata in capite Rajæ, cum fig. Gedan. 1740. 4°.

—— —— —— —— —— Miſſus ſecundus de Piſcibus per Pulmones Spirantibus: acceſſerunt ſingularia de Dentibus Balænarum & Elephantinis, ac de Lapide Manati & Tiburonis, cum fig. ibid. 1741. 4°.

—— —— —— —— —— Miſſus tertius de Piſcibus per Branchias occultas ſpirantibus, cum obſervationibus circa partes Rajæ Maris & Ovarium Galei, cum fig. ibid. 1742. 4°.

—— —— —— —— —— Miſſus quartus de Piſcibus per Branchias apertas ſpirantibus, cum additamento ad Miſſum tertium, cum fig. ibid. 1744. 4°.

—— —— —— —— —— Miſſus quintus & ultimus de Serie Secunda Piſcium per Branchias apertas Spirantibus, cum additionibus ad Miſſ. 2. 3. 4. & epiſtola de Cornu Piſcis carinæ navis impacto, cum fig. ibid. 1749. 4°.

—— —— Hiſtoriæ Avium Prodromus, cum Præfatione de Ordine Animalium in Genere: acceſſit Hiſtoria Muris Alpini & Vetus Vocabularium Animalium, cum fig. Lubec. 1750. 4°.

Verſuche und Abhandlungen der Natur Forſchenden Geſellſchaft / in Dantzig 1747. mit Kupfferen / in 4°.


Argonauta Argo. p: 0. f 2
TAB. I.
Nautilus Spirula Page 5. 11
Helix Cornu Arietis
Helix Scarabaeus
Murex Neritoidaeus




TAB. II.
31
32
33
34
36
35 b.
35 a.
37
38
40
39
42
42
41 Strombus
Pes Pelecani
Lag: 32. 84
43
44
46
47
45
48
49
50
51
Turbo
Pica
52
53
54
55




56
58
59
57
61
62
Bulla
Achatina
Page 47. b
60
63
64
65
Turbo
Calthrus
Pag 5. 150. 2
66
68
67
69
70
a. 71
b. 71
72



TAB. IV.



TAB. V.
86
87
88
89
90
91 a
91 b
92
93
94
Voluta Scapha Pag. 79. 208.
Voluta Olla Pag. 81. II, 2
95
96
97
98
99 a
99 b
100

De Drukker van dit Werk G. J. WISHOEF CONRAAT ZOON, *maakt aan de Liefhebbers bekent, dat by hem nog te bekoomen ſyn, eenige exemplaaren van de volgende Werken van denſelven* Autheur, &c.

J. Th. Klein Sciagraphia Lithologica curioſa, ſeu Lapidum Figuratorum Nomenclator &c. cum præmiſſa epiſtola M. A. Cappeller de Studio Lithographico &c. cum figuris, Gedan. 1740. 4°.

——— An Tithymaloides frutescens, foliis Nerii, cum fig. ibid. 1730. 4°.

——— ——— Deſcriptiones Tubulorum marinorum, ac diſſertatio Epiſtolaris de Pilis Marinis, cum fig. ibid. 1731. 4°.

——— ——— Naturalis Diſpoſitio Echinodermatum: accedit Lucubratiuncula de Aculeis Echinorum Marinorum, & Spicilegium de Belemnitis, cum fig. ibid. 1734. 4°.

——— ——— Mantiſſa Ichthyologica de Sono & Auditu Piſcium, Lipſiæ 1746. 4°.

——— ——— Hiſtoriæ Piſcium naturalis Miſſus primus de Lapillis eorumque numero in Craniis Piſcium, cum Præfatione de Piſcium Auditu: Acceſſerunt Anatome Turſionum & obſervata in capite Rajæ, cum fig. Gedan. 1740. 4°.

——— ——— ——— ——— ——— Miſſus ſecundus de Piſcibus per Pulmones Spirantibus: acceſſerunt ſingularia de Dentibus Balænarum & Elephantinis, ac de Lapide Manati & Tiburonis, cum fig. ibid. 1741. 4°.

——— ——— ——— ——— ——— Miſſus tertius de Piſcibus per Branchias occultas ſpirantibus, cum obſervationibus circa partes Rajæ Maris & Ovarium Galei, cum fig. ibid. 1742. 4°.

——— ——— ——— ——— ——— Miſſus quartus de Piſcibus per Branchias apertas ſpirantibus, cum additamento ad Miſſum tertium, cum fig. ibid. 1744. 4°.

——— ——— ——— ——— ——— Miſſus quintus & ultimus de Serie Secunda Piſcium per Branchias apertas Spirantibus, cum additionibus ad Miſſ. 2. 3. 4. & epiſtola de Cornu Piſcis carinæ navis impacto, cum fig. ibid. 1749. 4°.

——— ——— Hiſtoriæ Avium Prodromus, cum Præfatione de Ordine Animalium in Genere: acceſſit Hiſtoria Muris Alpini & Vetus Vocabularium Animalium, cum fig. Lubec. 1750. 4°.

Verſuche und Abhandlungen der Natur Forſchenden Geſellſchaft / in Dantzig 1747. mit kupfferen / in 4°.


Argonauta Argo. p. 0. f 2
3
1
4
2
5
6
Nautilus
Spirula
Pag c. 5. 11
7
8
11
10
9
Helix
Cornu Arietis
14
15
13
12
18
16
17
19
20
22
24
25
21
23
Helix Scarabaeus
28
26
27
29. a
29. b
30
Murex Neritoideus




TAB. II.
31
32
33
34
36
35 b.
35 a.
37
38
40
39
42
42
41 Strombus
Pes Pelecani
43
44
46
47
45
48
49
50
51
Turbo
Pica
52
53
54
55




56
58
59
57
61
62
Bulla
Achatina
Page 47. b
60
63
64
65
Turbo
Pathrus
Pag 5. 150. 2
66
68
67
69
a. 71
b. 71
70
72



TAB. IV.





TAB. V.


86
87
88
89
90
91 a
91 b
92
93
94
Voluta Scapha Page 79. 203. 9
Voluta Olla Page 81 II, 2
95
96
97
98
99 a
99 b
100



TAB. VI





TAB. VII.


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128



TAB. VIII.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ostrea edulis
Page 125. 323
Ostrea folium
Page 125. 325

24
25
26
27
29
30
31
28
34
35
33
32
37
36
38


39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
50
51
54
55
56




TAB. XI
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68. a.
68. b.
67
69
70
71
72
73
74
75

TAB. XII.


76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Branner Earth Sciences Library

Stanford University Libraries
3 6105 118 305 767

594.8
K64